

土家医治毒药物集

主编 彭芳胜 杨光忠

二〇一三年十月

《土家医治毒药物集》内容提要

历代土家医没有把治毒药物单例，只是都在其他有关著作中。在中南民族大学和湖南湘西自治州民族医药科研所合作组织下，安排专家学者，深入国内土家族主要聚居地民间，访问名老土家医，收集手抄本和相关文献，进行为期 1 年的田野调研和文献调研，经过整理和编辑，著成《土家医治毒药物集》一书。

全书由绪论、各论、附录三部分组成，约 23 万余字，收载常用治毒药物 485 种和 200 余个单验方。绪论部分主要论述治毒药物的形成、发展和创新，介绍毒气病十二治法，治毒药物科学内涵和实用价值；各论全面介绍治毒药物分类，把常用药物按功效和主治分为祛风毒、散寒毒、赶湿毒、消热毒、泻火毒、抗瘟毒……驱虫毒十八类，每类药物为一个章节，由概述和具体药物组成，每种药物含有土家语名、常用名、别名、来源、性味、功效、主治、用量、临床应用、备注、备考十一个内容；附录中有：常用药名笔画索引、土家语药名笔画索引、拉丁文药名索引、主要参考著作及资料目录、后记五个部分。

本书是对土家街的毒药物一次全面系统总结，对常用治毒药物首次进行科学分类，简述治毒原理及用法，是土家医治毒药物历史发展中的一个里程碑。

作者简介



彭芳胜，男，土家族，大专文化，中共党员，中医内科副主任医师，1956年出生于湖南省永顺县八万坡土家山寨。现任湖南省湘西土家族苗族自治州民族医药研究所副所长，中国民族医药学会理事、土家医药分会委员常务理事、《中国民族医药杂志》编委、湖南省中医药学会民族医药专业委员会秘书、湖南省中医药管理局土家医重点研究室主任、湘西土家族苗族自治州科技进步奖评委、湘西土家族苗族自治州非物质文化遗产评审专家。

在民族地区学习、工作四十余年，主要从事土家医药临床与研究，在相关杂志上发表学术论文 20 余篇，主编出版《土家医方剂学》、《土家医雷火神针疗法小儿提风疗法技术规范应用研究》2 部，承担完成国家级、省部级、地厅级科研课题 5 项，获省级科学进步三等奖 1 项，地厅级科学进步一等奖 3 项，二等奖 1 项、三等奖 3 项，其学术水平得到原国家中医药管理局副局长、中国民族医药学会会长诸国本先生的高度评价，视为“国内土家族医药优秀继承人”，先后获得中国中西医结合学会第二届特殊贡献奖和湘西土家族苗族自治州人民政府第四届科技兴州先进个人荣誉称号。

研究方向：土家医药基础理论与临床应用研究。

土家医治毒药物集

主 编 彭芳胜 杨光忠

副主编 梅之南 王小华

编写人员（按姓氏笔画）王小华 任永申 刘新桥 杨文兴杨光忠 杨新洲 梅
之南 彭方举 彭芳胜

编写单位

中南民族大学

湖南湘西自治州民族医药研究所



江边一碗水（土家语名：胡泡泽拉书）



肥猪头（土家语名：子是古图科巴）

目 录

序 1·····

序 2·····

编写说明·····

绪 论·····

一 土家医治毒药物的形成和发展轨迹·····

二 土家医治毒药物核心思想内容·····

各 论·····

第一章 祛风毒药·····

17、日阿切实实克查·····

1、三加他拔·····

18、蜈蚣室克查·····

2、抗苦写下·····

19、猫从尔他·····

3、泽蜈蚣·····

20、惹皮箭·····

4、白梓卡蒙·····

21、我铜钱实克查·····

5、日阿色二拉·····

22、化香卡蒙·····

6、苦咱屁趴利·····

23 见他他被·····

7、南八·····

24、抗苦枇杷·····

8、灭皮嘎拉·····

25、线盖·····

9、鲁嘎阿纳二拉·····

26、筛桶米·····

10、尔他被米马窝·····

27、没他泽二拉·····

11、耐鸡长蒙机纳·····

28、扣子布里·····

12、歪叶子兰·····

29、怪柳·····

13、恶实·····

30、破子实克查·····

14、矮地茶·····

31、泡桐·····

15、科莲花·····

32、灵仙实克查·····

16、牛王刺·····

33 而且且七·····

- 34、**务主**兰……………
- 35、王辣蚱……………
- 36、乌稍窝……………
- 37、窝得卡那……………
- 38、烙铁科巴窝……………
- 39、蜈蚣……………
- 40、宋**切实**实克查……………
- 41、我圈圈窝……………
- 42、哈列列碰……………
- 43、飞蛾树……………
- 第二章 散寒毒药……………
- 1、海脚此巴……………
- 2、火葱科巴……………
- 3、撇拉莲……………
- 4、面姐升麻……………
- 5、马蹄香……………
- 6、抗**理布**布……………
- 7 **女儿**儿海脚……………
- 8、科宋卡普……………
- 9、补此香……………
- 10、半截烂……………
- 11、卡普王嘎里那借……………
- 12、抗苦科苏……………
- 13、巴梭尔……………
- 14、母尔他细辛……………
- 15、马列碰七……………
- 16、补阳丹……………
- 17、科**格欵**梯实……………
- 18、桂皮……………
- 19、热书长普哈车……………
- 20 **女儿**儿糙……………
- 第三章 赶湿毒药……………
- 1、莫胡踏……………
- 2、马桑阿实……………
- 3、抗苦薄荷……………
- 4、米实克查……………
- 5、沙被炸起……………
- 6、梨罗根……………
- 7、隔山消……………
- 8、宋海角七……………
- 9、泽菖蒲……………
- 10、金丝发……………
- 11、木防己……………
- 12、金钱草被……………
- 13、通草被……………
- 14、夜关门此巴……………
- 15、冬葵……………
- 16、草芙蓉……………
- 17、全毛百草……………
- 18、八步拿……………
- 19、日阿列碰被亏实克查……………
- 第四章 清热毒药……………
- 1、二拉龙胆……………
- 2、他司长普……………

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 3、五爪龙····· | 30、散梦克思····· |
| 4、木芙蓉长普····· | 31、抗苦扁豆····· |
| 5、文王一支笔····· | 32、那土····· |
| 6、抗苦七布机纳····· | 33、日阿被拉实克查····· |
| 7、是嘎阿实冲天炮····· | 34、篇蓄····· |
| 8、小亡泽方实克查····· | 35、背蛇生····· |
| 9、拉司奶····· | 36、日阿吉拖嘎····· |
| 10、拉司奶被····· | 37、泽铺鲁嘎····· |
| 11、瓦所西····· | 38、上矮····· |
| 12、鸳鸯花····· | 39、里提枇杷····· |
| 13、子尼嘎被实克查····· | 40、千年热色····· |
| 14、青麦七····· | 41、抗苦腊梅····· |
| 15、豌豆七····· | 42、灭泽实克查····· |
| 16、海蚌含珠····· | 43、抗克油菜思····· |
| 17、灯笼实克查····· | 44、尔他此巴金腰····· |
| 18 铁血子····· | 45、窝三叶泡····· |
| 19、他色黄连····· | 46、抗苦罗华生····· |
| 20、灯笼此巴····· | 47、烂才合实克查····· |
| 21、思起血莲····· | 48、铜锤草····· |
| 22、写马鞭····· | 49、烂嘎得尔他····· |
| 23、务吉提克面姐····· | 50 是被被玉那····· |
| 24、米马七····· | 51、抗苦王嘎里卡普····· |
| 25、你咚嘎莲····· | 52、丁香蓼····· |
| 26、满天星····· | 53、梁王茶····· |
| 27、惊风实克查····· | 54、走吆母业····· |
| 28、钻地风····· | 55、利恩切实克被亏····· |
| 29、尔他八提面姐····· | 56、用卡卡蒙····· |

- 57、他司捏龙·····
- 58、梅花被·····
- 59、翁且古主实克查·····
- 60、土茵陈·····
- 61、疖积草·····
- 62、丰花草·····
- 63、泽兰此巴·····
- 64、马兰丹·····
- 65、拉拢阿夫·····
- 66、阿定额额阿·····
- 67、抗苦菊花·····
- 68、莲蓬草·····
- 69、所那致·····
- 70、黄败酱·····
- 71、一把伞·····
- 72、毛连连·····
- 73、老君南切·····
- 74、千年棕被亏·····
- 75、?? ·····
- 76、?? ·····
- 77、?? ·····
- 第五章 泻火毒药·····
- 1 定额额阿所猛·····
- 2、马那土·····
- 3、尖刀实克查·····
- 4、王剥皮·····
- 5、莫被实克查·····
- 6、龙胆地丁·····
- 7、麦他册哈车·····
- 8、老嘎拉爬·····
- 9、克欵实克查·····
- 10、玉簪卡普·····
- 11、地星宿·····
- 12、克欵致子那土·····
- 13、黄连阿巴·····
- 14、朱砂机纳·····
- 15、泽灯草·····
- 16、阿火炮·····
- 17、他色黄连·····
- 18、阿黄芩·····
- 19、阿黄连·····
- 20、他色黄柏·····
- 21、黄连卡木·····
- 22、三花龙胆·····
- 23、对叶四方实克查·····
- 24、泽黄连·····
- 25、百金卡普·····
- 26、烂嘎参·····
- 27、黄珠子·····
- 28、土大黄·····
- 29、三七王嘎里·····
- 30、日阿吉爬连·····
- 31、没辛嘎里阿石·····
- 32、里克欵致子胆·····

- 33、那黑歛黑歛味莲·····
- 34、克歛致子实克查·····
- 第六章 抗瘟毒药·····
- 1、务及提克·····
- 2、抗苦升麻·····
- 3、里提披趴蜈蚣·····
- 4、尔他所歛信嘎·····
- 5、蒙碰撞莲·····
- 6、乱日阿筒·····
- 7、螃蟹菊·····
- 8、香料·····
- 9、包布七·····
- 10、樱桃·····
- 11、羊毛分筋·····
- 12、铺糯布机纳·····
- 13、科巴给布狮子实克查·····
- 第七章 败血毒药·····
- 1、巴塞寒药·····
- 2、米克罗罗阿捏·····
- 3、日阿吉王嘎里·····
- 4、他色菟菜·····
- 5、尔他香卡蒙·····
- 6、阿田七·····
- 7、莫玉那实克查·····
- 8、土三七·····
- 9、枣司兔姐·····
- 10、拉苦信嘎·····
- 11、抗苦皮条·····
- 12、王三二拉·····
- 13、阿实插泥卡普·····
- 14、黄海棠·····
- 15、金丝梅·····
- 16、贯叶连·····
- 17、元宝实克查·····
- 18、芫花卡普机纳·····
- 19、珍珠哈车·····
- 20、紫血机纳·····
- 21、炮竹布里卡蒙·····
- 22、抗苦务吉提克·····
- 23、灭格歛梯实克查·····
- 24、此巴仙桃实克查·····
- 25、阿嘎七·····
- 26、铺土菊·····
- 27、是噶马兰·····
- 28、盘龙参·····
- 29、泽叶角莲·····
- 30、马菟菜·····
- 31、给司卡普·····
- 32、仍嘎黑歛那夫·····
- 33、里提石留·····
- 34、破趴此波立窝·····
- 35、灯龙卡普·····
- 36、卡普边边实克查·····
- 37、金线吊乌龟·····

- 38、写仔·····
- 39、写罗皮嘎拉·····
- 40、秋胡豆·····
- 41、借从菜·····
- 42、抗苦扁韭·····
- 43、灭哈七·····
- 44、里提胡椒·····
- 45、泽务起起七·····
- 46、泡泡不实克查·····
- 48、莫恩且·····
- 49、阿五瓜·····
- 50、灭当归·····
- 51、贝尔在莲·····
- 52、灭蜈蚣·····
- 53、?? ·····
- 第八章 理气毒药·····
- 1、乌棒七·····
- 2、豌豆七·····
- 3、螃嘎七·····
- 4、日阿灭莲·····
- 5、麦他泽莲·····
- 6、日阿里科倮·····
- 第九章 利水毒药·····
- 1、子是古图科巴·····
- 2、务给龙造·····
- 4、莫糯布实克查·····
- 5 树叶叶伞爹·····
- 6、鬃子实克查·····
- 7、泡卡普卡蒙·····
- 8、灭蜈蚣·····
- 9、钓竿杆·····
- 10、若恩且实克查·····
- 11、搜山利·····
- 12、写扁担·····
- 13、苦酒洒石·····
- 14、泽莲·····
- 15、泽车前·····
- 16、木油卡蒙·····
- 17、面姐弃布里·····
- 18、阿青麦·····
- 19、王爪二拉·····
- 20、通泉实克查·····
- 21、务司布利·····
- 第十章 排肠毒药·····
- 1、土大黄·····
- 2、里提花椒·····
- 3、若克弃布里·····
- 4、灭丝大黄·····
- 5、通草此巴·····
- 第十一章 攻恶毒药·····
- 1、免姐鬼笔·····
- 2、出嘎拉榧子·····
- 3、给节卡普·····
- 4、窝阿实王拉实查查·····

- 5、石龙芮·····
- 6、叶各莲·····
- 7、青苦里·····
- 8、蛋不老·····
- 9、卫矛·····
- 10、借从菜卡普·····
- 11、被亏五爪风·····
- 12、兰八·····
- 13、半枝莲·····
- 14、苦痧药·····
- 15、烙铁科巴·····
- 16、阿实是嘎二拉·····
- 17、窝阿实玉拉实克查·····
- 18、克欵被亏实克查·····
- 19、写灯台·····
- 20、黄药子·····
- 21、独克·····
- 22、癞蛤蟆·····
- 23 物色色铁迫·····
- 24、抗苦尿池·····
- 25、免姐桐·····
- 26、印那这·····
- 27、阿黄连·····
- 28、胡泡泽拉书·····
- 29、卡普斑蝥·····
- 30、金刚二拉·····
- 31、哈列思的瓣·····
- 32、哈列思半支莲莲·····
- 33、抗苦海脚·····
- 34、紫藿草·····
- 35、欢喜卡蒙·····
- 36、二拉贝母·····
- 37、青青标·····
- 38、洋托糯·····
- 39、羊砣罗毕·····
- 第十二章 消肿毒药·····
- 1、写扣子·····
- 2、子泥嘎此巴二拉·····
- 3、子泥嘎被亏二拉·····
- 4、被亏对叶实克查·····
- 5、土甘遂·····
- 6、没嘎石托·····
- 7、木鳖子·····
- 8、阿石托·····
- 9、里提葫芦·····
- 10、利科书·····
- 11、若马实克查·····
- 12、没他泽他色·····
- 13、克欵致子苕哈车·····
- 14、阿八节莲·····
- 15、科香炉·····
- 16、哈列吉米三步跳·····
- 17、地里里翁且伞·····
- 18、罗钱卡他爬·····

- 19、洞菟菜·····
- 20、秋天老司司·····
- 21、独叶一枝花·····
- 22 托儿儿七·····
- 23、王嘎拉科书·····
- 24、抗苦你补·····
- 25、尔他皮嘎江泽泽亏·····
- 26、所泽阿不·····
- 27、二拉实克查·····
- 28、列阿实思的瓣·····
- 29、母业他在莲·····
- 30、利烂嘎七·····
- 31、珠兰·····
- 32 用卡卡蒙·····
- 33 女儿儿糯贴·····
- 34、黄瓜香·····
- 35、卡铁实克查·····
- 36、阿他丁·····
- 37、五星实克查·····
- 38、一蜡被卡蒙·····
- 39、盾形实克查·····
- 40、烟管科巴·····
- 41、千里关·····
- 42、一簪卡普·····
- 第十三章 拔脓毒药·····
- 1、上艾阿实·····
- 2、给节风·····
- 3、兵马·····
- 4、黄花龙牙·····
- 5、冬瓜布里·····
- 6、忙策参·····
- 7、漏芦·····
- 8、免姐走马胎·····
- 9、泽移时布里·····
- 10、败酱草被亏·····
- 11、尔他若欸参·····
- 12、败酱实克查·····
- 13、叶喙黑欸·····
- 14、那土广木香·····
- 15 贝尔尔二拉·····
- 第十四章 化痰毒药·····
- 1、癩疔草·····
- 2、哈列列迫·····
- 3、阿实屁屁二拉·····
- 4、窝盘卡普·····
- 5、动蕊卡普·····
- 6、泥胡菜·····
- 7、阿菖蒲·····
- 8、远志被·····
- 9、南迷迷米·····
- 10、子牙皂·····
- 11、空心杆·····
- 第十五章 驱兽毒药·····
- 1、日阿列碰被亏·····

- 2、面萨尔尔他·····
- 3、金鸡列碰·····
- 4、烟尔他·····
- 5、斑叶兰·····
- 6、箭那致·····
- 7 江泽泽二拉·····
- 8、抗苦撒拉·····
- 9、大汗古泽此巴·····
- 10、仙桃草被·····
- 20、弃布里七·····
- 21、万年信嘎·····
- 22、长蕊恰亏哈·····
- 23、土常山·····
- 24、母业烂嘎机纳·····
- 25、免姐阿捏·····
- 26、相思铁迫·····
- 27、莫吉迷他色·····
- 28、网补此·····
- 第十六章 解食毒药·····
- 1、岗梅根·····
- 2、葫阿尔车·····
- 3、他爬那卡蒙
- 4、科屁屁二拉·····
- 5、积雪实克查·····
- 6、三丫苦尔他·····
- 7、千斤坠·····
- 8、岗稔根·····
- 11、阿信捧被·····
- 12、千年矮·····
- 13、孔雀列碰·····
- 14、灯盏七·····
- 15、降龙草·····
- 16、杯子七·····
- 17、细梗胡枝子·····
- 18、唯的二拉·····
- 19、海金子·····
- 9、猫枞卡普屁屁·····
- 10、务气起实克查·····
- 11、窃衣·····
- 12、抗苦多不·····
- 13、马胡梢·····
- 14、他司二拉·····
- 15、化食草·····
- 16、甜瓜借那·····
- 17、热撒思欸·····
- 18、日阿尼嘎列碰·····
- 19、铺早早思·····
- 第十七章 破蛊毒药·····
- 1、傥色点点·····
- 2、日阿列·····
- 3、石托·····
- 4、安息香·····
- 5、龙闹香布里·····
- 6、刮金板·····

- 7、科卡普实克查·····
- 8、抗苦叶叶花·····
- 9、石榴机纳·····
- 10、桃子·····
- 11、榉卡蒙他爬·····
- 12、次主他爬·····
- 15、广趴古七·····
- 第十八章 杀虫毒药·····
- 1、色铁迫一窝倮·····
- 10、阿卡八卡普·····
- 11 迷迷米咚东·····
- 12、红框布里·····
- 13、母业苓·····
- 14、不此哈车·····
- 15、剥削利尔他·····
- 16、克欵致子参·····
- 17、苦楝他爬·····
- 18、茶哭·····
- 19、哈列错布·····
- 20、那土不里·····
- 21、粗框·····
- 22、粗糠柴·····
- 23、野棉花·····
- 2、山兰·····
- 3、抗苦柏列思·····
- 4、抗苦去布里·····
- 5 见他他此巴·····
- 6、红袍此巴·····
- 7、哈列此巴切实实克查·····
- 8、用他他爬·····
- 9、米哈实克查·····
- 24、莫翁且·····
- 25、窝糯梯·····
- 26、被拉得实克查·····
- 27、南椿木机纳他爬·····
- 28、蓼子草被亏·····
- 29、雄黄·····
- 30、阿芹菜·····
- 31、拉铁卡布里·····
- 32、水银·····
- 33、铝矿阿八·····
- 34、炮磺·····
- 35、马桑尔他·····
- 36、鸡骨常山·····

附 录
常用药名笔画索引
土家语汉字笔画索引
拉丁学名索引
主要参考书目及资料
后 记

编写说明

1、编写体例：分上篇、下篇、附录三部分，上篇为治毒药物概述部分，分为二章。下篇为各论，按药物分类，分为十八章。附录为药物土家语名索引、常用名汉语、拉丁学名索引、主要参考著作文献目录、后记四小部分。治毒药物细目分为：土家语名、常用名、别名、来源、性味、功效、主治、用量、备注、备考一十一个小目。

2 药物分类：土家医治毒药物基本上具备一种主要功效，有的还具备其他功效，在分类上按主要功效列入本类条目，次要功效在功能主治上体现。

3、每日用量：采用克为计算单位，根据名老土家医经验，取平均值作为常用量列入本书中，供临床医生应用时参考。

4、用药安全性：土家医认为“是药三分毒，药入人体，有病病挡，无病伤体”。治毒药物具有一定的攻伐性，部分药还有一定的毒性，个别有剧毒，在应用中应把握好度和特殊加工炮制。

5、对于慢性毒气病，治疗时间长，某些药物在体内排泄慢，要防止积蓄中毒；某些药物长期服用可能有伤胃、损肝、坏肾、害血个别现象，所以，有肝、肾、胃、血疾病者慎用、忌用。所以，本书的经验方只供临床医生参考，不推荐给患者直接抄方使用。

6、剂型选择及服法：内服：一般多用汤剂，每日一剂水煎服，注意先煎后下、生药取汁服、粉散剂冲服等。按疾病用，急性病治多用粉散剂吹鼻以开窍醒神、含服通心、吞服止痛、止呕、止泻、止血以应急；慢性病长时间服用可加工成蜜丸、膏剂、酒剂。外用：一般采生品洗净捣烂外敷局部、穴位，或干品研粉水调或加赋型剂调匀外敷局部。

7、药物土家语名：本书药名采用土家族母语存留区一湖南龙山坡脚土家音准。外来语等用土家语注音。

8、药名：用土家语语名，由于过去土家族没有文字，现采

用汉字记音和土家族，拼音字母注音。汉字记音只用其音、字义无意义无汉字的音、用日阿格等读其切音。外来语沿用，并注土家语及国际音标。常用名用大多数人采用的汉语汉字；有些药名有同物异名现象，来源一律按科属、拉丁学名、药用部位，有些药名不同，但同一种植物，本书中第一次出现后，在其他章节不再次录用。

9、应用经验方：一部分为作者多年临床经验，一部分来源文献及民间名老土家医调研方，有的作者在临床上应用过，有的未在临床中应用。有些药物应用经验为单味药方，在主治病症中有主症名，也同样是经验应用，未列举“临床应用”专条。

10、主治症名，多数是土家医症名，如与现代医学类似的另立条目，现代医学某某病参照土家医某某症治疗。供应用参考。

11、备考内容：从参考书中摘录有关部分，作者只是证实土家医治毒药物的机理，供临床参考。

12、由于作者临床工作受约，拜师学艺中对某些个别中毒病例临床经验不多，不能提供安全有效土家医方药，但在基层又常遇到需及时救治，为了方便基层工作者，摘录少部分现代医学中有效方法、药物在该病症中，供抢救过程中参考使用。

绪 论

土家族为土著民族，以“毕兹卡”（或毕际卡）为族称，世代大部分人口居住在武陵山脉地区的崇山峻岭，河流溪沟边。武陵山脉接云贵高原东麓，主峰贵州梵净山海拔 2498.8 米，海拔最低点在湖南西洞庭湖平山，只有 100 米以下。是我国黄河以南最古老的台地。现在行政区包括湖南的湘西自治州、张家界市、怀化市以及贵州铜仁市、湖北省恩施州和重庆市黔江区。武陵山区特殊的地理环境适应生物多样性生长，其中药用动植物据不完全统计达 2000 余种，是华中天然药物药库。千百年来，生活在这里土家族儿女，充分利用大自然赐赋的动植物药材，在本民族传统文化和医学理论指导下，用于健康保健，防病治病，积累了丰富经验和安全有效方药，到现在为止仍是土家族民间与西医、中医共同构建的主流医学体系。土家医治毒药物仅是其中的一小部分。

一 土家医治毒药物的形成和发展轨迹

土街的治毒药物的形成主要是由“毕兹卡”人长期居住环境、生产方式、生活方式所决定，由历代土家医“药匠”在实践中不断探索、总结，发展而完善，形成一种特殊学派，是土家医集体智慧的结晶。

（一） 土家医治毒药物的起源

土家族人民过去居住在交通十分闭塞的蛮地，过着刀砍火种，捕鱼打猎的次原始生活，随时与毒气、毒物、毒兽、毒虫密切接触而发生疾病。开始对本类疾病认识不清，认为是“天放毒邪”，乞求神灵保佑，巫医施法，形成早期巫医。

在与疾病抗争的过程中，看到巫医法术不能救治毒气类病，个别人自采植物根茎、叶服用，使部分病人得到缓解和痊愈，后经多数人遇见此类病人用此物服用，能转危为安，就这样，一个

传授一个，一代传授一代，使这一方法得到保护和传承，形成了古老的口碑文献史料，便产生了早期的土家医药治毒方药。

（二）土家医治毒药物体系的形成

经过原始医药积累，土家医治毒药学在明、清时期初见雏形，部分有志之士借助汉字开始著书立书，如《医方守约》、《南垣医抄》、《玲珑医鉴》、《本草精粹》、、、、、等一批手稿和著作问世，在内容上除一部分民间中医知识外，收录了大量土家医药文献。将土家医毒气病症及治毒药物收录其中，大部分口碑文献在医道中流传，对毒气、毒邪等病因有了更新的认识，治毒药物更加普及和品种增加，治毒理念更趋成熟。据不完全统计，此时治毒药物有 300 余种，治毒方剂有 100 余个，治愈病案逐步增多，毒气病症治理论框架初显，毒气病学说可见一斑，其学科开始形成。

（三）土家医治毒药物的科学创新发展

在清末、民国时期，由于列强入侵，社会动荡，政体不稳，对于土家医药的学术发展受到严重干扰，使土家医毒气学说得不到发展，只限于在民族民间应用。

新中国成立后，党中央、人民政府高度重视民族医药的发展，党和国家领导人多次在全国会议上作出指示，毛泽东主席提出“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加于提高”。在毛泽东思想指导下，20 世纪中后期，得到政府高度重视，一个群众性“中草药运动”得于开展，使在民间的土家医药口碑文献得到挖掘，并推广应用，文献资料得到收集整理，在医学理论上相继出版了《土家族医药》、《土家族医药学》土家族药学等著作；在药物挖掘整理上，湘西自治州、鄂西自治州开展“中草药资源普查”，编写了《湘西自治州中草药资源报告集》，《恩施中草药资源报告集》各收集药物品种 1000 余种，大部分为土家族药物，其中有不少治毒药物，其中附方部分为土家医治病经验方，包含治毒方子。

在 21 世纪初，部分土家医药临床和研究工作者，在挖掘现

存的土家医文献中和在田野调查中经过整理，又出版一些有价值的著作，如：《土家族医药史》、《土家医方剂学》、《土家医妇科》、《土家医药概论》等著作。其中也收集了不少土家医毒气学说内容，经过整理，在相关杂志上发表了不少文章；理、法、方、药理论研究，取得突破性进展，使土家医毒气病学恢复了原有的本来面貌。

二 土家医治毒药物核心思想内容

土家医毒气学说是土家医学核心思想之一，它包括毒气病因学、毒气病机学、毒气病症候学、毒气病症治学、治毒方剂学、治毒药理学、毒气病服侍学等七个方面内容。

（一） 治毒药理学基础

1、土家医毒气病治法

治法为核心，是原则，是前提，治法决定选药组方。土家医根据毒气病病因、病机、证候表现，对常见毒气病治疗归纳为：

攻毒法：对于毒气重，病情急、危的毒气病，需用猛药攻其邪，故组方用药应选性烈之品，直捣毒穴，达到除毒保体目的。临床主要用于对烈毒症、瘟毒症、脓毒症的治疗。代表方有：牛角败瘟汤、银花败毒汤、千年老鼠尿汤等。

败毒法：适用于毒气亢盛，但平素身体壮实的患者。如火毒症，治疗上多选用大寒性药品，以迅速消除毒邪，达到祛毒保体目的。代表方有：功劳败火汤、黄连石膏汤等。

赶毒法：适用于毒邪蓄积于体内者毒气内存扰乱机体，致受损器官功能减退。用赶毒药物驱赶体内毒邪，使毒邪排除体外，达到祛邪目的。临床上常用于对水毒症、食毒症、气毒症、血毒症的治疗。代表方有：搜山虎汤、通条散，赶血三七丸。

清毒法：适用于中毒程度不重，呈弥漫状态的毒气病患者。毒气未完全入里，介于体表内脏之间，呈弥漫状态，攻法太重，散法不及，用清毒法来解除毒气为宜。代表方有：双解汤、升麻汤等。

排毒法：适用于毒气停滞体内，不能自行排出的患者。如水毒症、中满症、尿急症等。对于水毒内侵，停留在皮下、腹内不能排出患者多用此法。代表方有：木通灼心汤、柿把瓜带散、猪头排水丸等。

拔毒法：适用于治疗因毒气附于器官组织、粘连不开而致的毒气病。毒气入侵人体，粘附于相应的器官、组织，引起病变，散、赶不能动，在外可用刀割剔出，在内选用性烈有毒药物，消除毒气。如巴达毒邪引起的瘤子、肿块等症。代表方有：虎掌拔毒膏、猫爪**拔毒散**等。

化毒法：适用于毒气侵体日久，缠绕成结不化的患者，如结石病、停血症、干血症等。通过化解使毒气成微粒状后经代谢排出体外。代表方有：化全石散、连线化毒汤、化毒散血方等。

散毒法：适用于毒气滞于肌肤、骨节缝之间的患者。对毒气浸入人体，滞于肌肤、骨缝、肚肠之间的患者。通过用发散之品进行蒸发，使毒从孔穴排出。如寒结症、气结症、冷气症、湿气症等。代表方有：黄花解毒汤、透身汗散、愆气伤肝汤。

解毒法：适用于毒邪直中，尚未完全进入气血的患者。对毒气从口鼻入肚、肺，尚未完全吸收者，或毒气从皮肤而入，大部分毒气尚在皮下肌肉者。用此法驱除毒气可获较好疗效。如食物、药物中毒，酒中毒、煤气中毒、毒箭中毒等。代表方有：桐油催吐方、绿豆解毒汤、箭毒散、清肺解毒散等。

放毒法：适用于毒气滞于体表或侵犯四肢远端而未入内的患者。如痧毒在表不能出，或虫毒咬伤，毒液刚入皮内、还在远血之端。用此法迅速追毒出外，防止入里。常用方法有小刀放毒法、刺放放毒法、外敷药物吸毒法等。

提毒法：是针对毒气留滞不散的患者，通过皮肤或穴口吸负毒气提毒外出，对寒毒在骨节或脓毒不出，或恶毒在脏腑多选此法治疗。代表法方有：提毒膏、寒毒膏、消肿散结膏、提毒散等。

调毒法：适用于毒气不重，身体虚弱的患者。对体虚者感染

毒气，或毒气滞留日久导致体虚者，因**虚实夹杂**，单纯除毒易伤体，补虚易助毒。采用调毒法，除毒与补虚并用，可达“补虚不留邪”，“除毒不伤体”之目的。两者孰多孰少应根据毒气的轻重和身体虚弱程度灵活应用。代表方有：土参调毒汤、羊雀补体汤等。

2、治毒药物分类

土家医根据药物性能、功效、主治不同，将治毒药物分为祛风毒药、散寒毒药、清热毒药、退火毒药、消肿毒药、抗瘟毒药、攻恶毒药、赶湿毒药、理血毒药、赶气毒药、化痰毒药、拔脓毒药、解食毒药、破蛊毒药、解兽毒药、杀虫毒药等十八类。

(二) 土家医治毒药物科学内涵

根据治毒药物功效主治，通过试验、查询有关文献，充分证实治疗的有效性。通过抗病原体，及药物化学、药理学试验，证实传统土家医的科学性。

1、祛风毒类药，用于治疗流感药物具有抑制病毒作用，组方具有解热镇痛，改善临床症状作用。用于治疗感冒、风湿类关节痛。

2、清热毒药、退火毒药、消肿毒药，大部分具有抗菌作用，对链球菌、革兰氏阳性、阴性球菌、杆菌有不同程度抑制作用，经组方用于治疗细菌性肺炎、扁桃体炎、肺脓疡、细菌性痢疾、皮肤化脓性感染等。

3、攻恶毒药，对肿瘤细胞有抑制细胞生长作用，证明对多种肿瘤有广谱抑制作用，通过组方，能改善临床症状，缓解疼痛，改善胃肠功能和免疫调节作用，能有效延长生存期，提高生活质量。

4、驱兽毒药，经临床应用证实具有解蛇毒、狂犬毒作用，用于治疗毒蛇咬伤症、狂犬病。

5、解食毒药，经试验和临床应用，对食物中毒有解毒作用，对矿物中汞、铅、铜等中毒，能促进排泄，临床用于治疗食物中

毒、汞、铅、铜等矿物慢性中毒。

6、抗瘟毒药，对于流行性传染性疾病，能有效抑制病原微生物，阻断病情的漫延，使患者转危为安，降低死亡率。

7、赶气毒、理血毒类药，主要能降解体内自身代谢的致病物，如高血脂、高血尿酸、高血糖，能增强机能代谢，减少疾病的发生。

（三） 治毒药物的实用价值

土家医药具有简、便、效、廉的价值特点，适用社会基层农村、社区，符合世界卫生组织提出的人人享受健康的目标和国家“三农”政策，对疾病预防和早期治疗具有现实意义。

1、土家医治毒药物组方严谨，符合土家医药组方原则。

治毒方子一般只有 5~7 种药物，少则 1~2 种药物，多者 12 种药物，按照“主、邦、客、信”组方原则配方。对于救治，危重患者多采用峻猛、新鲜的大剂量药物直捣毒邪，属于对抗降解法。对毒邪轻，病程长者，多采用调治法。治毒药物都具有攻伐性，一般中病即止，十去八九停用。治毒药物组方，采用“以毒攻毒”原则。在主药毒性大时多在方中配“客药”以纠药物偏性，防止药物中毒。土家医治毒药物药源广泛，生长适应性强，随手可采，具有简便特点。

2、识证辨毒，量邪论治的临床实用价值。

临床是任我要学学科的根本，临床是检验药物有效性和安全性的试金石，治好病无毒性或可控的小毒性才是硬道理。

土家医在看病识症临床治疗学理论指导下，创建识证辨毒，量邪论治观，用于毒气病的治疗。在历代土家医共同努力下，根据临床实践，将毒气病不同的病因分为天毒疾、生毒疾、篤毒疾等三大疾和时气病、风毒病、寒毒病、热毒病、火毒病、瘟疫毒病、恶毒病、气毒病、血毒病、痰毒病、水毒病、毒肿病、食毒病、蛊毒病、虫毒病等十八种病，根据临床表现又分为着凉症、鸡窝症等百余种症。在识证辨毒的前提下，进行量邪论治。临床

上根据体内毒邪的多少，入侵部位的深浅，发病的时间长短、毒邪伤害的程度、体质的强弱进行遣方用药。据文献不完全统计，治毒药物有八百余种，常用五百余种。我们通过研究，按土家医毒气病分为十八类，供临床辨证选药。土家医药是经验医学，经过历代土家医多名医务人员反复临床实践，总结出系列治疗方法，形成了大量有效方子。本书在每种药中收录了一个或几个经验方，供临床医学参考，结合病症和患者体质加减应用。

各 论

第一章 祛风毒药

土家语名：热中毒诊业药

土家语拼音：ref sux duf zenx nier yaof

国际音标：ze³⁵ su⁵⁵ tu³⁵ tsen⁵⁵ ʒie²¹ jau³⁵

凡具有发散体表风邪、驱赶体内毒邪的功效，用于治疗风毒病的药物称祛风毒药。

土家医认为风毒邪气是自然界中的一种含有毒邪的风，经皮入内而发病；另一种是体内烈热之邪伤筋的液生风毒之邪而发病，两者统称风毒邪气。其病理变化为皮肤空虚，汗孔失灵，风扇动筋，筋失所养。临床症状和体征因毒邪种类和部位不同而表现各异，一般有怕风，易出汗，疼痛行走不定，病情变化多端，抽搐舞动，舌苔白，脉浮。

治风毒药具有散风邪和驱毒外出的双重功效，主要治疗风毒病症。但某些药还兼有除湿止痛，解蛇毒的功效，经配方用于治疗风湿病、胃脘痛，毒蛇毒虫咬伤症。

常用治风药有：三加皮、山芝麻、水蜈蚣、白梓树、爬山虎、臭梧桐、鸡矢藤、接骨藤、野生麻、喉咙草、糖米根、小风尾、马桑叶、大力子、叶下红、药王刺、蜈蚣草、穷树叶、四匹箭、节节蚂蟥、怪树、破子草、泡桐根、草灵仙、九龙盘、扇子七、银线草、化香树、女谷、珍珠连、线盖、山雷子、雷公藤、扣子果、王辣炸、乌梢蛇、土公蛇、蜈蚣等。

1、三加皮

【土家语名】三加他拔[sanx jiax tax par][san⁵⁵ tɕian⁵⁵ t'a⁵⁵ p'a²¹]

【别名】刺三加、三叶飞甲。

【来源】为五加科植物白筋 *Acanthopanax trifoliatum* (L.) Merr. 的根及根皮。

【性味】辛、苦，微温。

【功效】祛风解毒，舒筋活络。

【主治】风毒症，着凉症发热、咳嗽，风湿痹痛。

【用量】6~10g。

【应用经验】风毒骨节痛症：三加皮（根）15g 七加风 10g 五加风 10g 刺芭根 10g 四匹箭 7g 白龙须 5g。每日一剂，水煎二次服，忌生冷。

【备考】根皮煎剂对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌有抑制作用。

2、山芝麻

土家语名：抗苦写不

土家语拼音：kanr kux xiex bur

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ ɕie⁵⁵ pu²¹

【别名】亚麻。

【来源】为亚麻科植物野亚麻 *Linum stelleroides* Planch. 的全草和种子。

【性味】甘，平。

【功效】祛风解毒，养血润燥。

【主治】风毒症、风坨症之皮肤瘙痒，血虚便秘，疮痈肿毒。

【用量】6~10g。

【应用经验】皮肤风毒痒症：山芝麻（全草）20g 红浮萍 10g 七加风叶 10g 小蜂窝 3g。每日一剂，水煎二次服，忌生冷、化物。

3、水蜈蚣

土家语名：泽蜈蚣

土家语拼音：cer wur gongr

国际音标：ts'e²¹ wu²¹ kuŋ²¹

【别名】三棱草、顶天珠、散寒草、蜈蚣七、酸猴儿。

【来源】为莎草科植物水蜈蚣 *Kyllinga brevifolia* Rottv. 和单

穗水蜈蚣 *K. monocephala* Rottb. 的全草。

【性味】辛、甘，平。

【功效】祛风毒邪，止咳化痰，活血消肿。

【主治】风毒症、着凉症、三分症（奔波），咳嗽，百日咳，蛇咬伤，疮疡肿毒，皮肤痒。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、风寒咳嗽、百日咳：水蜈蚣 15~30g，加红枣 3 枚，水煎服。
- 2、跌打损伤：水蜈蚣 500g 捣烂，加酒 120g 捣匀，滤取酒 60g，内服，渣炒热外敷患处。
- 3、透疹：水蜈蚣 浮萍 水竹叶 小杆子 水灯草各 20g，水煎服。

【备考】对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有抑制作用，可使血液中疟原虫减少。

4、紫皮树

土家语名：克歛舍色他爬

土家语拼音：keif sex ser tax par

国际音标：k³⁵ei se⁵⁵ se²¹ t⁵⁵a p²¹a

【别名】紫皮白里。

【来源】为漆树科植物毛叶黄栌 *Cotinus coggygia* Scop. var. *Pubescens* Engl. 的根及枝叶。

【性味】辛、苦，寒。

【功效】祛风毒，活血散瘀。

【主治】风毒症，风坨症，之皮肤瘙痒，跌打损伤，骨折，虚肿。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、皮肤瘙痒：白梓树叶 90g 三角枫 60g 煎水洗。
- 2、跌打损伤、骨折：白梓树叶 接骨木叶 八棱麻叶 麻根各

适量，捣烂敷患处。

5、鸡矢藤

土家语名：日阿色二拉

土家语拼音：rar ser ef lax

国际音标：za²¹ se²¹ e³⁵ la⁵⁵

【别名】臭气藤。

【来源】为茜草科植物鸡矢藤 *Paederia scandens* (Lour.) Merr.，全草及根。

【性味】辛、苦，平。

【功效】祛风解毒，活血止痛，燥湿杀虫，消食导滞，解农药毒。

【主治】虚肿症（肝脾肿大症）、瘟黄症、湿毒症、血毒症、风湿痹痛、外伤疼痛，有机磷农药中毒症。

【用量】10~15g。农药中毒 200g~300g。

【应用经验】风毒四节酸痛症：鸡矢藤 30g 刺苞根 15g 巴岩香 10g 血通 10g 青风藤 15g 羊乌根 15g。每日一剂，水煎服二次服，忌生冷。

【备考】

- 1、鸡矢藤注射液能明显提高痛阈，且与药物浓度成正比。
- 2、浸剂对麻醉猫有降压作用。
- 3、对金黄色葡萄球菌及痢疾杆菌有抑制作用。
- 4、鸡矢藤制剂可提高肝微粒体细胞色素 P₄₅₀ 的含量。
- 5、对离体动物的肠平滑肌有抑制作用。

6、爬岩仙

土家语名：巴岩姜

土家语拼音：bax ngair jianx

国际音标：pa⁵⁵ ŋai²¹ tɕian⁵⁵

【别名】三叶爬山虎、爬岩姜、毛姜、湿姜、猴姜、骨碎补。

【来源】为葡萄科植物爬山虎 *Parthenocissus tricuspidata* (Sied. et Zucc.) Planch. 的藤茎及根皮。

【性味】甘，温。

【功效】祛风解毒，活血通经。

【主治】偏头痛症，风湿播杵症，半身不遂，跌打损伤，痈疔肿毒等症。

【用量】10~15g。

【应用经验】

1、偏头痛：爬山虎 30g 川芎、当归各 9g 大枣 3 枚煎服。

2、风湿痹痛症：爬山虎 15g 山豆根 茜草各 12g 水煎服。

3、痈肿、创伤：爬山虎根皮适量，烘热敷患处。

【备考】爬山虎的粘液质对口腔、消化道粘膜有轻度消炎（保护粘膜）的作用。

7、臭梧桐

土家语名：南八

土家语拼音：lanr bar

国际音标：lan²¹ pa²¹

【别名】大臭牡丹、臭桐。

【来源】为马鞭草科植物海州常山 *Clerodendrum trichotomum* Thunb. 的枝，叶。

【性味】辛、苦、微甘，平。

【功效】祛风解毒，除湿止痛。

【主治】偏头痛，风湿痹痛，筋脉不利，痔疮，疔肿，湿疹，虚阳灌顶症（高血压），偏头痛，痢疾等症。

【用量】6~10g。

【应用经验】风毒皮肤痒症：臭梧桐根皮 50g 红活麻草 30g 岩防风 20g。每日一剂，水煎二次外洗患部用，忌鱼、虾蛋。

【备注】毒性：毒性或不良反应较小，偶见有乏力、恶心、腹泻

等反应。

【备考】

- 1、降压作用：其降压作用较缓慢，一般服药后1~2周，头痛，头晕，失眠等症状的改善；连续服用4~5周后，血压明显下降。
- 2、镇咳与镇痛作用：可延长戊巴比妥钠的麻醉作用，煎剂有明显的镇痛作用。

8、破棉絮

土家语名：灭皮嘎拉

土家语拼音：mief pir gaf lax

国际音标：mie³⁵ pi²¹ ka³⁵ la⁵⁵

【别名】小四方消、岩薄荷。

【来源】为**叫做科**植物邻近风轮菜 *Clinopodium confine* (Hance) O. Ktze. 的全草。

【性味】辛、苦，凉。

【功效】解表祛风，解毒消肿。

【主治】风毒病之伤寒症，头痛发热，咳嗽，痈疽肿毒，蜂刺伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】皮肤风毒疮：破棉絮 20g 九里光 20g 木油子根皮 15g 五爪龙 10g。每日一剂，水煎洗患处，每日二次。

9、接骨藤

土家语名：鲁嘎阿纳二拉

土家语拼音：lux gax ax nar ef lax

国际音标：lu⁵⁵ ka⁵⁵ a⁵⁵ ʔa²¹ e³⁵ la⁵⁵

【别名】接骨风，搜骨风，追骨风。

【来源】为紫葳科植物凌霄 *Campsis grandiflora* (Thunb.) Loisel. 和美洲凌霄花（硬骨凌霄）*C. radicans* (L.) Seem. 的根。

【性味】甘、酸、苦，寒。

【功效】祛风解毒，活血消瘀。

【主治】肿痛风症，风湿痹痛，跌打损伤，脱臼骨折，血热生风，风疹等。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、肿痛风症（痛风）：接骨藤 6~9g，浸酒或以酒煎服。
- 2、跌打损伤、骨折：接骨藤适量，捣烂敷患处。
- 3、风湿关节痛：接骨藤 15g。水煎或酒泡服，或紫葳根 抱石莲 络石藤 白毛在各 6g。水煎服。

10、小叶蜂窝草

土家语名：尔他被米马桶实克查

土家语拼音：ex tax bif mix max tongx sir ker car

国际音标：e⁵⁵ t'a⁵⁵ pi³⁵ mi⁵⁵ ma⁵⁵ k'o⁵⁵ si²¹ tuŋ²¹ ts'a²¹

【别名】小马窝。

【来源】为爵床科植物环状马篮 *Strobilanthes cyclus* C. B. Clarke ex W. W. Sm. 的全草。

【性味】微苦，平。

【功效】祛风解毒，除湿止痒。

【主治】走游风症，疮疖肿痛等症。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】走游风症：蝉壳草 20g 野胡萝卜子 10g 苦参叶 15g 罗钱松皮 10g。每日一剂，水煎二次服，忌鱼虾蛋。

11、糖米树根、对叶散花

土家语名：料米卡蒙机纳

土家语拼音：tanr mix kar mongr jix lar

国际音标：t'an²¹ mi⁵⁵ k'a²¹ mong²¹ tɕi⁵⁵ la²¹

【别名】抱鸡母树、风桃树、野檀树、小鱼蜡树。

【来源】为山矾科植物白檀 *Symplocos paniculata* (Thunb.) Miq. 的根。

【性味】苦、涩，微寒。

【功效】祛风解毒，攻恶毒，消肿止痛，软坚散结，调气。

【主治】风湿热痛症，乳痈，丸子症，疝气，肠痈，胃癌，疮疖。

【用量】10~15g。

【应用经验】皮肤风毒肿症：糖米树根皮、懒泥巴根皮、糯米条、黄剥皮各 10g。水煎取液擦洗患处，每日二次。

12、十八症

土家语名：十八症

土家语拼音：sir bar zenf

国际音标：si²¹ pa²¹ tsen³⁵

【别名】歪叶子。

【来源】为胡椒科植物光轴苕 *Piper boehmeriaefolium* Wall、var. *lonkinesec* Dc、的全株。

【性味】辛，温。

【功效】祛风散寒，消瘀止痛。

【主治】风湿筋骨痛、跌打肿痛、胃寒疼痛、毒蛇蜈蚣咬伤、着凉症。

【用量】3~10 克。水煎服。

【应用经验】

1、风湿麻木症：十八症 10 克 小木道 6 克 胃碎？ 15 克 防风 10 克 扣子七 10 克 百锋根 3 克。每日一剂水煎 2 次服。

2、肚寒腹痛：十二症 10 克 豆豉姜 10 克 透身枣 3 克 鸡蛋壳 30 克 碧血雷 10 克。共研细末，每次 4 克冲服。

【备注】场行小毒。

13、恶实

土家语名：恶实

土家语拼音：wof sir

国际音标：wo³⁵ si²¹

【别名】牛蒡子、鼠粘子、大力子、毛锥子。

【来源】为菊科植物牛蒡子 *Arctium lappa* L. 的成熟果实。

【性味】苦，凉。

【功效】祛风赶毒，清热透疹。

【主治】风疹块，风热，麻疹，咽喉肿痛。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、头晕呕吐、沉睡昏蒙：牛蒡子 30g 旋覆花 15g（布包下）水煎服。

2、感冒发烧、咽喉肿痛：牛蒡子 9g 荆芥穗 防风各 6g，连翘板蓝根各 12g 薄荷 甘草各 3g。每日一剂，水煎服。

3、麻疹不透：牛蒡子 葛根各 6g 蝉蜕 薄荷 荆芥各 3g。每日一剂，水煎服。

【备注】有毒。

14、叶下红

土家语名：矮地茶

土家语拼音：ngaix dif car

国际音标：ŋai⁵⁵ ti³⁵ ts'a²¹

【别名】矮地茶、野枇杷、矮脚草。

【来源】为紫金牛科植物平地木 *Ardisia japonica* (Thunb.) Bl. 的全株。

【性味】辛、微涩，平。

【功效】赶风毒，止咳化痰。

【主治】痰咯症，亮肿症，劳咳症，痛经，风湿骨痛，跌打损伤等。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、肺热咳嗽、吐血：叶下红 30g 吉祥草 30g。水煎服。
- 2、跌打损伤：叶下红 30g 野牡丹根 30g。水煎，兑酒服。
- 3、疮肿：叶下红捣烂外敷患处。

【备注】场行小毒。

【备考】有抗菌与抗病毒作用。

15、金莲花

土家语名：科莲花

土家语拼音：kox lianr huax

国际音标：k'o⁵⁵ lian²¹ xua⁵⁵

【别名】铁血子，旱地莲，金芙蓉。

【来源】为毛茛科植物金莲花 *Trollius chinensis* Bunge 的花。

【性味】苦，寒。

【功效】祛风赶毒，消肿止痛。

【主治】乳蛾肿大症，胀耳症，皮肤红丝症。

【用量】6~10g。

【应用经验】风热毒气症：咽喉肿毒。金莲花 15g，白开口箭 6g，山豆根 10g，虫退 6g。每日一剂，水煎二次服，忌辛辣。

16、药王刺

土家语名：牛王刺

土家语拼音：niur wanr cif

国际音标：uiu²¹ wan²¹ ts' i³⁵

【别名】阎王刺，牛王刺。

【来源】为豆科植物云实 *Caesalpinia sepiaria* Roxb. 的根、种子。

【性味】根：苦、辛、温。子：辣、苦、温。

【功效】祛风毒，止痛，赶湿杀虫。

【主治】根：风湿痹痛，小伤寒证，慢性腰腿痛。子：小儿疳积，痢疾，乳痈。

【用量】6~10g。

【应用经验】风湿痹痛症：药王刺根 30g 黑骨风 10g 四匹箭 10g 丝绵皮 10g 红牛膝 10g。每日一剂，水煎二次服，忌生冷。

17、凤尾草

土家语名：喷列切实克查

土家语拼音：penf ler pongf sir ker car

国际音标：pen³⁵ lie²¹ p'uŋ³⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】凤尾蕨，金鸡尾。

【来源】为凤尾蕨科植物凤尾草 *Pteris nervosa* Thunb. 全草入药。

【性味】辛，凉。

【功效】祛风毒，祛湿热。

【主治】黄疸，泻痢，水肿，淋脓，烫火伤。

【用量】内服 10~15g，外用鲜品适量。

【应用经验】

1、劳伤：凤尾草 杜仲 双肾草 故纸各 30g。煮水过滤，再用猪腰子一对和滤液煮熟吃。

2、热泻、痢疾、咽喉痛：凤尾草 30g，水煎服。

【备考】1、1、化学成分：含黄酮类、甾醇、氨基酸、内酯或酯类、酚性成分。

2、2、药理作用：抑菌试验，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、痢疾杆菌、人型结核杆菌均有抑制作用。

18、蜈蚣草、牛肋巴

土家语名：蜈蚣实克查

土家语拼音：wur gongr sir ker car

国际音标：wu²¹ kuŋ²¹ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】小贯众、蜈蚣蕨、舒筋草、合叶贯仲。

【性味】甘，凉。

【来源】为凤尾蕨科植物蜈蚣蕨 *Pteris Vittata* L.，根茎入药。

【功效】祛风毒，活血，杀虫，解蛇、蜈蚣毒。

【主治】风邪头痛，风湿疼痛，蜈蚣咬伤，疥疮。

【用量】10~20g。

【应用经验】

1、风毒头痛症：蜈蚣草根 15g 钓鱼竿 10g 赶山鞭 15g 小木姜根 10g 白雷七 10g。每日一剂，水煎二次服，忌风寒。

2、疥疮：牛肋巴 60g，一扫光 120g，大蒜杆（干品）120g，煎水洗，一日三次，另取白土茯苓、白鲜皮、一把中各 30g，八爪金龙 12g，水煎服，一日三次。

3、风湿麻木：牛肋巴、小血藤、木防杞各 12g，泡酒服。

19、穷树叶

土家语名：猫从尔他

土家语拼音：maox congr ex tax

国际音标：mau⁵⁵ ts'uŋ²¹ e⁵⁵ t'a⁵⁵

【别名】马尾松顺，松针。

【来源】为松科植物马尾松 *Pinus massoiana* Lamb.，叶，皮入药。

【性味】苦，温。

【功效】祛风毒，止痒消坨。

【主治】风湿关节痛，皮肤风坨症。

【用量】10~15g。

【备注】量大可致恶心、呕吐。

【应用经验】风痰箍脑症（高血脂）：穷树叶 30g 白果叶 10g 丝绵叶 10g。打细粉，分三次泡服。每日一剂。

20、四匹箭

土家语名：惹皮箭

土家语拼音：rev pir jianf

国际音标：ze⁵³ pi²¹ tɕian³⁵

【别名】四方箭，及己、四块瓦、小金丝兰、小细辛。

【来源】为金粟兰科植物及巴 *Chloranthus serratus* (Tnunb.) Roem.
er Schult., 根及全草入药。

【性味】辛，温。

【功效】祛风毒，消肿痛。

【主治】风湿腰痛，肿毒，疔疮，毒蛇咬伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、脘腹痛：四块瓦根 3~5g（鲜品 15~20g）水煎服或泡酒服。

2、风湿疼痛：四块瓦根 3g 秦艽 15g 青木香 10g 铜锣七（金线吊乌龟）15g
红四块瓦（重楼排草）30g，水煎服。

【备注】场行小毒，孕妇、小儿慎用。

21、银钱草

土家语名：我铜钱实克查

土家语拼音：ngox tongr qianr sir ker car

国际音标：no⁵⁵ t^{˨˩˦} uŋ²¹ tɕ^{˨˩˦} ian²¹ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】四块瓦、赵公鞭、节节生。

【来源】为金粟兰科植物银钱草 *Chloranthus japonicus* Sieb., 全草入药。

【性味】苦、寒。

【功效】祛风毒，散寒咳。

【主治】痈肿疮毒，风寒咳嗽。

【用量】内服 1.5~3g，外用适量。

【备注】有毒，孕妇忌服。

【应用经验】皮肤风毒疮：银钱草叶研细粉（适量）茶油开后调匀涂患处，每日
1~二次。

22、化香树

土家语名：化香卡蒙

土家语拼音：huaf xianx kar mongr

国际音标: xua³⁵ ɕian⁵⁵ k'a²¹ muŋ²¹

【别名】刺蚕树、饭香树。

【来源】为胡桃科植物化香树 *Platycarya strobilacea* Siep. et Zucc, 根、叶、果入药。

【性味】辛，热，有毒。

【功效】祛风毒，杀虫止痒。

【主治】疮疖肿毒，下身（阴囊）湿痒，顽癣。

【用量】内服 6~10g，水煎服，外洗适量。

【应用经验】

1、癞子（头癣）：鲜叶 30g 石灰 60g。用开水一杯泡 2 小时后，外搽，一日二次。

2、蛇咬伤、无名肿毒：鲜叶捣烂外敷。

3 风疹块：饭香树果、枫香果各适量，煎水熏洗。

【备考】1、1、化学成分：树皮：含维生素、脂肪、蜡质、冷水水溶物、热水水溶物、果胶、半纤维素、木质素、鞣质。根皮：含鞣质。果实：含鞣质、黄色素、胡桃叶醌。

2、2、药理作用：抗菌试验，茎叶对金黄色葡萄球菌及绿脓杆菌有抑制作用。

23、女谷

土家语名：见他被

土家语拼音：pif tax bif

国际音标：pi³⁵ t'a⁵⁵ pi³⁵

【别名】葡蟠、小构树。

【来源】为桑科植物小构树 *Broussonetia Kazinoki* Sied. et Zucc, 根皮、果实入药。

【性味】辛、涩，平。

【功效】祛风毒，健肚消肿。

【主治】风气胀满，腰痛，风湿痛，疥癣。

【用量】6~10g。

【应用经验】皮肤干疮毒疮（牛皮癣）：女谷 10g 花斑虫 3 个。共研细粉，鸡蛋黄油调涂患处，每日一次。

【备注】果实未完全成熟采收，水出后烘干备用。

24、珍珠莲

土家语名：抗苦枇杷

土家语拼音：kanr kux pir par

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ pi²¹ p'a²¹

【别名】山枇杷、野枇杷。

【来源】为桑科植物珍珠莲 *Ficus sarmentosa* Buch. Ham. ex J. E. Sm. var. *henryi* (King) Corner，根藤入药。

【性味】苦，平。

【功效】祛风毒，消肿痛。

【主治】风湿关节痛，乳痛，疮疖。

【用量】内服 6~12g，外敷适量。

【应用经验】风毒痹痛症：珍珠莲藤 20g 七叶连树干 20g 制乌肚子 10g 小蜂房 3g 生姜 3 片。每日一剂，水煎二次服。

25、线盖

土家语名：线盖

土家语拼音：xianf gaif

国际音标：ɕian³⁵ kai³⁵

【别名】通城虎、大寒、大蛇参。

【来源】为马兜铃科植物通城虎 *Aristolochia fordiana* Hems1.，根入药。

【性味】辛、苦，寒。

【功效】祛风毒，消肿痛。

【主治】小儿惊风，毒蛇咬伤，心骨阵痛，风湿骨痛。

【用量】内服 6~10g，外敷适量。

【备注】场行小毒，久服易伤肾。

26、山雷子

土家语名：筛桶卡

土家语拼音：saix tongx kar

国际音标：sai⁵⁵ t'uŋ⁵⁵ k'a²¹

【别名】雷公蒿、牛筋树、山胡椒。

【来源】为腊梅科植物牛筋树 *Lindera glauca* (Sieb. et Zucc.) Blume, 根叶入药。

【性味】根辛，温；叶辛，平；树皮苦，寒。

【功效】驱风毒，活络消肿。

【主治】风湿麻木，筋骨痛，胃痛，头痛，**横跨**（脾肿大），疔疮，毒蛇咬伤，外伤出血，**皮肤瘙痒**。

【用量】内服 10~15g，外用适量。

【应用经验】

1、风湿麻木、筋骨疼痛：雷公蒿根 老鹳草 白毛筋骨草 钻地风 白茅根 松节各 20g，泡酒服。

2、劳伤过度、浮肿、四肢酸麻、食欲不振：雷公蒿根 60g，水煎，加红糖服。

3、痈疮肿毒：雷公蒿叶、芙蓉叶、虎刺叶各适量，共捣烂外敷。

【备考】1、1、化学成分：根含丁香烯、落新妇苷。叶含挥发油，挥发油中主要成分为桉叶素、丁香烯、香叶醇、香茅醇及乙酸龙脑酯、苾烯、β-蒎烯、柠檬烯。种子含油脂，其脂肪酸有癸酸、月桂酸、肉豆蔻酸、棕榈酸、油酸和亚油酸等。

2、2、药理作用：本品果实挥发油体外对流感病毒有抗病毒作用；对革兰阳性和革兰阴性细菌均有不同程度的抑菌作用，其中对卡他奈氏球菌、乙型链球菌、肺炎双球菌、甲型链球菌、炭疽杆菌和宋内痢疾杆菌的抗菌作用最强，对金黄色、白色葡萄球菌、伤寒杆菌、鲍氏痢疾杆菌、福氏痢疾杆菌和绿脓杆菌次之，对新型隐球菌和白色念球菌均有较强的抗菌作用。

27、雷公藤

土家语名：没他泽二拉

土家语拼音：mef tax cer ef lax

国际音标：me³⁵ t'a⁵⁵ ts'e²¹ e³⁵ la⁵⁵

【别名】风湿藤。

【来源】为卫矛科植物雷公藤 *Tripterygium wilfordii* Hook. f.，藤茎入药。

【性味】苦，温。

【功效】祛风毒，清热气。

【主治】风湿播杵症（类风湿关节炎），皮肤发痒。

【用量】6~10g。

【应用经验】风毒肿节症（类风湿关节炎）：雷公藤 15g 蛇莓草 10g 松柏叶 15g 羊鸟树 20g 青风藤 10g 生姜 3 片。每日一剂，水煎二次服，忌辛辣。

【备注】有毒。

28、扣子果

土家语名：扣子布里

土家语拼音：kouf zix buf lix

国际音标：k'əu³⁵ tsi⁵⁵ pu³⁵ li⁵⁵

【别名】红见血飞、华显的实。

【来源】为豆科植物华显的实 *Caesalpinia nuga* Ait.，根入药。

【性味】辛、苦，温。有小毒。

【功效】祛风毒，散寒气。

【主治】风湿痛，风寒感冒。

【用量】6~10g。

【应用经验】皮肤烂毒疮症：扣子果叶、黄瓜香各适量，共研细粉。茶油调匀涂患处，每日一次。

29、怪柳

土家语名：怪柳

土家语拼音：senf niux

国际音标: sen³⁵ ʒiu⁵⁵

【别名】西河柳。

【来源】为柽柳科植物西河柳 *Tamarix chinensis* Lour.，细嫩枝叶入药。

【性味】辛，平。

【功效】祛风毒，利尿透疹。

【主治】麸子症，风疹，风邪咳嗽，风湿骨痛。

【用量】6~10g 水煎服。

【应用经验】麸子症出不透彻：西河柳叶枝 10g，芫荽 3 根，每日一剂，水二次服。

【备注场行小毒。

30、破子草籽

土家语名：破子实克查布里

土家语拼音：pof zix sir ker car buf lix

国际音标：p'o³⁵ tsi⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹ pu³⁵ li⁵⁵

【别名】山芹菜，华南鹤虱。

【来源】为伞形科植物华南鹤虱 *Torilis japonica* (Houtt.) DC，种子入药。

【性味】苦、辛，平。

【功效】祛风杀虫毒。

【主治】风坨症， 螯虫（蛔虫），痒屁虫（蛲虫）。

【用量】内服 6~10g，外洗适量。

【应用经验】皮肤风毒痒症：破子草果 10g 插泥花树皮 10g 苦参树皮 7g。每日一剂，水煎二次服。

31、泡桐

土家语名：泡桐

土家语拼音：paox tongr

国际音标：p'au⁵⁵ t'uŋ²¹

【别名】桐麻树。

【来源】为玄参科植物泡桐 *Paulownia fortunei* (Seem.) Hemsl, 根入药。

【性味】苦，寒。

【功效】祛风毒，消肿止痛。

【主治】风湿筋骨痛，疮疡肿毒，白带。

【用量】6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、风毒筋骨病症：泡桐根皮 20g 血通 10g 金腰带 10g 飞龙血 10g。每日一剂，水煎二次服，忌生冷。

2、风湿痹痛：泡桐树根皮 18g，老鹤草 30g，八角枫 3g，水煎服。

3、便血、痔疮出血：泡桐树根 15g，仙鹤草、陈艾各 15g，水煎服；若痔疮肿痛，可加鱼腥草 30g。

4、红崩白带：泡桐树根皮 30g，八月札 1 个，猪肉 250g，共炖熟（不放盐），汤肉同服。

[附注] 泡桐的叶、花及泡桐的树皮亦入药。泡桐叶性味苦、寒。具清热解毒作用。主治疗疮、痈疽、创伤出血等症。泡桐花性味甘、淡、凉。具清热解毒、利湿作用。主治上呼吸道感染、支气管肺炎、急性扁桃体炎、菌痢、急性肠炎、急性结膜炎、腮腺炎等症。经药理实验证明，泡桐花的提取物有较强的抗菌作用，花和果实的注射液，体外试验对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌、大肠杆菌、痢疾杆菌、布氏杆菌等均有一定的抵制作用，对上呼吸道常见的几种细菌，如：白色葡萄球菌、甲型溶血性链球菌、四联杆菌、肺炎双球菌、流行性感胃杆菌等，有较强的抗菌作用。

32、草灵仙

土家语名：灵仙实克查

土家语拼音：lenr xianx sir ker car

国际音标：len²¹ ɕian⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】婆婆纳。

【来源】为玄参科植物草灵仙（轮叶婆婆纳）*Veronicastrum sibiricum* (L.) Pennell, 全草入药。

【性味】辛、甘，凉。

【功效】祛风毒，除湿止血。

【主治】风湿腿痛，肉痛，毒蛇咬伤，创伤出血。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、漏小肠炎（疝气）：婆婆纳（鲜）60g，捣汁，白酒和服，蒙被暖睡，待发大汗自愈，或加紫背天葵 15g，同煎服。

2、奇子肿痛症（睾丸肿）：婆婆纳 20g 黄独 10g，水煎服。

3、烫火伤：婆婆纳 30g，菜油浸泡数日，取油搽患处。

33、扇个良

土家语名：而且七

土家语拼音：lanr qief qir

国际音标：lan²¹ tɕie³⁵ tɕi²¹

【别名】老虎七、扇脉杓兰。

【来源】为兰科植物扇脉杓兰 *Cypripedium japonicum* Thunb，根入药。

【性味】苦，温。

【功效】祛风毒，理气止痛。

【主治】皮肤风坨症，劳伤，无名肿毒，三分症（打摆子间日症）。

【用量】内服 6~10g，外敷适量。

【应用经验】经血不调：扇子七 2g 泽兰 益母草、丹参各 9g，煎服。每日一剂，分两次服。

34、火烧兰

土家语名：米务主

土家语拼音：miv wuf lanr

国际音标：mi⁵³ wu³⁵ lan²¹

【别名】黑苏山虎、大叶火烧兰、散血丹。

【来源】为兰科植物大叶火烧兰 *Epipactis mairoei* Schztr.，根茎入药。

【性味】苦，平。

【功效】祛风毒，理气活血。

【主治】风邪人地，胸痛，疮疡肿痛，跌打损伤。

【用量】内服 6~10g，外敷适量。

【应用经验】

1、蛇咬伤、蜂螫伤：手参、海螺七、小苦麻菜各等分，捣烂外敷患处。

2、白带：手参、岩白菜、黄精各 15g，炖肉吃。

35、王辣蚱

土家语名：王辣蚱

土家语拼音：wanr lar zax

国际音标：wan²¹ la²¹ tsa⁵⁵

【别名】黄蛟蜂、胡蜂。

【来源】为胡蜂科昆虫白斑脸黄胡蜂 *Vespuia maculata* (L.)，巢入药。

【性味】甘，平。有毒。

【功效】祛风毒，杀虫散结

【主治】皮肤顽癣，头风痛，九子痒（淋巴结核），疮疡，乳痈。

【用量】内服 3~6g，外用适量。

【应用经验】风毒头痛症（偏头痛）：小蜂房 5g 正天雷 10g 透身寒 4g 山桂皮 5g 小牛筋根 10g 白雷七 10g。每日一剂，水煎二次服，忌风寒。

【备注场行小毒。

36 乌梢蛇蛇

土家语名：乌稍窝

土家语拼音：wux saox wov

国际音标：wu⁵⁵ sau⁵⁵ wo⁵³

【别名】乌稍蚣。

【来源】为游蛇科动物乌梢蛇 *Zaocys dhum nades* (Cantor)，去内脏全体干品入药。

【性味】甘，温。

【功效】祛风毒，止痛止痒。

【主治】风湿痹痛，四肢麻木，皮肤顽癣。

【用量】6~10g。

【应用经验】风湿麻木症：乌梢蛇 10g 麻口皮 7g 木瓜 10g 血通 10g 鸭脚当归 10g 岩防风 10g。每日一剂，水煎二次服。

37、五步蛇

土家语名：翁吉窝

土家语拼音：ongx jir wov

国际音标：uŋ⁵⁵ tɕi²¹ wo⁵³

【别名】五步倒、棋盘花

【来源】为蝮蛇科动物五步蛇 *Agkistrodon acutus* (Gunther)，去内脏全体入药。

【性味】甘、咸，温。

【功效】祛风毒，舒经络。

【主治】风湿痹痛，半身不遂，口眼歪斜，四肢麻木。

【用量】6~10g。

【应用经验】风湿偏瘫症：五步蛇 10g 地龙 20g 僵蚕 10g 活筋草 10g 珍珠莲藤 10g 鸭脚当归 10g 钳蝎虫 5g。每日一剂，水煎二次服。第三次煎药液擦患部。

【备注】有毒。

38、土的良

土家语名：烙铁科巴窝

土家语拼音：lor tef kox bax wov

国际音标：lo²¹ t'ie³⁵ k'o⁵⁵ pa⁵⁵ wo⁵³

【别名】烙铁头，蝮蛇。

【来源】为蝮蛇科动物蝮蛇 *Agkistrodon halys* (Pallas)，去内脏全体干品入药。

【性味】甘，咸，温。

【功效】祛风毒，止痒消痔。

【主治】麻风症，皮肤顽痹，痹疔，痔疮。

【用量】3~6g。

【应用经验】麻风症：土公蛇 20g 小蜂房 6g。每日一剂，水煎二次服。

【备注】有毒。

39、蜈蚣

土家语名：哈梯谷

土家语拼音：hax tix gur

国际音标：xa⁵⁵ ti⁵⁵ ku²¹

【别名】千脚虫。

【来源】为蜈蚣科动物 *Scolopendra subspiuipes mutilans* L · Koch，全体入药。

【性味】辛，温。

【功效】祛风毒，止惊风。

【主治】小儿惊风，面瘫，抽搐，疮疖。

【用量】1~3 条，多入散丸剂用。

【应用经验】

- 1、蛇伤：蜈蚣 1 条 天胡荽 的含 乌泡刺根各适量，共捣烂外敷伤处。
- 2、小儿急惊风：全蜈蚣 2 条 蝎尾 4 个 生石膏 石决明各 30g 知母 12g 水煎服。
- 3、瓜藤丸（淋巴结核）溃烂：蜈蚣、茶叶各等量研末，撒布患处。

【备注】场行小毒。

【备考】1、化学成分：含两种类似蜂毒的有毒成分，即组织胺样物质及溶血性蛋白质。尚含氨基酸、亮氨酸、蚁酸、脂肪油、胆醇等。

2、药理作用：1、对戊四氮、纯菸碱和硝酸士的宁碱引起的惊厥均有不同程度的对抗作用。2、对多种皮肤真菌有不同程度的抑制作用，并对结核杆菌有抑制和杀灭的能力。

40、鱼尾草

土家语名：宋列**切实**克查

土家语拼音：songf lier **pongf** sir ker car

国际音标：suŋ³⁵ lie²¹ p'uŋ³⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】醉钱草。

【来源】为马钱科植物醉钱草 *Buddleia lindleyana* Fort. 的全草，根及叶。

【性味】辛，苦，温。

【功效】祛风除湿，止咳化痰。

【主治】感冒，咳嗽，风湿关节痛，疔腮，瘰疬。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、跌打损伤：鲜鱼尾草全草 15~25g，酌加白酒，开水炖 1 小时，内服。
- 2、风寒牙痛：鲜鱼尾草叶和食盐，少许，捣烂取汁漱口。
- 3、虚黄肿症（钩虫病）：鱼尾草 15g，水煮 2 小时，取汁 100ml，加白糖，于晚饭后与次晨饭前分服。

【备注**场行**小毒。

【备考】1、1、化学成分：花和叶含醉鱼草苷（为蒙花苷、柳穿鱼苷）、刺槐素（为 5,7-二羟基-4-甲氧基黄酮）等多种黄酮类。

2、2、药理作用：鲜草对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌、志贺痢疾杆菌有轻度抑制作用。

41、银环蛇

土家语名：我圈圈窝

土家语拼音：ngox qianx qianx wov

国际音标：ŋo⁵⁵ tɕian⁵⁵ tɕian⁵⁵ wo⁵³

【别名】金钱白花蛇。

【来源】为眼镜蛇科动物银环蛇 *Bungarus multicinctus* Blyth，去内脏的干燥体。

【性味】甘、咸，温。有毒。

【功效】祛风攻毒，舒筋络，止痉，定惊搐。

【主治】风湿关节疼痛，筋脉拘急，半身不遂，口眼喎斜，破伤风，小儿惊风抽搐，皮癣，恶疮，麻风，疥癬，杨梅疮。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、风湿关节痛、半身不遂：金钱白花蛇 25g 当归 羌活 防风 天麻 秦艽 五加皮各 15g，白酒 1500ml，浸泡 1 月，每服 15ml，日服二次。

2、颈项强直、身体屈伸不利：蜈蚣 1 条，金钱白花蛇、乌梢蛇各 10g，去骨，研末，每次服 6g。

【备考】1、1、化学成分：主要含蛋白质、脂肪及鸟嘌呤核苷，头部毒腺中含有强烈的神经性毒、溶血成分及血球凝集成分。

2、2、药理作用：1、蛇毒对呼吸肌、神经系统，特别是呼吸中枢有抑制作用，同时还有胃肠麻痹作用。2、被银环蛇咬伤后出现麻木，感觉不大，早起易出现思想麻痹，一旦神经症状发生，严重者可致呼吸麻痹，直至死亡。

42、狗尾巴

土家语名：哈列列碰

土家语拼音：hax lier lier pongf

国际音标：xa⁵⁵ lie²¹ lie²¹ p'uŋ³⁵

【别名】猫尾巴、吊洋尘、马扶梢。

【来源】为马前科植物大叶醉鱼草 *Buddleja davidii* Fr. 的枝叶，根皮。

【性味】辛，温。有小毒。

【功效】祛风散寒，活血止血，解毒，杀虫，止痒。

【主治】花疮（蜂窝组织炎） 疮痈 跌打损伤 脚癣 妇女阴痒 风湿关节痛。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、风寒感冒、咳嗽：狗尾巴 9g，红糖适量水煎服；或配的花、枇杷叶各 9g，水煎服。

2、皮肤癣、脚癣：狗尾巴叶数张，研末加枯矾少许搽患处；或取鲜叶揉烂搽患处。

43、飞蛾槭

土家语名：他司卡蒙

土家语拼音：Tax six kar mongr

国际音标：t'a⁵⁵ si⁵⁵ k'a²¹ muŋ²¹

【来源】为槭树科植物青榨槭 *Acer davidii* Franch. 和绿叶飞蛾槭 *A. oblongum* Wall. ex Dc. Var. *Concolor* Pax. 的根皮。

【性味】辛、苦，寒。

【功效】祛风除湿，解毒散瘀，消肿止痛。

【主治】劳伤身痛、关节肿痛、皮肤瘙痒、疮疖已溃或未溃。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、黄水疮、湿疹：飞蛾树根皮 20g 吊阳尘花 12g。共研细末加冰片 2g，香油适量外擦。

2、风湿性关节红肿、劳伤痛：飞蛾树根皮 12g 铁乌梢 10g 红毛七 6g 刺老苞根皮 12g。水煎内服。

土家语名：务气起毒散捏药

土家语拼音：wuf qif qix duf sanf niex yaof

国际音标：wu³⁵ tɕ⁵⁵ i³⁵ tɕ⁵⁵ i⁵⁵ tu³⁵ san³⁵ ʒeie⁵⁵ jau³⁵

凡具有发散体中寒邪，驱除体内毒邪功效，用于治疗寒毒疾病的药物称散寒毒药。

土家医认为寒毒邪气是自然界中含有冷毒的气作用于人体而发病，或体内在火气低下时自身产生的一种内寒毒邪气，作用于脏腑器官而发病。其病理变化为收紧经脉，阳气不通，气血凝滞，肌腠失养。临床症状和体征因部位不同而表现有异，共同的症状体征有：畏寒怕冷、痛处不移，得温则减，肌肉脏器收引，四肢不温，面色不华，舌淡胖，苔白，脉浮紧或沉紧。

散寒毒药都具有发散体内寒气和驱赶体内毒邪双重功效，主要用于治疗寒毒病症，但某些药物还兼有除湿、止痛、止呕、抗癌的功效，通过组方用于治疗风湿麻痹症，胃寒呕吐症，肺癌症等。

常用散寒毒药物有：大辣蓼子、火葱头、蚂蟥莲、小叶蜂窝草、血升麻、马蹄香、香椒子、米辣子、金鱼花、蜘蛛香、半截烂等。

1、大辣蓼子

土家语名：海脚此巴

土家语拼音：haix jiaox cix bax

国际音标：xai⁵⁵ tɕia⁵⁵ ts'i⁵⁵ pa⁵⁵

【别名】辣蓼，红蓼。

【来源】为蓼科植物辣蓼 *Polygonum excurrens* Steward 的全草。

【性味】辛，微温。

【功效】发汗解毒，止血。

【主治】外感发热，恶寒无汗，头痛，身痛，跌打外伤出血。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、各种外伤出血：大辣蓼子适量捣烂外敷患处。
- 2、寒毒内侵：大辣蓼子 30g，水煎服，如热重加生石膏 30g，如寒重加生姜 24g，水煎服。

2、火葱头

土家语名：火葱科巴

土家语拼音：hox Congr kox bax

国际音标：xo⁵⁵ ts'uŋ²¹ k'o⁵⁵ pa⁵⁵

【别名】葱白头。

【来源】为百合科植物葱 *Allium fistulosum*. 的鳞茎。

【性味】辛，温。

【功效】发表解毒，通阳利尿。

【主治】感寒头痛，鼻塞，阴寒腹痛，痈肿，寒痢疾，小便不利。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、风寒感冒：火葱头 30g，生姜 10g，水煎服，或葱白 9g，酌加红糖，水煎服。
- 2、赤白痢：火葱头切细，和米煮粥，空服。
- 3、痈疮肿痛：火葱全株适量，捣烂，醋调炒热，敷患处。

【备考】2、药理作用：1、葱白挥发成分对白喉杆菌、结核杆菌、痢疾杆菌、葡萄球菌、链球菌有抑制作用，水浸剂对多种皮肤真菌有抑制作用。2、粘液对皮肤黏膜有保护作用。3、葱蒜辣素由呼吸道、汗腺、泌尿道排出时，能轻微刺激这些管道壁的分泌而有发汗、祛痰、利尿的作用。

3 蚂蟥蝗莲

土家语名：撇拉莲

土家语拼音：piex lax lianr

国际音标：pie⁵⁵ la⁵⁵ lian²¹

【别名】风尾搜山虎、滚龙草、豆浆草。

【来源】为水龙骨科植物多羽节肢蕨（西南节肢蕨）*Arthromeris mairei* (Brause)

Ching 的根茎。

【性味】辛、甘，温。

【功效】散寒解毒，祛风止痛。

【主治】风寒感冒，风湿痹痛，胃痛，目痛，牙痛，头痛，预防蛇伤等。

【用量】6~10g。

【应用经验】风寒头痛：滚起草 10g 回阳草 6g，小杆子 10g 山椒根 10g 透身寒 4g 小荆芥 6g。每日一剂，水煎二次服。

4、血升麻

土家语名：面姐升麻

土家语拼音：mianx jiex senx mar

国际音标：mian⁵⁵ tɕie⁵⁵ sen⁵⁵ ma²¹

【别名】佩兰、山佩兰、红升麻、秤杆升麻、土升麻。

【来源】为菊科植物单叶佩兰 *Eupatorium japonicum* Thunb. 的全草。

【性味】甘辛、微苦，平。

【功效】散寒毒，败血抗癌。

【主治】咳劳症，肺癌症，痛经，跌打扭伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、着凉症：土升麻 12g 葛根 柴胡各 9g。水煎服。

2、三分症（疟疾）：土升麻 12-15g，煎浓汁于发作前 2 小时服。

【备注】有毒。

【备考】有抗癌、抗菌作用。

5、马蹄香

土家语名：马蹄香

土家语拼音：max tir xianr

国际音标：ma⁵⁵ ti²¹ ɕian⁵⁵

【别名】土细辛。

【来源】为马兜铃科植物杜衡 *Asarum forbesii* Maxim, 全草入药。

【性味】辛，温。

【功效】散寒毒，止疼痛。

【主治】寒毒邪头痛，牙痛，寒痹等。

【用量】1~3g。

【应用经验】

1、胃寒痛：马蹄香研末，每次 1.5g 开水吞服。

2、疮疖肿毒：马蹄香适量，捣烂敷患处。

【备注场行小毒。

6、香椒子

土家语名：抗苦理布

土家语拼音：kanr kux cof buf

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ ts'o³⁵ pu³⁵

【别名】野花椒。

【来源】为芸香科植物野花椒，*Zantoxylum Schinifolium* Sieb. et Zucc, 根叶入药。

【性味】辛，温。

【功效】散寒毒，行气止痛。

【主治】寒气肚痛。

【用量】3~6g。

【应用经验】小腹冷痛症：香椒 25g 香叶根 10g 山桂皮 5g 木姜根 10g 茴香子 5g。每日一剂，水煎二次服，忌生冷。

【备注场行小毒。

7、米辣子

土家语名：女儿海脚

土家语拼音：zir er haix jiaox

国际音标：tʂi²¹ e²¹ xai⁵⁵ tʂiao⁵⁵

【别名】吴茱萸、臭子。

【来源】为芸香科植物吴茱萸 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth, 果实入药。

【性味】辛，温。

【功效】散寒毒，止呕，止痛。

【主治】心胃冷气痛症，恶心呕吐，暖气吞酸。

【用量】3~6g。

【应用经验】心胃冷气痛症：小杆根 10g 干姜 5g 米辣子 10g 地雷 10g 水木香根 10g 硃砂根 5g 鸡内金 10g 墨鱼骨 6g。每日一剂，水煎二次服。

【备注场行小毒。

8、金鱼花

土家语名：科宋卡普

土家语拼音：kox songf kax pux

国际音标：k'o⁵⁵ suŋ³⁵ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】双盾木。

【来源】为忍冬科植物双盾木 *Dipelta fleribuda* Maxim, 根入药。

【性味】辛、苦，温。

【功效】散寒毒。

【主治】穿踝风症。

【用量】6~10g。

【备注场行小毒。

9、蜘蛛香

土家语名：补此香

土家语拼音：bux cix xianx

国际音标：pu⁵⁵ ts'i⁵⁵ ɕian⁵⁵

【别名】马蹄香、土细辛、心叶缬草。

【来源】为败酱科植物蜘蛛香(心叶缬草) *Valeriana jatamansi* Jones 的根及茎。

【性味】辛、苦，温。

【功效】散寒毒，止疼痛。

【主治】寒气头痛，肚肠冷痛，腰腿冷痛。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、胃痛：蜘蛛香 地苦胆 爬岩香各 12g 黄连 川贝母各 3g 墨鱼骨 150g，碧血莲 9g，研细末，每次服 1g；或蜘蛛香 10g 木香 10g 续断 5g，研细，冷开水冲服。

2、腹痛：蜘蛛香 15g，研末，一次吞服。

3、小儿疳积：蜘蛛香 15g 鸡天藤根 15g。水煎服。

4、顽固性头痛症：蜘蛛香 6g 正天雷 10g 透身寒 4g 赶山鞭 10g，小蝎子 10g 生姜 3 片。每日一剂，水煎二次服。

【备注】场行小毒。

【备考】

1、化学成分：根和根茎含 1,2-双酮物质，碱解或酸解后得异戊酸、蒙花苷异戊酸酯、缬草苦甙，并含 15-羟基-缬草酮、 β 、 α -香柠檬烯。

2、药理作用：本品对于小鼠、青蛙、家兔均有镇静作用。大白鼠实验，本品醇提出物能延长和加强巴比妥的催眠时间及镇静作用。本品所含异缬草酸衍生物 α -烯醛异缬草酸、 α -溴并缬草酸的钠盐对小白鼠（Hardy 氏法）均有镇静作用。前者作用强而持久，对大白鼠及犬均有降压作用。本品浸剂 1、2.5、10ml/10g 给犬静脉注入，可加速凝血过程（急性或慢性试验皆可）。浸剂可加速凝血过程。提出的植物生物碱对革兰氏阳性细菌有抑制作用。

10、半截烂

土家语名：半截烂

土家语拼音：banf jier lanf

国际音标：pan³⁵ tɕie²¹ lan³⁵

【别名】雪里见。

【来源】为天南星科植物雪里见 *Arisaema rnizounatum* G. E. C.

Fischer, 块根入药。

【性味】辛，温。

【功效】散寒毒，祛风祛湿。

【主治】冷气入骨，风湿关节痛。

【用量】2~3g。

【应用经验】

1、跌打损伤、风湿疼痛、咳嗽脓痰：半截烂 0.3~0.6g（用豆腐皮包好），酒吞服；或用童便制后置人身上，接人体温干燥，磨酒服（磨 7-10 转）。

2、烂疮溃疡：半截烂研末，用少许撒疮面。

3、痈疽疔毒初起：半截烂磨酒外搽。

【备注】有大毒。

11、一枝黄花

土家语名：卡普王嘎里那借

土家语拼音：kax pux wanr gax lix laf jief

国际音标：k'a⁵⁵ p'u⁵⁵ wan²¹ ka⁵⁵ li⁵⁵ la³⁵ tɕie³⁵

【别名】黄龙缠树。

【来源】为菊科植物一支黄花 *Solidago Virga-aurea* L. var. *leiocarpa* (Benth.)

A. Gray, 全草入药。

【性味】辛、苦，微寒。

【功效】散寒解毒，疏风消肿。

【主治】寒邪犯表，恶寒发热，无汗，寒滞咳嗽，胃胀，小儿疳积，毒蛇咬伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、着凉头痛、发热、咳嗽：一支黄花 10g 香薷 10g 银花藤 10g 牛王刺根 10g 左转藤根 10g。水煎服。发热甚者，加薄荷 10g，水竹叶 10g。

2、腰痛：一支黄花根 3 菹，捣烂冲酒服。

3、小寒证症：一支黄花 10g 钓鱼竿 10g 大猫耳朵 10g 苏叶 5g 六月雪 15g。每日一剂，水煎二次服。

【备注】场行小毒。

【备考】1、1、化学成分：全草含酚性成分、鞣质、挥发油、皂甙、黄酮类物质。

2、2、药理作用：1、抑菌试验证明对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌、痢疾杆菌、红色癣菌均有抑制作用。2、促进白细胞吞噬细菌作用。3、本品煎剂内服，可解除氨雾引起的家兔实验性气管炎的喘息症状，亦有祛痰作用。④对急性肾炎（出血性）有止血作用。

12、土良姜（野姜）

土家语名：抗苦科苏

土家语拼音：kuanr kux kox sux

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ k'o⁵⁵ su⁵⁵

【别名】野姜、独叶合。

【来源】为姜科植物长穗姜花 *Hedychium spicatum* Ham .ex Smith 的根茎。

【性味】辛、苦，温。

【功效】散寒毒，理气止痛。

【主治】寒毒胃痛，寒疝气痛，膝关节痛。

【用量】6~10g。

【应用经验】寒毒胃痛：土良姜根 6g 干姜 6g 冷水丹 6g。煎水服。

13、木姜子

土家语名：巴梭尔

土家语拼音：bax sox ex

国际音标：pa⁵⁵ so⁵⁵ e⁵⁵

【别名】山胡椒。

【来源】为樟科植物木姜子 *Litsea pungens* Hems1 . 及绢毛木姜子 *L. sericea* Hook. f. 的果实。

【性味】辛，温。

【功效】散寒毒，调气消食。

【主治】寒毒腹痛，泄泻，食滞饱胀。

【用量】3~6g。

【应用经验】

1、寒毒腹痛：木姜子 12~15g，水煎服。

2、发痧气痛：木姜子、青藤香、蜘蛛香各 3g，研末，酒吞服。

【备考】1、化学成分：主要成分为柠檬醛 60%~90%、香叶醇 5%~19%，又作食用香精和化妆香精，现已广泛应用于高级香料、紫罗兰酮和维生素甲的原料。种子含脂肪油 48.2%，可供制皂和工业用。

14、竹叶细辛

土家语名：母尔他细辛

土家语拼音：mux ex tax xif xinx

国际音标：mu⁵⁵ e⁵⁵ t'a⁵⁵ ɕi³⁵ ɕin⁵⁵

【别名】遥竹遣、逍遥竹。

【来源】为萝藦科植物徐长卿 *Cynanchum paniculatum* (Bunge) Kitagawa 的全草或根及根茎。

【性味】辛，温。

【功效】散寒解毒，祛风除湿，消肿，温经止痛，利尿。

【主治】风寒湿痹，腰痛，牙痛，胃寒气痛，痛经，跌打损伤，毒蛇咬伤，腹水，水肿等症。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、风寒湿痹、胃寒气痛、妇女痛经：竹叶细辛 6~9g，水煎服。

2、慢性腰痛：竹叶细辛 虎杖各 9g 红四块瓦 5g。研末，每服 0.6~1g，每日一~二次，温开水吞服。

3、跌打损伤：竹叶细辛 桃仁各 9g 红花 土鳖虫各 6g。水煎服。

4、毒蛇咬伤：鲜一支箭 30g，水煎服，另用鲜草适量，捣烂外敷。

5、湿热毒疮：一支箭 30g，一把伞 30g，鱼鳅串 30g，鱼腥草 30g，水煎服。

6 木的蛇开口（指头疔）、痈疔疔毒疼痛：一支箭、雄黄连各等量研细末，用醋调外敷患处。

【备注】场行小毒。

【备考】1、1、化学成分：含丹皮酚 2%左右以及多种 C21 甙体苷，如白薇苷 B 和徐长卿 A、B 等。其他还含有黄酮苷、糖类、氨基酸及少量生物碱。

2、2、药理作用：1、徐长卿 3g/d，可降低家兔实验性高血脂症血清胆固醇和 β -脂蛋白；在用高胆固醇食物引起家兔高血脂症时，徐长卿可以减少主动脉粥样硬化和小动脉脂类沉积。2、对小鼠有镇痛作用，在给 10 分钟后出现，1 小时后消失。3、本品能使小鼠心肌对铷（Rb86）摄取量增加。④丹皮酚有降压作用。⑤能显著减少小鼠自发活动，而有镇静作用。⑥徐长卿中分离出的 3-羟-4-甲氧苯乙酮对热刺激和醋酸引起的小鼠疼痛有明显的镇痛作用。⑦对小鼠的胃肠蠕动有明显的抑制作用。⑧丹皮酚有抗变态反应作用。⑨丹皮酚对机体细胞免疫功能有调节作用。

15、马个良

土家语名：马列碰七

土家语拼音：max ler pongf qir

国际音标：ma⁵⁵ lie²¹ p'uŋ³⁵ tɕi²¹

【别名】马尾参、金尾蟾、落新妇。

【来源】虎耳草科植物落新妇 *Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch. et Sav., 全草入药。

【性味】辛、微涩，微温。

【功效】散寒赶毒，消肿止痛。

【主治】风寒性关节痛，冷气痛症，毒蛇咬伤，跌打损伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】胃寒痛症：马尾七 10g 地莓 7g 满山香 7g 小杆子 7g 香椒子 7g。每日一剂，水煎二次服。

16、补阳丹

土家语名：补阳丹

土家语拼音：bux yanr danx

国际音标：pu⁵⁵ jan²¹ tan⁵⁵

【别名】羊奶子。

【来源】为胡颓子科植物铜色胡颓子 *Elaeagnus cuprea* Rehb. 的根、叶、果实。

【性味】酸、微甘，温。

【功效】温下焦，散寒毒，接骨，止咳，止泻。

【主治】小便失禁、外感风寒、咳嗽、肠炎水泻、骨折、劳伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、咳嗽：补阳丹叶 枇杷叶（去毛）各 15g 活麻 五匹风 石菖蒲各 12g 鱼腥草 15g。水煎服。

2、热性水泻：补阳丹果实 15g 地瓜藤 仙鹤草 地锦草 旱莲草各 9g。水煎服。

3、劳伤：补阳丹根皮 15g 大血藤 小血藤 红泽兰 牛马在 各 9g。泡酒服。

17、金盆草

土家语名：科格欵梯实

土家语拼音：kox geix tix sir

国际音标：k'o⁵⁵ kei⁵⁵ t'i⁵⁵ si²¹

【别名】苔叶细辛、四两麻。

【来源】为马兜铃科植物华细辛 *Asarum sieboldii* Miq. 的全草。

【性味】辛，温。有小毒。

【功效】散寒毒，止咳止痛，行水开窍。

【主治】风寒感冒、头痛鼻塞、痰饮咳喘、鼻渊、齿痛、风寒湿痹等症。

【用量】1~3g。

【应用经验】

1、寒性腹痛：用金盆草根 0.3~0.6g，捣碎，凉开水冲服。

2、毒蛇咬伤：金盆草、何首乌、奶浆藤各，加淘米水适量，捣烂外敷。

3、外感风寒、头痛、鼻塞：金盆草 甘草各 3g 荆芥 9g 防风 川芎 生姜各 6g。水煎服。

【备考】

1、化学成分：含 L-细辛素和 L-芝麻素、挥发油，挥发油中主要含甲基丁香酚、黄樟醚、优香芹酮、龙脑或草蒿脑、1,8-桉叶素、 α -或 β -蒎烯、3,5-二甲基甲苯和 2-甲氧黄樟醚。

2、药理作用：①局部麻醉作用：细辛挥发油对蛙的坐骨神经丛、豚鼠以及人舌黏膜均有局部麻醉作用。②解热、镇痛、抗炎作用：细辛挥发油对家兔因温热刺激和伤寒、副伤寒菌苗所致发热有抑制作用，对电刺激家兔脊髓神经所引起的疼痛有镇痛作用，并有镇静作用，对大白鼠甲醛性及蛋清性“关节炎”有一定程度的抑制作用。③对循环系统：细辛挥发油有降压作用。④对呼吸系统：100%煎剂（0.2~0.4ml/kg）静脉注射对兔有呼吸兴奋作用，并能对抗吗啡引起的呼吸抑制。⑤抑菌试验：细辛的乙醇煎液，在体外对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、痢疾杆菌以及伤寒杆菌有抑制作用。体外还有抑制结核杆菌作用。

18、桂皮（香桂）

土家语名：桂皮

土家语拼音：guif pir

国际音标：kui³⁵ pi²¹

【别名】官桂。

【来源】为樟科植物川桂 *Cinnamomum wilsonii* Gam-ble 和细叶香桂 *C. burmannii* (Nees) Bl. 的茎皮。

【性味】辛、微甘，温。

【功效】散寒温中，行气止痛。

【主治】脾胃虚寒，寒性胃痛，泄泻，痛经，经闭及阴疽等症。

【用量】3~6g。

【应用经验】

1、胃寒气痛：桂皮 10g 高良姜 9g 云木香 9g 枳壳 10g。水煎服。

2、寒凝血滞之痛经、经闭：桂皮 川芎各 9g 当归 12g 吴茱萸 艾叶各 6g。水煎服。

【备考】1、化学成分：茎、枝、叶和果实含川桂油（挥发油），油中为桉叶油素、

丁香酚、肉桂醛等。

19、风花菜

土家语名：热书卡普哈车

土家语拼音：ref sux kax pux hax cex

国际音标：ze³⁵ su⁵⁵ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵ xa⁵⁵ ts'e⁵⁵

【别名】风花草。

【来源】为白花菜科植物白花菜 *Rorippa palustris* (Leys.) Bess.，全草入药。

【性味】苦、辛，温。

【功效】散寒毒，消肿痛。

【主治】风寒节痛，冷气痛。

【用量】6~10g。

【应用经验】水肿胀症：风花草 15g 益母草 15g 车滕杆 10g 藤藤菜根 10g。
美如一剂，水煎二次服。

【备注】场行小毒。

20、造良

土家语名：女儿糙

土家语拼音：zir er caof

国际音标：tsi²¹ e²¹ ts'au³⁵

【别名】虎脚板。

【来源】为毛茛科植物鸡爪草 *Calathodes oxycarpa spraguc* 和多果鸡爪草 *C. polycarpa* Ohwi. 的全草。

【性味】干、辛，温。

【功效】散寒毒，开汗孔。

【主治】风湿麻木、鸡爪风、丸子等症。

【用量】6~9g。

【应用经验】

1、风湿麻木：米糙 6g 防风 10g 石南藤 10g 当归 10g 桂枝 10g 苡仁米 10g。

水煎内服。

2、小走胎：米糙 6g 胡黄连 6g 羊齿天冬 6g 白朮 5g 山药 10g。水煎内服。

第三章 赶湿毒药

土家语名：卡别列毒职业药

土家语拼音：kax biex liex duf jiex nier yaof

国际音标：k^a 55 pi^e 55 li^e 55 tu³⁵ tɕi^e 55 nie²¹ ja^u 35

凡具有化散体中湿气、驱赶体内毒邪功效，用于治疗湿毒病的药物称散寒毒药，又称赶雾毒药。

土家医认为湿毒（雾毒）邪气是自然界中湿气被雾毒感染成为湿雾毒气作用

于人体皮肤肚肠而发病。其病理变化为粘着缠绕，正邪互裹，邪的正下，使病反复，趋下。临床表现和体征因部位不同表现有异，湿雾毒气致病的共有症状和体征有身体沉重，如物缠裹，头闷胸闷，水肿，恶心呕吐，腹痛腹泻，病情缠绵难愈。舌苔白原或白腻，脉濡。

散湿（雾）毒药具有化散体中湿气和驱赶体内雾毒的双重功效，主用于治疗湿毒类病症，某些药还兼有祛风湿、化痰、理气、消食、利小便、止痢、止泻功效，用于治疗风湿病、痰咳症、腹胀症、食积症、尿积症、尿结石症、久痢症等。

常用治湿毒药有：土茯苓、白毛桑、鸡肝黄草、鸭儿嘴、梨罗根、路边黄、鱼蓼七、钓鱼竿、金丝发、小古屯、风花菜、小通草、冬葵草、草芙蓉、全毛白草等。

1、土茯苓

土家语名：莫胡踏

土家语拼音：mor hur tar

国际音标：mo²¹ xu²¹ t'a²¹

【别名】代粮根。

【来源】为百合科植物土茯苓 *Smilax glabra Roxb.* 的根茎。

【性味】甘、淡，平。

【功效】赶湿除毒，利关节。

【主治】红痧症，湿热淋浊，梅毒，带下，痈肿，瘰疬，疥癣，汞中毒所致的肢体拘挛，筋骨疼痛，银环蛇咬伤中毒等。

【用量】10~20g。

【应用经验】水银中毒拘挛症：土茯苓 30g 水灯草 6g 木瓜 10g 筋骨草 10g 伸筋根 10g。每日一剂，水煎二次服。

2、白马桑

土家语名：马桑阿实

土家语拼音：max sanx ar sir

国际音标：ma⁵⁵ san⁵⁵ a²¹ si²¹

【别名】白马骨。

【来源】为忍冬科植物白马骨 *Weigela japonica* Thunb. var. *Sinica* (Rehd.) Bailey 的根。

【性味】辛、甘，微温。

【功效】赶湿除毒，活血镇痛。

【主治】风湿筋骨疼痛，腰肌劳损，跌打损伤，湿疹皮肤瘙痒，痈肿疮毒。

【用量】6~12g。

【应用经验】

1、风湿筋骨疼痛：小白马桑根 15g 八月瓜根 15g 鸡血藤 15g 桑寄生 15g 石南藤 15g 三加皮 15g 白酒 1 kg 泡 7 日后，每次服 15ml，日服三次。

2、风湿腰痛、跌打损伤：白马桑 桑寄生 鹰爪风 五加皮 海风藤 伸筋草 各 9g，鸡心七 12g 木通 6g。水煎服或泡酒服。

3、湿疹、皮肤瘙痒：白马桑 山蚂蝗 蛇倒退 刺三加 石菖蒲 常春藤 艾叶各适量，水煎洗患处。

3、对叶四方草

土家语名：抗苦薄荷

土家语拼音：kanr kux bor hor

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ po²¹ xo²¹

【别名】山薄荷。

【来源】为叫做科植物显脉香茶菜 *Isodon nervosus* (Hemsl.) Kudo 的全草。

【性味】苦，寒。

【功效】赶湿除毒，清热止痒。

【主治】瘟黄症，疮毒湿疹，皮肤瘙痒。

【用量】10~30g。

【应用经验】

1、急性瘟黄症：对叶四方草 30g 马蹄金 15g 野黄花 15g。水煎服。

2、脓疱疮、湿疹、皮肤瘙痒：鲜对叶四方草适量，煎水洗患处。

4、鸡肝黄

土家语名：米实克查

土家语拼音：miv sir ker car

国际音标：mi⁵³ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】火草、鼠秋草。

【来源】为菊科植物秋鼠曲草 *Gnaphalium hypoleucum* Dc. 的全草。

【性味】甘、苦，平。

【功效】赶湿除毒，宣肺化痰。

【主治】湿气感冒，咳嗽痰多，气喘，下肢溃疡。

【用量】6~10g。

【应用经验】咳嗽多痰（白痰）：鼠曲草 10g 地茶 10g 羊奶叶 10g 琵琶叶 10g 枳茯苓 12g 陈皮 6g 姜半夏 6g。每日一剂，水煎二次服。

5、鸭儿嘴

土家语名：沙被炸起

土家语拼音：sax bif zaf qix

国际音标：sa⁵⁵ pi³⁵ tsa³⁵ tɕi⁵⁵

【别名】**星级**儿菜、猪皮股、鸭舌草。

【来源】为雨久花科植物鸭舌草 *Monochoria vaginalis* (Burm. f.) Presl. 的全草。

【性味】苦，寒。

【功效】赶湿除毒，清热消肿。

【主治】湿毒泻症，痢疾，牙龈脓肿，蛾子症，丹毒，疔疮肿。

【用量】6~12g，外用适量。

【应用经验】

- 1、赤白痢疾：鸭儿嘴适量，晒干，泡茶服，连服 3~4 天。
- 2、疔疮：鸭儿嘴加桐油，捣烂敷患处。
- 3、虫蛇咬伤：鲜鸭儿嘴草捣敷。

【备考】对金黄色葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌及白色葡萄球菌有抑制作用。

6、梨罗根

土家语名：梨罗机纳

土家语拼音：lir lor jix lar

国际音标：li²¹ lo²¹ tɕi⁵⁵ la²¹

【别名】黎辣根。

【来源】为鼠李科植物长叶冻绿 *Rhamnus crenat* Sieb. et Zucc. 的根皮。

【性味】苦，平。

【功效】赶湿除毒，杀虫止痒。

【主治】疥疮，癞痢头，牛皮癣，湿疹。

【用量】内服 10~20g，外用适量。

【应用经验】

1、闹疮（疥疮）：梨罗根皮 30g，研粉，生猪油适量拌匀，纱布包裹，放火上烘热，涂搽患处。

2、癞痢头：梨罗根 9g，水煎服，并取其根煎水擦洗患处。

3、湿疹：梨罗根 30g 花椒 9g 桉叶 15g，煎水外洗。

【备考】1、1、化学成分：根、茎、叶含柯桉素（驱虫豆素）、大黄酚（驱虫豆酸）等多种蒽醌类。

2、2、药理作用：柯桉素无抗菌作用，对皮肤、黏膜有刺激性，能治疗牛皮癣。

7、隔山撬

土家语名：隔山消

土家语拼音：gef sanx xiaox

国际音标：ke³⁵ san⁵⁵ ɕiau⁵⁵

【别名】白首乌、牛皮消、隔山消。

【来源】为萝藦科植物隔山消 *Cynanchum wilfordi* (Maxim.) Hemsl. 的根块。

【性味】甘、苦，微温。

【功效】赶湿化毒，健胃导滞。

【主治】饮食停滞，脾虚泻泄，食欲不振，胃痛，腹痛，脘腹胀满，水肿，白带，痈肿疮毒，产后乳汁稀少。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、胃痛：白首乌 大血藤各 9g 或白首乌 9g 一包针 15g。水煎服。

2、痢疾：白首乌 15g，水煎服。

3、痈：白首乌（鲜）适量，捣烂，兑酒或醋少许，敷患处。

【备考】1、1、化学成分：含磷脂酰胆碱、磷胆酰乙醇胺、磷脂肌醇酰及多种 C21 甾体苷。另含有肉珊瑚苷元、去酰基牛皮消苷元。

2、2、药理作用：1、块根对金黄色葡萄球菌极度敏感；对宋氏痢疾杆菌、伤寒杆菌中度敏感；对大肠杆菌、绿脓杆菌轻度敏感。2、抗蛇毒作用：300%水煎液 0.2ml/10g 剂量给小白鼠灌胃，对眼镜蛇保护率为 60%，200%醇浸液的保护率为 50%，但两者对五步蛇均无保护作用。

8、鱼个良

土家语名：宋海角七

土家语拼音：songf haix jiaox qix

国际音标：suŋ³⁵ xai⁵⁵ tɕiau⁵⁵ tɕi²¹

【别名】大叶蓼、小蓼子草、大马蓼、辣蓼、节蓼。

【来源】为蓼科植物酸模叶蓼 *Polygonum lapathifolium* L. 的全草。

【性味】味辛、苦，微温。

【功效】赶湿除毒，活血止痛。

【主治】疮疡肿痛，腹泻，痢疾，湿疹，痞积，风湿痹痛，跌打损伤，月经不调。

【用量】6~10g

【应用经验】火痢：节蓼根 15g 白头翁 10g 黄柏 10g 马齿苋 15g 海鲜珠 10g。每日一剂，水煎二次服。

【备考】1、提取物对亲水性气单胞菌、金色葡萄球菌、霍乱弧菌及真菌有抑制作用。

2、果实水煎剂对志贺和福氏痢疾杆菌一定抑制作用。

9、水菖蒲

土家语名：泽菖蒲

土家语拼音：cer canx pux

国际音标：ts'e²¹ ts'an⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】白菖、蒲剑、家菖蒲。

【来源】天南星科植物菖蒲 *Acorus calamus* L. 的根茎。

【性味】味辛、苦，温。

【功效】赶湿除毒，行气消胀。

【主治】痢疾，腹胀，消化不良，停食，痈疽。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、湿痰蒙窍，神志不清：水菖蒲 远志 郁金 半夏 茯苓各 9g 胆南星 6g。

每日一剂，水煎服。

2、易健忘：水菖蒲 30g 茯苓 60g 远志 12g 人参 12g。共为细末。每日三次，每次服 3g。

3、噤口恶痢：水菖蒲 30g 黄连 9g 五谷虫 9g 甘草 9g。共为细末。每日二次，每次 5g 蜜汤送服。

4、风湿、“粘”性刺痛，正偏头痛、坏血病、瘰疬疮疡、疥癣等：水菖蒲 30g 诃子 120g 制草乌 120g 木香 30g 麝香 10g。共为细末，制成水丸服。

10、金丝发

土家语名：金丝发

土家语拼音：jinx six huar

国际音标：tɕin⁵⁵ si⁵⁵ xua²¹

【别名】万年藓、松毛还阻、岩猴松。

【来源】为万年藓科植物万年藓 *Climacium dendroides* (Hedw.)

Web. et Mohr, 全草入药。

【性味】微辛，平。

【功效】赶湿除毒，生肌长皮。

【主治】尿痛尿不通，白黏液外流，烧烫伤。

【用量】6~10g，外用适量。

【应用经验】滴尿症：金丝发 6g 杉木浆 3g 水灯草 6g 八月藤 10g 白茅根 10g 车珠根 10g。每日一剂，水煎二次服，忌油腻。

【备注】不宜久煎。

11、小古屯

土家语名：木防己

土家语拼音：mur huanr jix

国际音标：mu²¹ xuan²¹ tɕi⁵⁵

【别名】夜角牛、木防己。

【来源】为防己科植物木防己 *Cocculus trilobus* (Thunb.) DC.，根入药。

【性味】辛、苦，寒。

【功效】赶湿除毒，消肿止痛。

【主治】湿痹，水肿，毒蛇咬伤

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、水肿脚气、小便不利：防己 黄芪 桂枝各 9g 茯苓 18g 甘草 6g。每日一剂，水煎服。

2、头面身肿，小便不好的风水症：防己 9g 黄芪 15g 白术 12g 甘草 6g 生姜 3片 大枣 3枚。每日一剂，水煎服。

3、膀胱湿热，小便不利：防己 9g 木通 6g 泽泻 9g 猪茯苓 12g。每日一剂，水煎服。

4、关节红肿热痛：防己 9g 知母 9g 黄柏 12g 牛膝 12g，每日一剂，水煎服。

【备注】场行小毒，外用多为生品。

12、小金钱草

土家语名：金钱草被

土家语拼音: jinx qianr caox bif

国际音标: tɕin⁵⁵ tɕian²¹ ts'au⁵⁵ pi³⁵

【别名】小马蹄草、黄疸草、马蹄金。

【来源】为旋花科植物马蹄金 *Dichondra repens* Forst., 全草入药。

【性味】苦、辛, 凉。

【功效】利水消肿, 退日止痢。

【主治】瘟黄水肿症, 亮肿症, 白浊, 痢疾, 跌打损伤。

【用量】内服 10~15g, 外用适量。

【备考】对白喉杆菌高度敏感, 对金黄色葡萄球菌中度敏感, 对溶血性链球菌、枯草杆菌和大肠杆菌轻度敏感。

13、小通草

土家语名: 通草被

土家语拼音: tongx caox bif

国际音标: tuŋ⁵⁵ ts'au⁵⁵ pi³⁵

【别名】鸡蛋黄花、棣棠花。

【来源】为蔷薇科植物棣棠花 *Kerria japonica* (L.) DC., 枝梢入药。

【性味】涩、甘, 温。

【功效】祛湿毒, 行气消食。

【主治】风湿节痛, 小儿腹胀, 湿疹。

【用量】6~10g。

【应用经验】小便不通、水肿: 小通条 6g 半边莲 10g 牛大碗 6g 枳茯苓皮 10g 水灯草 6g。每日一剂, 水煎服。

14、大夜关门

土家语名: 夜关门此巴

土家语拼音: yef guanx menr cix bax

国际音标: je⁵⁵ kuan⁵⁵ men²¹ ts'i⁵⁵ pa⁵⁵

【别名】咪芮考佳、羊蹄甲。

【来源】为豆科植物马鞍羊蹄甲 *Bauhinia faberi* Oliver, 根、枝叶入药。

【性味】苦、涩，温。

【功效】赶毒除湿，祛腐生肌，止痛散结。

【主治】天泡疮症，顽癣，湿疹，疮痍溃烂。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】天疮疮：大夜关门叶、锦龙叶、马桑叶生品各适量，捣烂外敷，每日一~二次。

15、冬葵

土家语名：冬狗子

土家语拼音：dongx goux zix

国际音标：tuŋ⁵⁵ kəu⁵⁵ tsi⁵⁵

【别名】滑肠菜，冬苋菜。

【来源】为锦葵科植物冬葵 *Malva verticillata* L., 种仁和叶入药。

【性味】咸，寒。

【功效】赶毒除湿，化丹毒。

【主治】湿热毒痢，黄疸，二便不通，丹毒，金疮。

【用量】6~10g，外用适量。

【应用经验】石淋症：冬葵子 10g 留行子 10g 车前子 10g 满天星 10g 叶下红（石苇）15g 斑鸡窝 15g 枳茯苓 12g 鸡内金 10g 八月藤 10g。每日一剂，水煎二次服。忌酸辣。

16、草芙蓉

土家语名：芙蓉实克查

土家语拼音：hur yongr sir ker car

国际音标：xu²¹ juŋ²¹ si²¹ k[°] e²¹ ts'a²¹

【别名】蜀葵。

【来源】为锦葵科植物蜀葵 *Althaea rosea* (L.) Cavan., 种子、花入药。

【性味】甘，寒。

【功效】赶毒除湿，散石利尿。

【主治】石淋，水肿，小便不利，痈疔。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】水肿症：蜀葵 15g 包谷须 10g 车前草 10g 白茅根 10g。每日一剂，水煎二次服。忌酸辣

17、全毛百草

土家语名：全毛百草

土家语拼音：qianr maor ber caox

国际音标：tɕian²¹ ma²¹ pe²¹ ts'au⁵⁵

【别名】黄毛百草、对匹草。

【来源】为爵床科植物全毛耳草 *Hedyotis chrysotricha* (Palib.) Merr, 全草入药。

【性味】苦，涩。

【功效】赶毒除湿，消肿止血。

【主治】白痢，阴黄，水肿，崩漏，毒蛇咬伤，蜈蚣咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】蜈蚣咬伤症：对匹草、蛇莓生品各适量，捣烂外敷伤口周围，每日一次。

18、连钱草

土家语名：八布那

土家语拼音：bar buf laf

国际音标：pa²¹ pu³⁵ la³⁵

【别名】马脚草，铜钱草、透骨消、穿墙草、活血丹。

【来源】为叫做科植物活血丹 *Glechoma longituba* (Nakai) Kupr. 的全草。

【性味】味苦、辣、冷。

【功效】赶毒除湿，活血疗伤，利尿排石，解蛊毒，赶湿退黄，发表止咯等。

【主治】跌打损伤，尿石症，黄疸症，热咯症，蛊毒症，便毒。

【用量】内服：水煎，15~30g，鲜品加倍。外用：适量，鲜品捣敷。

【应用经验】

1、砂淋、石淋：鲜连钱草 90-120g（鲜品减半） 车前草 海金沙各 30g。水煎服。

2、肾炎（急、慢性肾炎）：连钱草 葎草各 60g 车前草 30g。水煎服。

3、痈肿、毒蛇咬伤、皮肤疮痒：鲜连钱草捣烂外敷患处或煎水外洗。

【备注】阴毒，虚泻忌用。

【备考】1、1、化学成分：含挥发油，并含鞣质或苦味质、维生素C、胡萝卜素和胆碱。挥发油中主要成分为1-松茨酮、1-薄荷酮、 α -蒎烯、 β -蒎烯、柠檬烯等。

2、2、药理作用：1、用连钱草煎剂给大鼠灌胃，有显著利尿作用，连续应用则利尿作用降低，其酹剂则无利尿作用。2、有利胆作用，促进肝细胞的胆汁分泌，肝胆管内胆汁增加，胆道括约肌松弛，胆汁排除增加。3、本品对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌、福氏痢疾杆菌、宋氏痢疾杆菌、绿脓杆菌均有抑菌作用。

19、小凤尾草

土家语名：旦阿列碰被亏实克查

土家语拼音：rar lier pongf bif kuix sir ker car

国际音标：za²¹ lie²¹ p'uŋ³⁵ pi³⁵ k'ui⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】井口边草，龙须草，山鸡尾。

【来源】为凤尾蕨科植物凤尾草，又名井栏边草 *Pteris multifida* Poir.，全草或根茎。

【性味】淡，凉。

【功效】赶湿解毒，清热止血。

【主治】治疗热毒泄下，痢疾，瘟黄，便血，尿血等。

【用量】10~15g。

【应用经验】

1、疯狗咬伤：小凤尾草根茎，加酒捶绒外包，另用全草及化稿树皮，杨梅树皮，干者各 6g，煎水，每日洗三次。

2、烫火伤：小凤尾草叶，焙干为末，茶油调，以鸭毛蘸涂患处。

3、刀伤：小凤尾草嫩叶、酸浆草、糯米条，捣烂敷患处，每日换药一次。

【备考】有抗菌、抗肿瘤作用。

20、灯心草

土家语名：泽灯草

土家语拼音：cer denx coax

国际音标：ts[°]e²¹ ten⁵⁵ ts[°]au⁵⁵

【别名】水灯草。

【来源】为灯心草科植物水灯草 *Juncus effuses* L.，全草入药。

【性味】甘、淡，凉。

【功效】赶毒除湿，赶湿利尿。

【主治】湿热感冒，小便不利。

【用量】6~10g。

【备考】1. 有抗氧化作用。2. 能抑制微生物。

第四章 清热毒药

土家语名：杀格欵毒清理药

土家语拼音：saf geix duf qinx niex yaof

国际音标：sa³⁵ kei⁵⁵ tu³⁵ tɕ[°]in⁵⁵ ʒie⁵⁵ jau³⁵

具有清除体中热气、驱赶体内毒邪功效，用于治疗热毒病的药物称清热毒药。

土家医认为热毒邪气是自然界一种热气兼挟有毒邪的致病邪气，作用于机体皮肉之间而发病。其病理变化是正盛邪旺，相互争斗，使气血亢奋，驱邪于外；邪盛伤正，气血受伤，病情急重。因正邪量不同，病位不同，症状和体征各异，热毒病邪致病的共有症状和体征有：发热、肌肉关节酸痛、口干渴、大便干、小便黄赤短少，重者高热烦躁、神昏谵语，舌质红苔黄干，脉数。

清热毒药具有清除体中热气，驱赶体内毒邪的双重功效，主要用于治疗热毒

病症，某些药物还兼有消毒肿、止咳化痰、散结排脓、凉血、止血、止痢、止泻、退黄、利尿、通大便、解兽毒、攻癌毒、排食毒的功效，通过配方用于治疗咽喉肿痛、无名肿毒、肺脓肿、血热证、火痢症、热泻症、烧心症、热黄症、尿急症、毒蛇毒虫咬伤症、食毒症等。

常用清热毒药物有：山黄连、二郎箭、马尾莲、飞蛾七、五匹风、木芙蓉花、白毛冲天炮、龙胆地丁、地锦草、麦芽七、乱鸡窝、泥鳅串、鸳鸯花、降龙草、荞麦七、海鲜含珠、挂金灯、铁血子、黄疸树、锦灯龙、马尾七、地胆七、耗子七、蜂子七、七孔莲、半边连、半支莲、败毒莲、胡豆莲、惊风草、钻地风、土连翘、鱼腥草、百蕊草、焯菜、蛇泡草、百脉根、梁旺茶、培用卡姆、婆婆针、一把伞、蛇盘花等。

1、藤龙胆

土家语名：龙胆二拉

土家语拼音：longr danx ef lax

国际音标：e³⁵ la⁵⁵ luŋ²¹ tan⁵⁵

【别名】条胆。

【来源】为龙胆科植物双蝴蝶 *Tripterospermum affine* (Wall.) H. Smith 的全草。

【性味】苦，凉。

【功效】解毒散结。清肺止咳。

【主治】肺劳咳嗽咯血、肺脓疡、小儿高烧、疔疖疮毒、外伤出血等症。

【用量】6~9g。

【应用经验】

1、肺癆咯血、久咳、小儿高烧：藤龙胆 9~15g，加糖适量，水煎服。

2、肺痛：藤龙胆 20g 天门冬 15g 百合 15g。水煎服；或藤龙胆 芦根 冬瓜子各 15g 薏苡仁 12g 桃仁 9g 桔梗 6g。水煎服。

3、外伤肿痛：鲜藤龙胆全草捣烂外敷患处。

【备考】

1、化学成分：含苦味质、粘液质等，并呈明显的内脂反应。

2、药理作用：双蝴蝶水煎剂对黄色葡萄球菌有抑制作用。

2、飞个良

土家语名：他司卡普

土家语拼音：tax six kax pux

国际音标：t'a⁵⁵ si⁵⁵ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】红花蓼、花蝴蝶。

【来源】为蓼科植物赤胫散 *Polygonum runcinatum* Buch.-Ham. ex D. Don 和华赤胫散 *P. runcinatum* Buch.-Ham. et D. Don var. *sinense* Hemsl.，全草入药。

【性味】酸、涩，寒。

【功效】清热解毒，活血止痛。

【主治】痈肿疮疖，劳伤，腰痛，蛇咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用、适量。

【应用经验】

1、劳伤、腰痛：飞蛾七 15~30g，泡酒服。

2、奶疮：飞蛾七、野荞麦各适量捣烂，加酒糟搅匀敷患处。

【备考】1、化学成分：根茎含鞣质。

3、五匹风

土家语名：五爪龙

土家语拼音：wux zaox longr

国际音标：wu⁵⁵ tsau⁵⁵ luŋ²¹

【别名】五爪金龙，地五爪。

【来源】为蔷薇科植物地狐 *Potentilla kleiniana* Wight et Arn.，全草入药。

【性味】微甘、苦，寒。

【功效】清热解毒，祛风止咳，消肿止痛。

【主治】小儿惊风症，百日咳，咽喉肿痛，疟疾，痢疾，候耳疮，咳嗽气喘，跌打损伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、脓疱疮、湿疹、溃疡：五匹风鲜叶 60g 硫磺 15~30g，用桐油制膏外搽。
- 2、痈肿疮疖（未溃）：五匹风 黄瓜香 鱼腥草 千里光各等量。捣烂，外敷。
- 3、外感头痛、恶寒无汗：五匹风 15g 紫苏 10g 马蹄草 12g 生姜 6g。葱白为引，水煎服。

【备考】2、药理作用：全草对金黄色葡萄球菌、乙型溶血链球菌及炭疽、白喉、伤寒、痢疾、绿脓杆菌均有抑制作用。

4、木芙蓉花

土家语名：木芙蓉卡普

土家语拼音：mur hur yongr kax pux

国际音标：mu²¹ xu²¹ juŋ²¹ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】芙蓉。

【来源】为锦葵科植物木芙蓉 *Hibiscus mutabilis* L.，花入药。

【性味】辛、涩，平。

【功效】清热解毒，排脓消肿，凉血止血。

【主治】肺脓疡，痈肿疮疖，乳痈，红丝经症，候耳疮，烫火伤，蛇虫咬伤，跌打损伤，吐血，白带崩漏。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、烫火伤：木芙蓉花研极细末，麻油调敷患处。
- 2、外伤出血：木芙蓉花叶鲜品适量，捣烂外敷。
- 3、猴耳疮：木芙蓉花叶 冲天炮（均鲜品）各适量，加鸡蛋清捣敷患处。

【备考】1、1、化学成分：花含二十九烷、β-谷甾醇、白桦脂酸、硬脂酸己酯、豆甾醇-3,7-二酮、豆甾醇-4-烯-3-酮、三十四烷醇、槲皮素、山萘酚。

2、2、药理作用：1、白桦脂酸具抗癌抗炎活性。2、木芙蓉叶对小鼠巴豆油性耳部水肿、大鼠角叉菜胶性足肿及小鼠腹腔毛细血管通透性，均有明显的抑制作用；对大鼠棉球肉芽组织增生也有抑制作用。3、抑菌试验，花的水提液对溶血性链球菌有较强的抑制作用，叶对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

5、文王一支笔

土家语名：文王一支笔

土家语拼音：wenr wanr yir zix bir

国际音标：wen²¹ wan²¹ ji²¹ tsi⁵⁵ pi²²

【别名】借母怀胎、观音莲、鸡心七、笔包七、筒鞘蛇菰。

【来源】为蛇菰科植物筒鞘蛇菰 *Balanophora involucrata* Hook. f.，全草入药。

【性味】苦、涩，寒。

【功效】清热解毒，凉血止血，固肾涩精。

【主治】咳嗽咯血，血崩，痔疮肿痛，头晕，跑马症（遗精）。

【用量】3~6g。

【应用经验】

1、红崩：文王一支笔 9g 大蓟根 12g 映山红根 15g。炖肉服。

2、痔疮肿痛：文王一支笔 15g。炖猪大肠服。

3、刀伤出血：文王一支笔适量。为末，撒敷患处。

【备考】1、化学成分：含三萜醇、一把伞甾醇、β-香树脂醇、棕榈酸。

6、白开口箭

土家语名：抗苦七布机纳

土家语拼音：kanr kux qif buf jix lar

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ tɕi³⁵ pu³⁵ tɕi⁵⁵ la²¹

【别名】可口豆根、百两金。

【来源】为紫金牛科植物百两金 *Ardisia crispa* (Thunb.) A. DC，根茎入药。

【性味】苦、涩，凉。

【功效】清热解毒，利咽祛痰，活血舒筋。

【主治】咽喉肿痛，风火牙痛，痈疽肿毒，虫蛇咬伤，跌打损伤。

【用量】3~6g。

【应用经验】咽喉肿痛症：白开口箭 7g 锦灯笼 10g 山豆根 10g。每日一剂，

水煎二次服。

【备考】1、对金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、脑膜炎球菌及炭疽、白喉、痢疾杆菌均有不同程度的抑制作用。2、有祛痰作用。

7、白毛冲天炮

土家语名：是嘎阿实冲天炮

土家语拼音：sif gax ar sir xiaf kux coax

国际音标：wo²¹ si²¹ wu³⁵ tɕi³⁵ tɕi⁵⁵

【别名】散血草、筋骨草、朴地虎、金疮小草。

【来源】为**叫做科**植物金疮小草 *Ajuga decumbens* Thunb.，全草入药。

【性味】苦、甘，寒。

【功效】清热解毒，止咳化痰。

【主治】咽喉肿痛，痢疾，痈肿疮毒，肺热咳嗽，咯血衄血，跌打损伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、咽喉肿痛：鲜白毛冲天炮 30~60g，水煎服，慢慢含咽。

2、痢疾：鲜白毛冲天炮 90g，捣烂绞汁，稠密炖，温服。

3、疮毒、咯血、衄血、便血：鲜白毛冲天炮 15~24g，水煎服，或鲜白毛冲天炮、丝瓜叶、见血飞各适量捣烂，敷患处。

【备考】1、1、化学成分：含黄酮类成分脱皮甾酮、杯苋甾酮以及少量的筋骨草甾酮 B、微量的筋骨草酮 C、筋骨草内酯。并检出生物碱、皂甙、鞣酸等酸性物质。根含筋骨草糖。

2、2、药理作用：1、用氨水喷雾法刺激小鼠致咳，证明白毛冲天炮的酸性乙醇提取物黄酮、总酸酚、总生物碱或皂苷均有一定的止咳作用，其中以黄酮甙的止咳作用较好，并有一定的祛痰作用和平喘作用。2、其浸膏对大鼠有预防四氯化碳所致的肝损伤作用。3、乙醇-乙醚提取的有效成分对甲型链球菌、卡他球菌具有较强的抑制作用，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌亦有很好的抑制作用。④对大白鼠有利尿作用。⑤对麻醉猫和犬有降压作用。

8、地锦草

土家语名：亡泽亏被实克查

土家语拼音：manr cer kuix bif sir ker car

国际音标：man²¹ ts'e²¹ k'ui⁵⁵ pi³⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】奶浆草、对匹草、草血竭。

【来源】为大戟科植物地锦草 *Euphorbia humifusa* Willd.，全草入药。

【性味】微辛、涩，平。

【功效】清热解毒，凉血止血，利尿消肿，通乳。

【主治】痢疾尿血，便血，崩漏，痔疮出血，吐血，咯血，子宫出血，外伤出血，腹泻，蛇咬伤，下肢溃疡，湿疹，乳汁不通。

【用量】内服 10~30g，外用适量。

【应用经验】

1、咯血、尿血、便血、红崩：地锦草 30g，同红糖炒焦，加水煎服。

2、痢疾、腹泻：地锦草 辣蓼 铁苋菜各 30g。水煎服。

3、蛇咬伤：地锦草 刘寄奴 石榴叶 茶叶各等量。共捣烂外敷。

【备考】1、1、化学成分：全草含黄酮类（槲皮素等）、没食子酸、没食子酸甲酯、内消旋肌醇。叶含鞣质 12.89%。

2、2、药理作用：1、地锦草在体外有很强的抑菌作用，抗菌谱很广，对金黄色葡萄球菌及白喉杆菌均有极强的抑制作用，对痢疾杆菌、草绿色链球菌、溶血性肺炎双球菌、变形杆菌、肠炎杆菌、百日咳杆菌、大肠杆菌、伤寒杆菌、甲型副伤寒杆菌等亦有较强的抗菌作用。地锦草酊剂有抗白喉毒素作用。2、止血试验，取地锦草全草干粉未撒于狗动脉切开处，止血效果明显。3、中和毒素试验：地锦草 100%、50%、25%酊剂对白喉毒素有明显的“中和”作用。

9、过路黄

土家语名：拉司奶

土家语拼音：lax six naix

国际音标：la⁵⁵ si⁵⁵ ʒai⁵⁵

【别名】金钱草、小过路黄、走游草。

【来源】为报春花科植物过路黄 *Lysimachia christinae* Hance，全草入药。

【性味】淡，凉。

【功效】清热解毒，利尿通淋。

【主治】胆结石，泌尿系结石，小便淋痛，湿热黄疸，痢疾，痈肿疔毒，虫蛇咬伤，中毒。

【用量】10~30g，外用适量。

【应用经验】

1、尿结石：过路黄 30g 石韦 车前草各 9g 海金沙 6g。水煎服。

2、瘟黄症：过路黄 大青叶各 15g 车前草 9g。水煎服。

【备考】1、1、化学成分：全草含黄酮类化合物：槲皮素、槲皮素-3-O-葡萄糖甙、山柰素、山柰素-3-O-半乳糖甙、山柰素-3-O-珍珠菜三糖甙及 3, 2' , 4, 6' -四羟基, 4, 3' -二甲氧基查耳酮。此外还含氨基酸、鞣质、氯化钠、氯化钾等。

2、2、药理作用：1、本品有利胆作用，促进肝胆汁分泌、胆道括约肌松弛。2、本品水煎剂，对金黄色葡萄球菌有抑制作用。3、本品水煮醇沉法所制针剂及总黄酮成分对急性炎症渗出与慢性炎症反应均有非常显著的抑制作用。④金钱草对小鼠的细胞免疫和体液免疫均有抑制作用，增强小鼠巨噬细胞和嗜中性白细胞的吞噬功能；与环磷酰胺并用可加强免疫抑制作用。

10、小路边黄

土家语名：拉司奶被

土家语拼音：lax six naix bif

国际音标：la⁵⁵ si⁵⁵ ʒai⁵⁵ pi³⁵

【别名】过路黄、小过路黄。

【来源】为报春花科植物聚花过路黄 *Lysimachia congestiflora* Hemsl.，全草入药。

【性味】微辛、苦，平。

【功效】解毒利湿，止咳化痰。

【主治】湿气人地，咽喉肿痛，黄疸，痢疾，咳嗽多痰。

【用量】内服 10~30g，外用适量。

【应用经验】胆黄症：路边黄 30g 山栀子 10g 黄花丁 10g 冲天炮 10g 川楝子 10g 白毛滕 10g。每日一剂，水煎二次服。

11、麦个良

土家语名：瓦所西

土家语拼音：wax sox xix

国际音标：wa⁵⁵ so⁵⁵ ɬi⁵⁵

【别名】上天梯、三块瓦、麦吊七、山酢浆草。

【来源】为酢浆草科植物山酢浆草 *Oxalis griffithii* Edgew. et Hook. f.，全草或根入药。

【性味】酸、涩，寒。

【功效】清热解毒，消肿止痛。

【主治】赤白痢疾，瘟黄症，淋症，血尿，痒子，乳痈，带状疱疹，月经不调，白带，外伤出血，跌打损伤，风湿性腰痛。

【用量】10~15g。

12、鸳鸯花

土家语名：翁各卡普

土家语拼音：ongx gor kax pux

国际音标：uŋ⁵⁵ ko²¹ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】二花、忍冬花。

【来源】为忍冬科植物忍冬花 *Lonicera japonica* Thunb.，花入药。

【性味】甘，寒。

【功效】清热解毒，消肿散结。

【主治】温病发热，热毒血痢，痈疮，肿毒，瘰疬，痔漏。

【用量】10~15g。

【应用经验】1、肺热咳嗽症：银花 10g 高笋根 10g 功劳叶 10g 胡颓叶 10g

桑白皮 10g 枇杷叶 10g。每日一剂，水煎二次服。

2、疗疮发热症：鸳鸯花 15g 紫地丁 10g 黄地丁 10g 野菊花 10g 千年老鼠尿 10g 五爪龙 10g。每日一剂，水煎二次服。

【备考】1、抗菌作用广。对金黄色葡萄球菌，绿脓杆菌，大肠、宋氏痢疾、伤寒杆菌，肺炎球菌、乙型溶血链球菌、脑膜炎双球菌，百日咳杆菌、白喉杆菌均有抑菌作用，浸剂作用比煎剂作用显著。2、对埃柯病毒、**疱疹病毒**有抑制作用。3、能减少肠道对胆固醇的吸收。④有兴奋中枢神经系统的作用。⑤有抗早孕作用。

13、降龙草

土家语名：子尼嘎被实克查

土家语拼音：zìv nír gar bif sīr ker car

国际音标：tʂi⁵³ ʒi²¹ ka²¹ pi³⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】小母猪草、拉拉藤、葎草。

【来源】为桑科植物葎草 *Humulus scandens* (Lour.) Merr.，全草入药。

【性味】甘、苦，寒。

【功效】清热解毒，利尿通淋。

【主治】肺劳潮热，热泻，痢疾，外感发热，小便不利，亮肿症，尿路结石，痈疖肿毒，湿疹，皮肤瘙。

【用量】内服 10~15g，外用适量。

【应用经验】

1、肺劳症：降龙草 30g 矮地茶 石仙桃各 12g。水煎服。

2、尿急症（泌尿系统感染）、腹泻：降龙草 120g 水煎服。

3、蛇咬伤：鲜降龙草，捣烂外敷。

【备考】1、1、化学成分：全草含木樨草素-7-葡萄糖甙、胆碱及天门冬酰胺，其他尚有挥发油、鞣质及树脂；球果含葎草酮、蛇麻酮；叶含大波斯菊苷、牡荆素；种子含脂肪油。

2、2、药理作用：茎、叶的乙醇浸液在试管内对革兰阳性菌有显著抑制作用。葎草酮与蛇麻酮有抗菌作用，对革兰阳性及阴性细菌某些真菌、酵母菌的生长有

抑制作用。对革兰阴性细菌的作用，葎草酮为蛇麻酮的 1/20，对结核杆菌的作用为蛇麻酮的 1/10。

14、荞个良

土家语名：青麦七

土家语拼音：qinx mer qir

国际音标：tɕin⁵⁵ me²¹ tɕi²¹

【别名】荞麦当归、苦荞头、野荞子、金荞麦。

【来源】为蓼科植物金荞麦 *Fagopyrum cymosum* Meisn.，块根及全草入药。

【性味】涩，平。

【功效】清热解毒，止咳化痰。

【主治】肺热人地，胸痛，咯黄浓痰，盗汗。

【用量】10~15g。

【应用经验】

- 1、关节肿痛：鲜荞麦七全草 60g，水煎服或泡酒服。
- 2、小儿盗汗：荞麦七嫩尖 7 个，切碎炒鸡蛋吃。
- 3、腹胀：荞麦七根 15g 连线草 15g。水煎服。或用茎叶 6~9g，泡水当茶喝，可治肝炎，亦可预防。

【备考】1、1、化学成分：块根含双聚原矢车菊苷元、海柯皂苷元、β-谷甾醇和羟基蒽醌类物质及野荞麦苷，后者为对羟基桂皮酸衍生物的葡萄糖苷。花、叶含大量芸香苷，干叶含 7%，干花含 13%。此外还有甾醇、有机酸、酚性物等。

2、2、药理作用：1、水煎剂、酒剂对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌均有较强的抑制作用。对大肠杆菌和绿脓杆菌也有抑制作用。2、能促进白细胞吞噬细菌的作用。3、有显著的祛痰作用。

15、胡豆连

土家语名：豌豆七

土家语拼音：wanx douf dir

国际音标：wan⁵⁵ təu³⁵ tɕi²¹

【别名】胡豆七、豌豆七、山豆根、鄂豆根。

【来源】为豆科植物鄂豆根 *Euchresta tubulosa* Dunn, 全株入药。

【性味】苦、辛，寒。

【功效】清热解毒，利咽止痛。

【主应考】急、慢性喉咙肿痛，痢疾，热泻，瘟黄，烧心症，火眼。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、急慢性咽喉肿毒、胸胁脘腹疼痛：胡豆连研成细粉，温开水送服。
- 2、痢疾、腹泻：胡豆连 3g 雄黄连 6g 珍珠香 6g。共研细末，温开水送服。
- 3、火眼：胡豆连种子捣烂，与乳汁共捣，取上清液点眼。
- 4、失眠：胡豆七 9g 珍珠香 3g 夜交藤 9g。水煎服。
- 5、劳伤：胡豆七 45g 黄花倒水莲 15m 牛尾七 红毛七各 9g，白酒 250ml，浸泡 1 周，日服二次，每次 10ml。

16、海蚌含珠

土家语名：海蚌含珠

土家语拼音：haix banf hanr zux

国际音标：xai⁵⁵ pan³⁵ xan²¹ tsu⁵⁵

【别名】铁苋菜。

【来源】为大戟科植物铁苋菜 *Acalypha australis* L.，全草入药。

【性味】苦、涩，平。

【功效】清热解毒，止血止泻。

【主治】湿疹，痢疾，吐血、衄血、下血及外伤出血。

【用量】10~15g。

【应用经验】热泻症：海蚌含珠 10g 鸡爪莲 6g 牙心莲 10g 九牛胆 6g 水木香 6g。每日一剂水煎二次服，忌辛辣。

【备考】1、对痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌有抑制作用。2、对毛果芸香碱引起的流涎有对抗作用。3、有止泻作用。④有平喘作用。

17、挂金灯

土家语名：灯笼实克查

土家语拼音：denx longr sir ker car

国际音标：ten⁵⁵ luŋ²¹ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】康的笼草、天泡子。

【来源】为茄科植物灯笼 *Physalis pubescens* L.，全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】清热解毒，利尿消肿。

【主治】肺热人地，肺脓疡，咽喉肿痛，牙龈肿痛或出血，候耳疮，痢疾，水肿，热淋，天泡疮，疔疮，丸子肿痛，小便不利，血尿。

【用量】10~15g。

【应用经验】咽喉肿痛：挂金灯 7g 蛾子草 7g 蛇莓 7g 土半膝 10g 九牛胆 7g。每日一剂，水煎二次含服。

18 铁血子

土家语名：铁血子

土家语拼音：ter xier zix

国际音标：tie²¹ ɕie²¹ tsi⁵⁵

【别名】金莲花。

【来源】毛茛科植物金莲花 *Trollius chinensis* Bge.，花入药。

【性味】苦，寒。

【功效】清热解毒，消肿散结。

【主治】肺热人地，乳蛾肿痛，喉咙痛，脓耳，火眼，口疮，疔疮。

【用量】3~6g。

【应用经验】

1、皮肤筋红症（急性淋巴管炎）、火眼（急性结膜炎）：铁血子 6g 野菊花 10g 笔管草 15g 甘草 3g。水煎服。

2、急、慢性蛾子症：铁血子 6g 地苦胆 6g 一把伞 15g。开水泡，当茶饮，并可含漱。

【备考】1、1、化学成分：金莲花含苣荬草苷、牡荆甙、藜芦酰胺和软脂酸。

2、2、药理作用：1、抑菌试验，金莲花抑菌谱较广，能较好的抑制固紫染色阳性球菌和固紫染色的阴性球菌。如对绿脓杆菌、肺炎双球菌、甲型链球菌、卡他球菌、痢疾杆菌均有较强的抑制作用。2、动物亚急性毒性试验，给家兔肌注金莲花提取液 1.6g/kg，对谷丙转氨酶、非蛋白氮、血象均未见明显的影响，但对注射局部有刺激反应，由于做试验的动物不多，尚需进一步研究。

19、黄疸树

土家语名：他色黄连

土家语拼音：tax ser huanr lianr

国际音标：t'a⁵⁵ se²¹ xuan²¹ lian²¹

【别名】刺黄连、三颗针、土黄柏、庐山小檗。

【来源】为小檗科植物庐山小檗 *Berberis uirgetorum* Schneid.，茎及根入药。

【性味】苦，寒。

【功效】清热解毒，利湿退黄。

【主治】热泻菌痢，喉咙痛，火眼，尿急症，热淋，疮疡肿，黄疸，胆痛。

【用量】6~10g。

【应用经验】瘟黄症：黄疸树 20g 粘手蒿 30g 山栀子 10g 地耳草 15g 狗牙草 30g 白毛滕 15g。每日一剂，水煎二次服，忌油腻。

20、锦灯笼

土家语名：灯笼此巴

土家语拼音：denx longr cix bax

国际音标：ten⁵⁵ lun²¹ ts'i⁵⁵ pa⁵⁵

【别名】挂金灯、大天泡子、酸浆草。

【来源】为茄科植物酸浆草 *Physalis alkekengi* L. var. *franchetii* (Mast.) Makino, 全草入药。

【性味】酸、苦，寒。

【功效】清热解毒，消肿止痛。

【主治】热咳，咽痛，黄疸，痢疾，水肿，疔疮，丹毒。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】丹毒症：挂金灯叶适量。用法：生品在火上烤热后搽细泥，涂患处，每日二次。

【备注】场行小毒。

【备考】1、对绿脓杆菌，金黄色葡萄球菌有抑制作用。2、可一时性抑制心脏搏动，血压可一时性下降。3、可增强心肌收缩作用，并能引起微弱的血管收缩及血压升高。4、对子宫有收缩作用，作用比脑垂体后叶素快而短。

21、鼻血莲

土家语名：翁起血莲

土家语拼音：ongf qix xier lianr

国际音标：uŋ³⁵ tɕi⁵⁵ ɕie²¹ lian²¹

【别名】千金藤。

【来源】为防己科植物千金藤 *Stephania japonica* (Thunb.) Miers，根、茎入药。

【性味】苦、辛，微寒。

【功效】清热解毒，祛风活络，止痛，祛瘀消肿。

【主治】痢疾，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，无名肿毒，风湿性热痹痛，胃痛，跌打损伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、跌打损伤：鼻血莲 15g 当归 15g 红花 6g 桃仁 9g。研末，每次 3g，温酒吞服。

2、痈肿疔毒、胃痛：鼻血在研末，每次 3~6g，开水吞服。

【备考】1、1、化学成分：含千金藤碱、原千金藤碱、表千金藤碱、假表千金藤碱、高千金藤碱等生物碱。

2、2、药理作用：1、从千金藤中提得的季铵型生物碱和西 g 拉诺林碱，用于大鼠坐骨神经腓肠肌标本进行试验，表明有骨髓肌松弛作用。2、有降压作用

和神经节阻滞、抑制胃收缩及胃液分泌等作用。3、L-千金藤立定对小鼠有镇痛作用，其镇痛作用不产生耐受性。④L-千金藤立定对伤寒、副伤寒杆菌致热大鼠有解热作用。⑤豚鼠静脉注射千金藤立定 10mg/kg，可增加豚鼠哇巴因的耐受量，能预防急性心肌缺血诱发的大鼠及氯仿-肾上腺素引起的兔心律失常。腹腔注射 60mg/kg，可预防氯仿诱发的小鼠室颤。离体实验中，千金藤立定碱能抑制豚鼠乳头肌的收缩性，延长功能不应期，降低自律性，而对其兴奋性则无明显的影响。

22、马个良

土家语名：写马鞭

土家语拼音：xiex max bianx

国际音标：ɕie⁵⁵ ma⁵⁵ pian⁵⁵

【别名】铁马鞭、铁马钱、马鞭梢、马鞭草。

【来源】马鞭草科植物马鞭草 *Verbena officinalis* L.，全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】清热赶毒，通经散瘀。

【主治】痢疾，牙龈肿痛，瘟黄症，尿急症，咽喉肿痛，月经不调。

【用量】内服 10~15g，外用适量。

【应用经验】

- 1、火痢、淋症：鲜马鞭草 30g，水煎服。
- 2、牙肿痛（牙周炎、牙龈炎）：马鞭草 30g，水煎服。
- 3、闭经、腰腹坠痛：马鞭草 茜草根 益母草各 15g。水煎服。
- 4、乳痛：鲜铁马鞭叶 鲜苦苣菜各适量，米酒少许，捣烂外敷。
- 5、筋骨痛、腰痛：铁马鞭根 125g 三叶青 15g。焙干研粉，黄酒或白酒送服，每次 6g，早晚各一次。

【备考】1、1、化学成分：全草含两种内酯类物质，马鞭草甙、马鞭草醇以及腺甙、鞣质、挥发油等。

2、2、药理作用：1、本品有促进家兔血液凝固的作用。2、水煎剂有一定的镇咳作用。3、针剂在控制疟疾症状和杀疟原虫方面效果较好，控制症状宜在发作前 2-3 小时注射，它能使疟原虫变形。④水及醇提取物对家兔结膜囊滴入芥子

油而引起的炎症有消炎作用。⑤马鞭草苷对哺乳动物有持久的促进乳汁分泌作用。马鞭草对妊娠人体子宫有一定的兴奋作用。⑥马鞭草煎剂对金黄色葡萄球菌和痢疾杆菌有抑制作用。⑦抗炎止痛作用。⑧抗癌作用。⑨抗溃疡作用。⑩降血糖作用。

23、红牛个良

土家语名：务吉提克面姐

土家语拼音：wuf jir tir kex mianx jiex

国际音标：wu³⁵ tɕi²¹ ti²¹ k'e⁵⁵ mian⁵⁵ tɕie⁵⁵

【别名】红牛膝、剪刀牛膝、土牛膝、柳叶牛膝。

【来源】为苋科植物柳叶牛膝 *Achyranthes longifolia* Mak.，根、茎入药。

【性味】甘，平。

【功效】清热解毒，赶湿利尿，活血止痛。

【主治】感冒发热，咽喉肿痛，月经不调，小便不利，贫血，痈疽。

【用量】内服6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、咽喉肿痛：鲜土牛膝60~120g，洗净捣烂取汁，日服三次；或鲜土牛膝、鲜芙蓉叶各15g，水煎，日服三次。

2、跌打损伤、痛经：土牛膝 益母草各15g 泽兰叶 马鞭草各9g。水煎加酒适量兑服。

【备注】有毒性。

【备考】1、化学成分：根含皂苷、甜菜碱、糖类及粘液汁。其皂苷元为齐墩果酸。全草含倒扣草碱及促皮质甾醇。

2、药理作用：1、抗菌作用：本品茎、叶煎剂对金黄色葡萄球菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌有抑制作用，本品根在体内有中和白喉杆菌毒素作用，并有预防白喉的作用。2、对循环系统的作用：从本品中提出的粗皂苷，能使离体蛙心、兔心、豚鼠心和在位兔心的收缩力明显加强；可增强衰竭心脏收缩力；从本品全草中提出的总生物碱部分（内含二种生物碱），能使麻醉狗血压升高，短暂的兴奋呼吸，加强心脏收缩。3、其他作用：对大白鼠有轻度利尿作用，并能

拮抗各种物质引起的肠管和子宫平滑肌痉挛。④倒扣草碱在体外能使蛙腹直肌收缩，且不被箭毒碱所阻断。⑤倒扣草碱对大鼠有解热作用。⑥抗生育。

24、蜂个良

土家语名：米马七

土家语拼音：miv max qir

国际音标：mi⁵³ ma⁵⁵ tɕi²¹

【别名】可取蜂子、三爪金、地蜂子、三叶委陵菜。

【来源】为蔷薇科植物三叶委陵菜 *Potentilla freyniana* Bornm.，根、叶入药。

【性味】苦、涩，凉。

【功效】清热解毒，活血止血，生肌止痛。

【主治】外伤出血，痢疾，腹泻，胃痛。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、痢疾腹泻：地蜂子 1-2g，切细开水吞服。
- 2、胃痛：地蜂子研粉，开水送服，每服 1-2g。
- 3、跌打损伤、腰痛：地蜂子 30g 臭牡丹 20g 金腰带 10g。泡酒服。
- 4、小儿疳积：地蜂子 6g 耳叶牛皮消 9g 小槐花根 6g 麦斛 6g 羊齿天门冬 6g 南瓜木香各 6g。水煎服。

【备注】注意：孕妇慎服，小儿剂量宜小。

25、七孔莲

土家语名：业咚嘎莲

土家语拼音：nex dongr gaf lianr

国际音标：ɲie²¹ tuŋ²¹ ka³⁵ lian²¹

【别名】紫金钟、仰天钟、朝天罐。

【来源】为野牡丹科植物假朝天罐 *Osbeckia crinita* Benth. et Wall.，全草入药。

【性味】甘、涩，凉。

【功效】清热解毒，止咳化痰。

【主治】红崩，痢疾，虚咳。

【用量】6~10g。

【应用经验】妇女红崩症：七孔莲 10g 仙鹤根 10g 棕板炭 10g 松柏叶炭 10g 四棱草根（炒）10g。每日一剂，水煎二次服。

26、败毒莲

土家语名：满天星

土家语拼音：manx tianx xinx

国际音标：man⁵⁵ tian⁵⁵ ɕin⁵⁵

【别名】满天星、苦苣菜、苦碟子。

【来源】菊科植物多头苦 *Ixeris polycephala* Cass. [*Lactuca polycephala*(Cass.) Benth]，全草入药。

【性味】苦、辛，寒。

【功效】清热解毒，消肿止痛。

【主治】肠痈，实热嗓子嘶哑，咽喉肿痛，火牙痛，烧心症，黄水疮，痔疮。

【用量】6~10g。

【应用经验】蛾子症：败毒莲 15g 飞蛾七 10g 山豆根 10g 挂金灯果 6g 六月凉 10g。每日一剂，水煎二次服。

【备考】1、能降低氧代谢、提高耐氧功能，可增加脑血流量，改善微循环。2、对血小板聚集有抑制作用，能增强纤维蛋白溶解酶的活性。3、有镇痛镇静作用。

27、惊风草

土家语名：惊风实克查

土家语拼音：jinx hongx sir ker car

国际音标：tɕin⁵⁵ xuŋ⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】小远志、瓜子金。

【来源】为远志科植物瓜子金 *Polygala japonica* Houtt.，全草入药。

【性味】苦、淡，平。

【功效】清热解毒，止咳化痰。

【主治】小儿惊风，疔疮肿毒，蛇伤，口腔炎，咽喉炎。

【用量】6~10g，外用适量。

【应用经验】小儿惊风症：惊风滕也 6g 水灯草 6g 双勾勾 6g 生石膏 10g。
每日 1~2 剂水煎服。

【备考】有镇静催眠作用及溶血作用。

28、钻地风

土家语名：钻地风

土家语拼音：zuanx dif hongx

国际音标：tsuan⁵⁵ ti³⁵ xuŋ⁵⁵

【别名】兔耳风、小一支箭、一枝香、老虎舌头、独灯台、毛大丁草。

【来源】为菊科植物毛大丁草 *Gerbera piloselloides* Cass.，全草入药。

【性味】苦、辛、涩，平。

【功效】清热解毒，止血，止咳。

【主治】咯血，咳嗽，腹胀，消化不良。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、疝肿症（急性肾炎）：鲜独灯台草加食盐少许捣烂，敷肚脐上，2 小时后除去，每日一次，连敷 3 天，第一天行脐部隔姜艾灸。忌盐。

2、腰痛、跌打损伤：独灯台 60g，水煎服；或鲜全草 21g 百两金 9g。酒水各半煎服。

3、咽喉肿痛、蛾子症：独灯台 鲜百合 节节草 赤小豆各 15g 车前草 9g。水煎服。

【备考】1、有降压、解痉作用。2、对金黄色葡萄球菌、变形杆菌、痢疾杆菌、伤茎杆菌均有抑制作用。

29、一点红

土家语名：尔他八提面姐

土家语拼音：ex tax bar tir mianx jiex

国际音标: e⁵⁵ t'a⁵⁵ pa²¹ t'i²¹ mian⁵⁵ tɕie⁵⁵

【别名】叶下红、大苦麻菜、红背叶羊蹄草。

【来源】为菊科植物一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC., 全草入药。

【性味】苦, 凉。

【功效】清热解毒, 通乳利尿, 止痛止痢。

【主治】横痃症, 脓耳症, 痢疾。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、热泻症、尿急症: 大苦麻菜 15~30g, 水煎服。

2、跌打损伤、瘀血肿痛: 大苦麻菜、酢酱草鲜品各适量, 捣烂, 加酒少许, 炒热外敷。

3、乳痛: 大苦麻菜、葱头各适量, 红糖少许, 同捣烂。敷患处, 每日换一次。

【备考】1、1、化学成分: 含 *simiral*、β-谷甾醇、棕榈醇、蜜蜂酸, 另含 4 个黄酮苷和 2 个生物碱。

2、2、药理作用: 1、提取物对腺病毒 (3 型)、鼻病毒 (17 型) 等呼吸道病毒有抑制作用。2、对金黄色葡萄球菌亦有抑制作用。

30、土茵陈

土家语名: 散梦克思

土家语拼音: sanf mongf kex six

国际音标: san³⁵ muŋ³⁵ k'e⁵⁵ si⁵⁵

【别名】阴行草、糯蒿、细绒蒿、菘蒿。

【来源】为玄参科植物菘蒿 *Pheheirospermim japonicum* (Thunb.) Kanitz., 全草入药。

【性味】平、微辛, 凉。

【功效】清热解毒, 赶湿消黄。

【主治】黄疸, 水肿, 风热感冒, 疮肿。

【用量】

【应用经验】

- 1、瘟黄症（黄疸肝炎）、小便短赤：金钟茵陈 15g 梔子 9g 地柏枝 30g 老萝卜头 9g。水煎服。
- 2、热淋、血淋：金种茵陈 车前草 白茅根各 30g。水煎服。
- 3、烫火伤：金种茵陈适量，焙干，研细末，加少许冰片，油调外擦。

31、王瓜

土家语名：王瓜

土家语拼音：wanr guar

国际音标：wan²¹ kua²¹

【别名】土瓜、山苦瓜、水瓜、山冬瓜、毛瓜六。

【来源】为葫芦科植物王瓜 *Trichosanthes cucumeroides* (Ser.) Maxim.，果实入药。

【性味】苦，凉。

【功效】清热解毒，活血散瘀。

【主治】消渴，黄疸，痈疽，毒蛇咬伤，跌打损伤，乳蛾肿痛，烫火伤。

【用量】6~10g，外用适量。

【应用经验】陈旧蛇咬伤及毒蜂、蜈蚣螫伤：山苦瓜（童便浸）干品。开水磨汁涂于伤口周围。

【备注】场行小毒。

32、铃铃草

土家语名：日阿被拉实克查

土家语拼音：rar bif lax sir ker car

国际音标：za²¹ pi³⁵ la⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】鸡肠子草、田鹅儿肠、无心菜。

【来源】为石竹科植物无心菜 *Arenaria serpyllifolia* L.，全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】清热解毒，止咳止血，利尿利尿。

【主治】肺癆，骨折，风湿关节炎，耳鸣耳聋，肾虚。

【用量】10~15g。

【应用经验】鼻渊耳响耳闭（咽鼓管炎）：玲玲草 15g 水菖蒲 10g 天丁 6g 响玲草 7g 蝉衣 6g。每日一剂，煎二次服。

33、扁竹草

土家语名：母实克查

土家语拼音：mux sir ker car

国际音标：mu⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】野铁扫把、路柳。

【来源】为蓼科植物篇蓄 *Polygonum aviculare* L.，全草入药。

【性味】味微苦，凉。

【功效】清热解毒，利水排石。

【主治】尿急症，结石，外伤出血。

【用量】10~15g。

【应用经验】尿急症：篇蓄 15g 车前草 15g，白茅根 10g 山梔子 10g 黄剥皮 10g。每日一剂，水煎二次服，忌辛辣。

【备考】1、有利尿、止血、降压作用。2、能增加子宫张力。3、抗菌作用。

34、背蛇生

土家语名：背蛇生

土家语拼音：beif ser senx

国际音标：pei³⁵ se²¹ sen⁵⁵

【别名】一朵云、阴地蕨、独脚鸡。

【来源】为阴地蕨科植物绒毛阴地蕨 *Botrychium lanuginosum* wall.，全草入药。

【性味】淡，平。

【功效】清热解毒，平肝散结。

【主治】乳蛾肿痛，疮毒，瘰疬，眼翳。

【用量】3~6g。

【应用经验】咳嗽咽喉肿痛：背蛇生 10g 鱼腥草 15g 肺形草 10g 桔梗 10g 黑

参 10g。每日一剂，水煎 2 次服。

【备考】有滋补功效。

35、金鸡脚

土家语名：日阿吉拖嘎

土家语拼音：rar jir tox gar

国际音标：za²¹ tɕi²¹ t'o⁵⁵ ka²¹

【别名】鸡爪蕨、三角蕨、金鸡脚。

【来源】为水龙骨科植物金鸡脚 *Phymatopsis hastata* (Thunb) Kitag, 全草入药。

【性味】微苦，凉。

【功效】清热解毒，开咽利喉。

【主治】外新人地，小儿惊风，咽喉肿痛，乳蛾肿大，痈疔疮，毒蛇咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

36、水龙骨

土家语名：泽铺鲁嘎

土家语拼音：cer puf lux gax

国际音标：ts'e²¹ p'u³⁵ lu⁵⁵ ka⁵⁵

【别名】青根。

【来源】为水龙骨科植物水龙骨 *Polypodium niponicum* Mett, 根茎入药。

【性味】微苦、涩，凉。

【功效】退热解毒，散湿止咳。

【主治】小儿外感，天毒高热，咳嗽气喘，热淋，风湿热痹，风团，疮疔肿毒。

【用量】内服 6~10g，外敷适量。

【应用经验】天毒高热症：水龙骨 6g 凉粉树 6g 水牛角 15g 生石膏 10g 水灯草 6g。每日一剂，水煎二次服。

37、鱼腥草

土家语名：上矮

土家语拼音：sanf ngaix

国际音标：san³⁵ ŋai⁵⁵

【别名】鸡儿根、汁儿根、蕺菜、侧耳根。

【来源】为三白草科植物鱼腥草 *Houttuynia cordata* Thunb.，全草入药。

【性味】辛，微寒。

【功效】清热解毒，利尿消肿

【主治】肺痈，乳蛾肿大，热淋，奶疮。

【用量】内服 10~30g，外敷适量。

【应用经验】肺内生疮症：鱼腥草 20g 乔三七 15g 鸳鸯花 15g 桔梗 10g 大贝母 10g 花血藤 7g。每日一剂，煎二次服。

38、地瓜

土家语名：里提枇杷

土家语拼音：lix tir pir par

国际音标：li³⁵ ti²¹ pi²¹ p'a²¹

【别名】地枇杷。

【来源】为桑科植物地瓜 *Ficus tikoua* Bur. 茎叶果入药。

【性味】果：甘，平。茎叶：苦，平。

【功效】清热解毒，利湿消肿。

【主治】重感冒，热淋，腹泻，红痢。

【用量】6~10g。

39、天葵子

土家语名：千年热色

土家语拼音：qianx nianr rer ser

国际音标：tɕian⁵⁵ ʒian²¹ ze²¹ se²¹

【别名】夏无踪、千年老鼠屎、三百转。

【来源】为毛茛科植物天葵子 *Semiaquilegia adoxoides* (DC.)

Makino，块根入药。

【性味】甘、苦，寒。

【功效】清热解毒，利尿消肿。

【主治】疔疮肿毒，乳痈，乳蛾肿痛，丸子肿大（淋巴结炎），小便不利。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、丸子肿痛：老鼠屎（天葵子）7.5g 小蘑芋 1 个 生半夏 10g，先将蘑芋挖空，将天葵子、生半夏置洞中，加桐油适量放红灰中煨熟，捣烂外敷。

2、九子丸：将鸡蛋打一小孔，放入老鼠屎（天葵子）5 粒，蒸熟吃鸡蛋，每日 1 个，连吃 12 个为一个疗程。

40、山腊梅

土家语名：抗苦腊梅

土家语拼音：kanr kux lar meir

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ la²¹ mei²¹

【别名】野腊梅、亮叶腊梅。

【来源】为腊梅科植物亮叶腊梅 *Chimonanthus nitens* Oliv.，叶入药。

【性味】苦、辛，凉。

【功效】清热解毒，宽胸止咳。

【主治】小伤寒（流感），胸闷，久咳，毒蚂蚁咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】小伤寒症（流感）：山腊梅 15g 金丝桃 10g 六月雪 10g 一支黄花 10g 水蜈蚣 7g。每日一剂，煎水服。

41、血水草

土家语名：灭泽实克查

土家语拼音：miev cer sir ker car

国际音标：mie⁵³ ts'e²¹ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】一口血、血灌肠。

【来源】为罂粟科植物血水草 *Eomecon chionantha* Hance, 根茎入药。

【性味】苦，凉。

【功效】清热解毒，散瘀消肿。

【主治】红眼病，毒蛇咬伤，疔疮疖肿，疥癣湿疹，小儿皮肤胎毒。

【用量】内服 3~6g，外用适量。

【应用经验】

- 1、癬疮：血灌肠根 15g 地老鼠 20g。研末调醋搽患处，每天搽 3-6 次效佳。
- 2、湿疹：血水草 20g 苦参 15g 天青地白各 20g。焙干，研末，调茶油搽患处。
- 3、产后腹痛：血水草 6g 香血藤 15g 血当归 10g 枳壳 10g。水煎服。
- 4、黄水疮：鲜黄水草适量，捣烂取汁外搽；亦可晒干研粉，调麻油搽。
- 5、痈疽肿毒：鲜黄水草 鲜苦瓜叶 青蒿 铧头草 蛇参叶各适量。捣烂外敷或研末调豆渣敷。
- 6、猴耳疮症（腮腺炎）：黄水草 一把中各 15g 鸳鸯花藤 乌菘梅 薄荷各 6g。水煎服。

【备注】场行小毒。

【备考】1、1、化学成分：全草含生物碱类和内酯。地下部分含白屈菜红碱、血根碱、原托品碱、 α -别隐碱、氧化血根碱、羽扇豆醇乙酯等。

2、2、药理作用：1、本品所含的生物碱对金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、甲型链球菌、乙型链球菌、舒氏痢疾杆菌、宋氏痢疾杆菌、副伤寒杆菌及变形杆菌均有不同程度的直接抑菌作用；血根碱和白屈菜红碱对动物有抗肿瘤作用，但对人毒性大。此二碱用作抗菌剂抗菌谱很广，对多种细菌、真菌和滴虫均有很强杀灭作用。2、血水草素对白细胞吞噬能力和网状内皮系统吞噬能力的影响，试验结果表明可以增强吞噬细胞的活性。

42、蔊菜

土家语名：抗苦油菜思

土家语拼音：kanr kux your caif six

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ iəu²¹ ts'ai³⁵ si⁵⁵

【别名】野油菜、大干鱼菜。

【来源】为十字花科植物蔊菜 *Rorippa montana* (Wall.) Small, 全草入药。

【性味】甘、淡，凉。

【功效】清热解毒，镇咳利尿。

【主治】天毒外感发热，咽喉肿痛，肺热咳嗽，风湿关节痛，小便不利，漆疮，蛇咬伤，疔疮痈肿。

【用量】内服 10~15g，外敷适量。

【应用经验】

1 木的蛇开口（手指感染）、疔疮肿毒：鲜野油菜、鲜地苦胆汁、黄花地丁各等份，捣烂敷患处。

2、咳嗽气喘：野油菜、地枇杷果、无花果各等分，糖少许，水煎服。

3、漆疮（漆过敏）：鲜野油菜捣烂，加菜油少许，外敷患处。

【备考】1、1、化学成分：含蔊菜素、蔊菜酰胺，还含有有机酸、黄酮类、微量生物碱。种子含脂肪油。

2、2、药理作用：①蔊菜素均有镇咳、祛痰作用；蔊菜酰胺具有镇咳作用。临床观察表明，每人每日口服 200~300mg，连服 20 天，有一定的止咳、化痰、平喘作用。服药后痰量显著减少，蔊菜素较蔊菜水煎剂（90g/ d）疗效为高，头晕、口干、胸闷等副作用明显降低。②蔊菜素对肺炎球菌、流感杆菌、金黄葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等有不同程度抑菌作用。

43、大叶金腰

土家语名：尔他此巴金腰

土家语拼音：ex tax cix bax jinx yaox

国际音标：e⁵⁵ t'a⁵⁵ ts'i⁵⁵ pa⁵⁵ tɕin⁵⁵ jau⁵⁵

【别名】毛白菜、鹿蹄草、八斗甲、马耳朵。

【来源】为虎耳草科植物大叶金腰 *Chrysosplenium macrophyllum* Oliv., 全草入药。

【性味】苦、涩，平。

【功效】清热解毒，收敛生肌。

【主治】小儿高热惊风，穷骨疮，烧烫伤。

【用量】内服 10~15g，外敷适量。

44、蛇泡草

土家语名：窝三叶泡

土家语拼音：wov sanx yex paox

国际音标：wo⁵³ san⁵⁵ je⁵⁵ p'au⁵⁵

【别名】蛇莓、三叶蛇泡草、三匹风。

【来源】为蔷薇科植物蛇莓 *Duchesnea indica* (Andr.) Focke，全草入药。

【性味】甘，微苦，凉。

【功效】清热解毒，散瘀止痛，散结消肿。

【主治】天毒外感发热，咳嗽，小儿高热惊风，咽喉肿痛，猴儿疮，疔疮肿毒，毒蛇咬伤，红眼病，癌肿发热，腰带疮。

【用量】内服 6~10g，外敷适量。

【应用经验】

1、痢疾、尿急症：鲜蛇泡草 15~30g。水煎服。

2、腰痛：蛇泡草 15g 石南腾 15g。泡酒服。

3、猴耳疮症（腮腺炎）：蛇泡草 12g 射干 10g 地苦胆 10g 鸳鸯花 12g。水煎服。

4、腰带疮：鲜三匹风适量，搗烂取汁涂患处。每日 2~三次。

【备注】场行小毒。

【备考】1、1、化学成分：种子油中的脂肪酸主要是亚油酸（5.31%），非皂化物质有羟醇和甾醇，甾醇中的主要成分是β-谷甾醇（占总甾醇量的 89.5%）。

2、2、药理作用：①体外试验蛇莓对志贺氏、史密氏、福氏、及宋氏型痢疾杆菌有不同程度的抑制作用，其中对志贺氏痢疾杆菌作用最强，对宋氏痢疾杆菌作用最差。②蛇莓水提物对体外培养的 Eca-109 细胞生长有较强的抑制效应；对细胞的有丝分裂有抑制作用，能抑制细胞的 DNA 合成。③蛇莓流浸膏和注射剂对家兔、豚鼠、大鼠的离体及家兔在体子宫均呈兴奋作用。④本品注射剂对麻醉兔及狗均有短暂的降压作用，此作用不被注射阿托品或切断两侧迷走神经所减弱。

⑤本品流浸膏对小鼠巨噬细胞的吞噬机能较有明显的促进作用。⑥蛇莓有显著的

抗凝作用。

45、百脉根

土家语名：抗苦罗华生

土家语拼音：kanr kux lor huar senx

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ lo²¹ xua²¹ sen⁵⁵

【别名】野花生、野豌豆。

【来源】为豆科植物百脉根 *Lotus corniculatus* L.，全草入药。

【性味】微辛，平。

【功效】清热解毒，止咳平喘。

【主治】热邪人地，咽喉肿痛，上肚灼热，疮疖，痔疮。

【用量】内服 10~15g，外敷适量。

【应用经验】中元痞满气逆：百脉根 12g 小蛇参 6g 陈皮 6g 法半夏 10g 香附子 10g。水煎内服。

【备考】1、化学成分：全株含 5, 7, 3'，47-四羟基-8-甲氧基-黄酮醇 3-0-β-D-半乳糖甙、刀豆酸、齐墩果酸、皂苷、半乳糖配甘露聚糖以及硫胺素、核黄素等。

46、夜合草

土家语名：烂才阿纳实克查

土家语拼音：lanf caix av lar sir ker car

国际音标：lan³⁵ ts'ai⁵⁵ a⁵³ la²¹ si²¹ kie²¹ ts'a²¹

【别名】田皂角。

【来源】为豆科植物田皂角 *Aeschynomene indica* L.，全草及种子入药。

【性味】甘、苦，凉。有毒。

【功效】清热解毒，明目利尿。

【主治】热泻，痢疾，热淋，红眼病，夜盲，疖肿。

【用量】内服 10~15g，外敷适量。

【应用经验】红眼症：鸡爪莲 6g 夜合草 10g 小血藤 10g 白菊花 7g 木贼 10g

夏枯球 6g。每日一剂含服。

【备考】清热解毒用全草，治眼疾用种子。

47、铜锤草

土家语名：铜锤草

土家语拼音：tongr cuir caox

国际音标：t'uŋ²¹ ts'ui²¹ ts'au⁵⁵

【别名】红花酢浆草、土田七。

【来源】为酢浆科植物酢浆草 *Oxalis corymbosa* DC.，全草入药。

【性味】酸、寒。

【功效】清热解毒，散瘀消肿。

【主治】咽喉肿痛，痈疮，毒蛇咬伤，热淋，跌打损伤，痛经。

【用量】内服 10~30g，外敷适量。

【应用经验】

1、跌打损伤、劳伤腰痛、风湿麻木：铜锤 10g 毛姜 10g 血三七 10g 三百棒 12g 鸡血藤 12g 血当归 12g 扣子七 10g 白酒 1 kg。浸泡 3 天即可服，日服三次，每次 15g。

2、痈肿疗毒：鲜铜锤块茎捣烂敷患处。

3、小儿停食症（消化不良）：鲜铜锤用淘米水磨汁服，每次服药量不得超过 1g。

48、黑石神

土家语名：烂嘎得尔他

土家语拼音：lanf gax der ex tax

国际音标：lan³⁵ ka⁵⁵ te²¹ e⁵⁵ t'a⁵⁵

【别名】黑面叶。

【来源】为大戟科植物黑面叶 *Breynia fruticosa* (L.) Hook. f.，根入药。

【性味】苦，寒。

【功效】清热解毒，散瘀止痛。

【主治】胃热呕吐，肠热泻下，咽喉肿痛。

【用量】10~15g。

【应用经验】胃热煌的症：黑石神 10g 土藿香 10g 灶心土 15g 功劳木 10g 半支莲 10g 石贝牙 10g。每日一剂，含服。

【备注场行小毒。

49、雀儿舌头

土家语名：是被玉那

土家语拼音：nief bif yif laf

国际音标： $\text{ɲie}^{35} \text{pi}^{35} \text{ji}^{35} \text{la}^{35}$

【别名】水托基。

【来源】为大戟科植物水托基 *Andraehnae chinensis* Bunge，根入药。

【性味】苦，平。

【功效】清热解毒，散瘀止痛。

【主治】外感发热，咽喉肿痛，热呕泻，风湿关节痛，产后腹痛。

【用量】10~15g。

【应用经验】

1、红眼症（急性结膜炎）：雀舌草 菊花 车前草各 15g。水煎服。

2、咽喉肿痛：雀舌草 15g 开喉箭 9g。水煎服。

3、肺劳症：雀舌草 120g，白酒 1000ml，浸泡 7 日，每次 8ml。每日三次。

【备注场行小毒。

【备考】1、化学成分：叶含胡萝卜素、挥发油、维生素 C、维生素 K、5-羟色胺（5-HT）、吲哚基醋酸、吲哚-3-乙腈、类臭素。

50、山黄花

土家语名：抗苦王嘎里卡普

土家语拼音：kanr kux wanr gax lix kax pux

国际音标： $\text{k'an}^{21} \text{ku}^{55} \text{wan}^{21} \text{ka}^{55} \text{li}^{55} \text{k'a}^{55} \text{p'u}^{55}$

【别名】构皮芫花。

【来源】为瑞香科植物构皮芫花 *Wikstroemia effusa* Rehd.，根入药。

【性味】淡，平。

【功效】清热解毒，祛风除湿。

【主治】乳痈，猴儿疮，风湿热痛。

【用量】内服 3~6g，外用适量。

【应用经验】猴耳疮症：山黄花叶（生）适量，敷患处，每日一次。

【备注】场行小毒。

51、丁香蓼

土家语名：丁香蓼

土家语拼音：denx xianx liaof

国际音标：ten⁵⁵ ɕian⁵⁵ liau³⁵

【别名】红旱莲草、丁香蓼、田葵。

【来源】为柳叶菜科植物丁香蓼 *Ludwigia prostrata* Roxb.，全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】清热解毒，利湿消肿。

【主治】热泻，痢疾，热淋，痈疔疮，肾病水肿。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、水肿：水丁香 30g，酌加水煎，加冰糖，饭前服，每日二次。

2、痈疽肿毒：鲜水丁香洗净，合酸饭及盐少许，共捣烂敷患处。

52、梁王菜

土家语名：梁王茶

土家语拼音：lianr wanr car

国际音标：lian²¹ wan²¹ ts'a²¹

【别名】克和望菜、毛莲叶、吹火叶、三杆枪。

【来源】为五加科植物梁王菜 *Nothopanax aelavayi* (Franch.) Harms，枝叶入药。

【性味】甘、苦，凉。

【功效】清热解毒，活血舒筋。

【主应考】急性咽喉肿痛，红眼病，谷物不化，风湿痹痛。

【用量】内服 10~15g，外敷适量。

【应用经验】

【备考】同科植物崇叶梁王茶有类似功效。

53、走吆竹

土家语名：走吆母业

土家语拼音：zoux yaox mux nier

国际音标：tsau⁵⁵ jau⁵⁵ mu⁵⁵ ɳie²¹

【别名】青莢叶、竹上子、叶上珠。

【来源】为山茱萸科植物青莢叶 *Helwingia japonica* (Thunb.)

Dietr.，茎叶或根入药。

【性味】苦、涩，凉。

【功效】清热解毒，活血化瘀。

【主治】痢疾，疮疖肿痛，毒蛇咬伤，跌打损伤，胃痛，月经不调。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、痢疾：叶上珠 25g 马齿苋 豨莶草各 15g 薤白 10g。水煎服。

2、大便后出血：叶上珠 15g 白及 10g 柿饼 3 枚 三月刨根 15g 黄花根 30g。
水煎服。

3、外伤出血：叶上珠适量，捣烂外敷。

54、小报春

土家语名：利恩切实克查被亏

土家语拼音：lif enr qief sif ker car bif kuix

国际音标：li³⁵ en²¹ tɕie³⁵ si²¹ ke²¹ ts'a²¹ pi³⁵ k'ui⁵⁵

【别名】小毛虎耳草、翠兰报春。

【来源】为报春花科植物小报春 *Pamula forbesii* franch，全草入药。

【性味】辛、甘，凉。

【功效】清热解毒，消肿止痛，解酒毒。

【主治】高热人地，咽喉肿痛，口痛牙痛，风湿节痛。

【用量】6~10g。

【应用经验】火牙痛症：小报青生品适量，捣烂冲凉水漱口，每日三次。

55、培用卡的良

土家语名：培用卡蒙

土家语拼音：peir peir kar mongr

国际音标：pei²¹ pei²¹ ka²¹ muŋ²¹

【别名】华山矾。

【来源】为山矾科植物华山矾 *Symplocos chinensis* (Louy.) Druce，根或枝叶入药。

【性味】苦、涩，凉。

【功效】清热解毒，治痢止泻。

【主治】痢疾，热泻。

【用量】6~10g。

【应用经验】火痢：培用卡姆根 15g 鸡爪莲 10g 血蜈蚣 7g 黄剥皮 10g 酸模根 6g。每日一剂，煎二次服。

56、肺形草

土家语名：他司捏龙

土家语拼音：tax six niex longx

国际音标：t'a⁵⁵ si⁵⁵ ɬie⁵⁵ luŋ⁵⁵

【别名】双蝴蝶、滕龙胆。

【来源】为龙胆科植物双蝴蝶 *Crawfurdia fasciculate* Wall，全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】清热止咳，解毒散结。

【主治】肺热人地，肺癆咳血，肺痈，热淋，乳痈，疔疮疔肿。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】肺热咳嗽伴咽喉痛：肺形草、桑白皮各 10g 功劳叶 10g。每日一

剂，水煎二次服。

【备考】2、药理作用：水煎剂对金黄色葡萄球菌抑制作用。

57、臭黄荆

土家语名：梅花被

土家语拼音：meir fax bif

国际音标：mei²¹ xua⁵⁵ pi³⁵

【别名】小梅花。

【来源】为马鞭草科植物臭黄荆 *Premna ligustroides* Hemsl.，枝叶入药。

【性味】辛、微甘，平。

【功效】叶：清热解毒，消肿止痛；根：调经壮阳。

【主治】叶治痢疾，痔疮，脱肛，牙痛；根治月经不调、阳痿。

【用量】6~10g。

58、耳挖草

土家语名：翁且古主实克查

土家语拼音：ongr qief gux zux sir ker car

国际音标：uŋ²¹ tɕie³⁵ ku⁵⁵ tsu⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】韩信草、顺经草、调羹草。

【来源】为叫做科植物韩信草 *Scutellaria indica* L.，全草入药。

【性味】苦、微辛，凉。

【功效】清热解毒，活血散瘀。

【主治】肺痈，痢疾，热泻，疔疮，毒蛇咬伤，蜂刺伤。

【用量】内服 10~15g。外用适量。

【应用经验】疔疮：耳挖草鲜品适量，捣烂敷面部，每日一次。

【备考】根含汉黄芩素，全草含黄酮、氨基酸、有机酸。

59、粘手蒿

土家语名：借阿纳克思

土家语拼音: jief av lar kex six

国际音标: tɕie³⁵ a⁵³ la²¹ k'e⁵⁵ si⁵⁵

【别名】倒挂金钟，腺毛阴行草。

【来源】为玄参科植物腺毛阴行草 *Siphonostegia laeta* S. Moore, 全草入药。

【性味】微苦，微寒。

【功效】清热解毒，止咳化痰，退黄消肿。

【主治】着凉症，小儿高烧症，肺热咳嗽、哮喘，黄疸症、毒蛇咬伤。

【用量】内服 10~30g，外用适量。

【应用经验】烧心口舌症（胆汁返流胃炎）：土茵陈 15g 半支莲 15g 郁金 15g 水木香 10g 黄花丁 10g 枳壳 10g 甘草 5g。每日一剂，水煎二次服，忌油腻。

60、疳积草

土家语名：疳积实克查

土家语拼音: ganx jir sir ker car

国际音标: kan⁵⁵ tɕi²¹ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】爵床。

【来源】为爵床科植物爵床 *Postellularia procumbens* (L.) Nees, 全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】清热解毒，利尿消疳，杀虫。

【主治】外感发热，三分症（疟疾），咽喉肿痛，痢疾热泻，风水肿，热淋，疳积，在白，疔疮疔肿。

【用量】内服 10~15g，外用适量。

【应用经验】小儿走胎：疳积草 5g 野黄豆瘤根 3g 鸡内金 5g 叶下珠 3g 五谷虫 3g。每日一剂，水煎二次服。

61、丰花草

土家语名：丰花草

土家语拼音: hongx fax caox

国际音标: xuŋ⁵⁵ xua⁵⁵ ts'au⁵⁵

【来源】为茜草科植物丰花草 *Borreria stricta* (L. f.) G. E. W. Mey., 全草入药。

【性味】辛，凉。

【功效】清热解毒，消肿止痛。

【主治】外感发热，咽喉肿痛，呕吐热泻，蜈蚣及蛇咬伤。

【用量】内服 15~30g，外敷适量。

【应用经验】蜈蚣咬伤：生丰花草适量，捣烂敷伤口周围，每日一次。

62、大金刀

土家语名：泽兰此巴

土家语拼音：cer lanr cix bax

国际音标：ts'e²¹ lan²¹ ts'i⁵⁵ pa⁵⁵

【别名】华泽兰、大泽兰、红升麻。

【来源】为菊科植物华泽兰 *Eupatorium chinense* L., 根入药。

【性味】辛、苦，凉。

【功效】清热解毒，利咽化痰。

【主治】白喉，乳蛾肿大，风热感冒，肺热咳嗽，麻疹，蛇虫咬伤。

【用量】内服 15~30g，外用适量。

【应用经验】

1、风湿痹痛症：红升麻 9g 白四块瓦 12g 红茴香根皮 9g（先煎 1 小时）水煎黄酒冲服。

2、胃痛、水泻：红升麻 16g 青木香 10g。焙干研粉，开水冲服。

【备考】1、1、化学成分：根状茎含落新妇甙、岩白菜内酯（矮茶素）及有机酸；有机酸为 2-羟基苯乙酸、4-羟基苯甲酸、香草酸，此外尚含鞣质、淀粉等。

2、2、药理作用：①动物实验证明有明显镇咳、祛痰作用，并能对抗组织胺所致支气管痉挛作用；矮茶素治疗慢性气管炎有较好的效果。②能抑制金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌及卡他球菌等。

63、马兰丹

土家语名：马兰丹

土家语拼音：max lanr danx

国际音标：ma⁵⁵ lan²¹ tan⁵⁵

【别名】叭拉旦、包谷草、泥鳅串。

【来源】为菊科植物全叶马兰 *Kalimeris integrifolia Turcz*，全草及根入药。

【性味】淡，凉。

【功效】清热解毒，散瘀消积。

【主治】外感发热，咳嗽，咽喉肿痛，猴儿疮，胁痛，胃疡，痢疾，热泻，小儿疳积。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、猴儿疮（腮腺炎）：鲜马兰适量，捣烂敷患处。

2、小走胎：马兰 600g 藿香 120g 生姜 30g 炒扁豆 150g 车前草 300g 山楂 150g。水煎浓缩至 1:1 合剂，日服 1-2 次，每次 50-100ml。

3、外伤出血：鲜马兰叶适量，捣烂敷患处。

【备考】

1、化学成分：含挥发油，油中含乙酸龙脑脂、甲酸龙脑脂、酚类、二聚戊烯、辛酸、倍半萜烯、倍半萜醇等。

2、药理作用：本品鲜全草煎剂对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有抑制作用，对甲型链球菌、肺炎球菌、绿脓杆菌、副大肠杆菌、宋氏痢疾杆菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌、炭疽杆菌均无抑制作用。有抗惊厥、镇痛作用。

64、一年蓬

土家语名：拉拢阿夫

土家语拼音：lax longx ax hux

国际音标：la⁵⁵ luŋ⁵⁵ a⁵⁵ xu⁵⁵

【别名】女苑、墙头草、地白菜、油麻菜。

【来源】为菊科植物一年蓬 *Erigeron annuus* (L.) Pers.，全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】清热解毒，助消止泻。

【主治】丸子肿（淋巴结炎），肝病黄疸，消化不良，腹泻，血尿。

【用量】6~10g。

【备考】提取物有降血糖作用。

65、婆婆针

土家语名：阿妈定额阿

土家语拼音：ax max **anx** ngax

国际音标：a⁵⁵ ma⁵⁵ an⁵⁵ ŋa⁵⁵

【别名】鬼针草、一包针。

【来源】为菊科植物鬼针草 *Bidens bipinnata* L.，全草入药。

【性味】苦、平。

【功效】清热解毒，散瘀消肿。

【主治】肠痈，泄泻，咽喉肿痛，胃痛，水肿，三分症，跌打损伤。

【用量】10~20g。

【备考】同属植物狼把草、三叶鬼针草、羽叶鬼针草均有清热解毒功效。

66、野菊花

土家语名：抗苦菊花

土家语拼音：kar **kux** jir fax

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ tɕi²¹ xua⁵⁵

【别名】黄花菊、苦意、毛蒿子。

【来源】为菊科植物野菊花 *Dendranthema indicum* (L.) Des **Monl.**，花蕾入药。

【性味】苦、辛，寒。

【功效】清热解毒，调肝祛风。

【主治】春夏脑瘟，时行感冒，肝病，头昏。

【用量】6~10g。

67、莲蓬草

土家语名：莲蓬实克查

土家语拼音：lianr pongr sir ker car

国际音标：lian²¹ 看他 puŋ²¹ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】大吴风草、土紫菀。

【来源】为菊科植物大吴风草 *Farfugium japonicum*(L.) kitam, 全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】清热解毒，凉血活血。

【主治】风热感冒，咽喉肿痛，疮毒，瘰疬，跌仆伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

68 一炷香香

土家语名：所那致

土家语拼音：sox laf zif

国际音标：so⁵⁵ la³⁵ tsi³⁵

【别名】见风散、笔管草。

【来源】为菊科植物笔管草 *Scorzonera albicaulis* Bunge, 根入药。

【性味】甘，温。

【功效】清热解毒，除湿平喘。

【主治】外感发热，腰带疮，乳痈，疔疮，关节痛，哮喘。

【用量】服 6~10g。

69、黄败酱

土家语名：黄败酱

土家语拼音：huanr baif jianf

国际音标：xuan²¹ pai³⁵ tɕian³⁵

【别名】万丈深。

【来源】为菊科植物万丈深 *Crepis lignea*(Vant.) Babc., 根入药。

【性味】苦、辛，微寒。

【功效】清热解毒，化积消痞。

【主治】肺热人地，小儿疳积。

【用量】6~10g。

70、蒲公英

土家语名：一把伞

土家语拼音：pur gongx yinx

国际音标：p'u²¹ kuŋ⁵⁵ jen⁵⁵

【别名】芮奔寅。

【来源】为菊科植物一把伞 *Taraxacum mongolicum* Hand. Mazz.，全草入药。

【性味】苦、辛，微寒。

【功效】清热解毒，消肿散结。

【主治】风热人地，咽喉肿痛，胃灼痛，热泻，胆瘁，乳痈，肠疡，痢疾，热淋，痈疖疔疮。

【用量】内服6~10g，外用适量。

【备考】同属植物华一把伞有相同功效。

71、毛连连

土家语名：毛连连

土家语拼音：maor lianr lianr

国际音标：mao²¹ lian²¹ lian²¹

【别名】野芥菜、川西黄鹤菜。

【来源】为菊科植物川西黄鹤菜 *youngia prattii* (Babc) Babcet stebb，全株入药。

【性味】苦、辛。

【功效】清热解毒，利水消肿。

【主治】热泻，水臌胀，小便不利，乳痈，疮疖肿毒。

【用量】内服6~10g，外用适量。

72、老君扇

土家语名：老君南切

土家语拼音: laox jinx lanr qief

国际音标: lau⁵⁵ tɕin⁵⁵ lan²¹ tɕie³⁵

【别名】射干。

【来源】为鸢尾科植物射干 *Belamcanda chinensis* (L.) DC.，根茎入药。

【性味】苦，寒。

【功效】清热解毒，活血祛痰。

【主治】咽喉肿痛，咳嗽多痰，臃胀，乳痈，跌打损伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

【备考】1、对皮肤癣菌、疱疹病毒、埃柯病毒均有抑制作用。2、促进唾液分泌作用。3、降压作用。4、对皮肤肿瘤抑制作用。

73、小千年棕

土家语名: 千年棕被亏

土家语拼音: qianx nianr zongx bif kuix

国际音标: tɕian⁵⁵ ʒian²¹ ts'uŋ⁵⁵ pi³⁵ k'ui⁵⁵

【别名】虾脊兰、马牙七、九子莲。

【来源】为兰科植物剑叶虾脊兰 *Calanthe davidii* Franch，茎入药。

【性味】辛、苦，寒。

【功效】清热解毒，散瘀止痛。

【主治】肝病，瘰疬，慢性咽喉病，胃疡，胃张，腰腿痛，跌打损伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、瘟黄症: 马牙七 6g 丹参 15g 紫金牛 15g。水煎服，每日一剂，连服 2 周为一疗程。

2、胃疡症、烧心症（溃疡病、胃炎）: 马牙七 延胡索 浙贝 白及各 9g 乌贼骨 6g 南五味根 15g。水煎服，每日一剂。

【备注】场行小毒。

74、岩柴胡

土家语名：阿柴胡

土家语拼音：ar cair hur

国际音标：a²¹ ts'ai²¹ xu²¹

【别名】花柴胡、岩升麻、水柴胡。

【来源】为菊科植物三褶脉紫菀 *Aster ageratoides* Turcz. 的全草。

【性味】苦、辛，微寒。

【功效】清热解毒，祛痰镇咳。

【主治】用于风热感冒、蛾子症（扁桃体炎）、长咳症（慢性支气管炎）、疗疮肿毒、外伤出血、黄疸、奶疮（乳腺炎）等症。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、感冒发热：岩柴胡 一支黄花各 9g。水煎服。

2、长咳症（慢性支气管炎）：岩柴胡 忍冬藤各 15g 菝葜 15g 黄花耳草 24g 枳壳 9g 甘草 6g。水煎分两次服。

【备考】1、1、化学成分：茎、叶主要含黄酮，根含 2 种皂苷、甾体皂苷和三萜烯皂苷。

2、2、药理作用：①煎剂及其提取物对金黄色葡萄球菌、卡他球菌、奈氏球菌及肺炎双球菌都有一定抑制作用。②其黄酮苷类具有较好的镇咳作用。还有祛痰作用，所含皂苷祛痰作用较强。③本品有增强肾上腺皮质功能的作用，并能促进甲状腺对 I 的积聚和增加甲状腺的活力，提高机体组织细胞的能量代谢。

75、豇豆树皮

土家语名：课体卡蒙他爬

土家语拼音：kof tix kar mongr tax par

国际音标：k'o³⁵ t'i⁵⁵ k'a²¹ muŋ

【来源】为紫葳科植物梓树 *Catalpa ovata* Don . 的根皮及树皮。

【性味】苦，寒。

【功效】清热解毒，除湿利尿，杀虫。

【主治】发热、头痛、呕吐、的场、小便不利、疮疥、皮肤瘙痒、黄疸等症。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、时气温病、头痛壮热、呕吐：豇豆树皮 30g，水煎服。

2、水肿、小便不利：豇豆树皮 12g，益母草 30g，水煎服。

3、疮疥、皮肤瘙痒：豇豆树皮适量，煎水洗患处。

【备考】1、化学成分：木质部含梓树内脂、β-谷甾醇、蜡酸、香草酸、阿魏酸、对羟基桂皮酸、对羟基苯甲酸、丁香酸及香草醛。果皮含梓实苷，水解产生梓实次苷与对羟基苯甲酸。

2、药理作用：本品中提出的两个成分梓根皮苷 I 和梓根皮苷 II，为利尿的有效成分。其苷 I 对 K⁺、Na⁺ 离子的排出作用很显著，苷 II 对 Cl⁻ 离子的排出作用特别明显，故此两物有较显著的利尿作用。此外，本品还有防止动脉硬化的作用。

76、碎米桠

土家语名：措恶呷

土家语拼音：cox wor yar

国际音标：ts'o⁵⁵ wo²¹ ja²¹

【别名】雪花草、冬凌草、岩脚风。

【来源】为叫做科植物碎米桠 *Rabdosia rubescens* (Hansl.) Hara 的地上部分。

【性味】甘、苦，微寒。

【功效】清热解毒，活血止痛。

【主治】用于咽喉肿痛、蛾子症（扁桃体炎）、蛇虫咬伤、妇女崩漏、月经不调。

【用量】10~15g。

【应用经验】

1、咽喉肿痛、口渴：雪花草 10g 地苦胆 6g。水煎服。

2、妇女月经不调、崩漏不止：雪花草 10g 地锦草 10g 艾叶炭 6g 女儿红 10g。水煎服。

3、蛇咬伤：鲜雪花草、小蛇参各等量捣烂，加醋混匀外敷伤口。

【备考】1、化学成分：冬凌草含单萜、倍半萜、二萜、三萜等萜类成分。茎叶含挥发油 0.05%，淡黄色半固体，其主要成分为 β -榄香烯、棕榈酸、壬醛、葵醛、 α -蒎烯及 β -蒎烯、柠檬烯、1,8-桉叶素和对聚伞花素等，叶中分得 8 种结晶成分，已确定其中四种，即冬凌草甲素、乙素、丙素 d-香树脂醇。

2、2、药理作用：①冬凌草醇剂对 HeLa 细胞有明显的细胞毒作用（以 5 月采集者作用最强），对多数动物移植肿瘤有抑制作用，并有明显的抗菌、抗炎作用。去鞣酸后作用仍保留。去挥发油后则作用消失。②冬凌草醇剂及煎剂，无论口服或注射，对小白鼠艾氏腹水癌及 S180 均有抗肿瘤作用。醇剂的作用大于煎剂。注射优于口服，对 U14、W2056 亦有一定作用，但不稳定。③冬凌草蒸馏液对食管上皮的增生，拟有轻度的抑制作用。④用小白鼠热板法试验证明冬凌草煎剂或醇剂略可提高其痛阈，但醇剂可增强小剂量度冷丁的止痛作用。⑤动物实验证明。冬凌草与亚胺 154、159 合用，可增强抗肿瘤作用。⑥抑菌试验，本品对甲型、乙型溶血性链球菌和金黄色葡萄球菌均有抑制作用。⑦在艾氏腹水癌、肉瘤 S180、白血病 L12103 肿瘤株中，冬凌草甲素均有使有丝分裂指数先降低后升高的作用。可使 3 种瘤株的 M 期细胞染色体混乱、短粗、畸形、单一分布、并可延缓 C2 期。⑧冬凌草甲素抑制宫颈癌 HeLa 细胞延缓 M→G1 期的进行。⑨冬凌草甲素与博莱霉素 As 合用对小鼠体内 P388 白血病、艾氏腹水瘤细胞大分子合成有影响，可抑制 ADP 合成，对肿瘤细胞 DNA 合成的抑制作用强于对骨髓细胞。

第五章 泻火毒药

土家语名：米毒撇药

土家语拼音：miv duf pief yaof

国际音标：mi⁵³ tu³⁵ pie²¹ jau³⁵

凡具有清除体中火气、驱赶体内毒邪功效，用于治疗火毒病的药物称泻火毒药。

土家医认为火毒邪气一是自然界中燥火毒邪作用于人体内脏器；二是热毒病入里变生火毒邪气伤及内在脏器；三是其他病邪在体内日久，产生火毒邪气而发病。其病理变化是烧肉灼筋（经），烘血干精（津），烤脑伤神，出现气、血、精（津）神、（经）病变。因火毒轻重和部位不同，临床表现有异，火毒病邪致病共有症状和体征有：高热、烘热、面红耳赤神志不清，局部烧灼感，皮肉红肿疼痛、口干舌燥、舌质老红，苔黄干，脉洪大。

泻火毒药具有清除体中火气，驱赶体内毒邪双重功效，主要用于治疗火毒类病症。某些药物还兼有消肿散结、清热燥湿、凉血活血、生津止渴、止痢、止咳、止血、除瘟功效，通过配方用于治疗疮疡痈疖、湿热症、热瘀症、伤津症、瘟病等。

常用药物有：三颗针、黄柏、马尿泡、尖刀草、猫猫草、四方麻、岩火炮、刺黄连、十大功劳、黄连木、三花龙胆、水黄连、百金花、黑参、山栀子、黄三七、鸡爪连等。

1、三颗针

土家语名：定额阿所猛

土家语拼音：anx ngax sox mongx

国际音标：an⁵⁵ ŋa⁵⁵ so⁵⁵ muŋ⁵⁵

【别名】刺黄连、刺黄柏、阎王刺。

【来源】为小檗科植物阔叶十大功劳 *Mahonia bealei* (Fort) Carr.，根茎入药。

【性味】苦，寒。

【功效】泻火败毒。

【主治】火痢，热泻，呕吐，黄疸，真伤寒，口疮，脓耳，蛾子症，火眼，痈肿疮毒，伤口发性。

【用量】6~10g。

【备考】1、对金黄色葡萄球菌、乙型链球菌及大肠杆菌有一定的抗菌作用。2、有降压、利胆和升高白细胞作用。

2、马尿泡

土家语名：马那土

土家语拼音：max laf tux

国际音标：ma⁵⁵ la³⁵ t'u⁵⁵

【别名】狗尿泡、岩苋菜、花脚杆、半蒴苣苔。

【来源】为苦苣苔科植物半蒴苣苔 *Hemiboea henryi* Clarke，全草入药。

【性味】甘、淡，凉。

【功效】泻火败毒，除湿消痈。

【主治】疔疮疖肿，痈疽初起，烫、火伤。

【用量】10~15g。

【应用经验】

- 1、热性腹痛：麻脚杆适量，水煎服。
- 2、外伤肿痛：麻脚杆捣烂，敷患处。
- 3、毒蛇咬伤：麻脚杆 10g 虎杖根 10g 一窝蛆（缓草）10g。水煎服。

3、尖刀草

土家语名：尖刀实克查

土家语拼音：jianx daox sir ker car

国际音标：tɕian⁵⁵ tau⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】水剪，假墨斗菜、毛连菜。

【来源】为菊科植物毛连菜 *Picris hieracioides* L. *susbsp.* *japonica* Krylov.,

根或全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】泻火败毒，祛瘀止痛，利小便。

【主治】全草：跌打损伤，无名肿毒引起的高热症。根：腹部胀满。

【用量】6~10g。

4、黄剥皮

土家语名：王剥皮

土家语拼音：wanr bof pir

国际音标：wan²¹ po³⁵ pi²¹

【别名】黄柏、川黄柏。

【来源】为芸香科植物黄皮树 *Phellodendron chinense* Schneid.，树皮入药。

【性味】苦，寒。

【功效】泻火败毒，清热燥湿。

【主治】湿热泻痢，黄疸，骨蒸潮热，遗精，赤白带下，足膝肿痛，痿软无力，疮毒，湿疹。

【用量】内服6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、湿热痢疾：黄柏 白头翁 秦皮各9g 黄连15g。水煎服。
- 2、黄疸：黄柏 栀子各9g 茵陈15g 大黄6g。水煎服。
- 3、潮热、骨蒸盗汗：黄柏 知母各9g 熟地 龟板各15g。水煎服，或加猪脊髓为丸服。

【备考】1、对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌及结核杆菌有抑制作用。同时能抑制钩端螺旋体及皮肤真菌。2、能增强白细胞吞噬功能。3、可降低血压、血糖。4、能增强乙酰胆碱的作用。5、对血小板有保护作用。

5、猫猫草

土家语名：莫被实克查

土家语拼音：mor bif sir ker car

国际音标：mo²¹ pi³⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】对叶兰、小生扯拢。

【来源】为玄科植物疏花婆婆纳 *Veronica laxa* Benth.，全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】泻火败毒，止血调经。

【主治】功能性子宫出血，白带过多，月经不调及外伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、功能性子宫出血、白带过多、月经不调：猫猫草 15g，水煎煮甜酒内服。
- 2、外伤：猫猫草、香油各适量，花椒少许，同煎去渣，过滤后用纱布浸油贴患处。
- 3、跌打损伤、外伤出血：猫猫草 10g 马夫稍叶 10g 酸米草 10g。捣烂外敷。

6、龙胆地丁

土家语名：龙胆地丁

土家语拼音：longr danx dif denx

国际音标：luŋ²¹ tan⁵⁵ ti³⁵ ten⁵⁵

【别名】岩龙胆。

【来源】为龙胆科植物鳞龙胆 *Gentiana squarrosa* Ledeb.，全草入药。

【性味】苦、辛，寒。

【功效】泻火败毒，利湿消肿。

【主治】肠痛，皮肤疮疖，肠痛，皮肤痛肿，白带，尿血，瘰疬，目赤肿痛。

【用量】内服 3~6g，外用适量。

【应用经验】

- 1、瘰疬疔疮、发背诸肿：龙胆地丁、白蒺藜共为末，油调敷患处。
- 2、肠痛未化脓者：龙胆地丁、红藤、黄酒、水煎温服。

7、恶个良

土家语名：麦他册哈车

土家语拼音：mef tax cer hax cex

国际音标：me³⁵ t'a³⁵ ts'e²¹ xa⁵⁵ ts'e⁵⁵

【别名】恶鸡婆、雷公菜、大油渣口。

【来源】为菊科植物大蓟 *Cirsium japonicum* DC.，根或全草入药。

【性味】味甘、苦，凉。

【功效】泻火败毒，清热止血。

【主治】吐血，衄血，血尿，崩漏。

【用量】入汤剂内服 6~10g。

【备考】有止血、降压、抗菌作用。

8、翁个良

土家语名：老嘎拉爬

土家语拼音：laox gax lax par

国际音标：lau⁵⁵ ka⁵⁵ la⁵⁵ p'a²¹

【别名】婆婆针线包、老君须。

【来源】为萝藦科植物直立白薇 *Cynanchum atratum* Bunge，根入药。

【性味】微苦，凉。

【功效】泻火败毒，清热凉血，生津止咳。

【主治】阴虚潮热，产后血虚发热，热淋，涩痛。

【用量】6~10g。

9、四方麻

土家语名：克欵实克查

土家语拼音：keif sir ker car

国际音标：k'e³⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】山练草、四角草、四方青、四棱草。

【来源】为玄参科植物四方麻 *Veronicastrum cauloptera* (Hance) Yamazaki，全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】泻火败毒，赶风消肿。

【主治】火痢，热泻，痈疽肿毒，皮肤痒症。

【用量】内服 10~15g，外用适量。

10、玉簪花

土家语名：玉簪卡普

土家语拼音：yif zanx kax pux

国际音标：ji³⁵ tsan⁵⁵ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】玉泡花、内消花、棒玉簪。

【来源】百合科植物玉簪花 *Hosta plantaginea* (Lam.) Asche rs.，花入药。

【性味】甘、苦，凉。

【功效】泻火败毒，消肿止血。

【主治】乳痈，脓耳，九子丸症，痔肿痛出血。

【用量】3~6g。

【应用经验】

- 1、乳痈、疮痈肿毒、蛇咬伤：鲜草捣烂外敷。
- 2、耳内流脓：鲜草绞汁，滴耳内。
- 3、烂脚：鲜叶用菜油浸几天后，捞取贴敷患处，每日换一次。
- 4、刀伤出血：小玉簪花 蛇疙瘩。捣烂，敷患处。
- 5、红崩白带：小玉簪花根 60g，猪瘦肉，炖服。

【备注】场行小毒。

11、地星宿

土家语名：地星宿

土家语拼音：dif xinx sur

国际音标：ts³⁵ ɕin⁵⁵ su²¹

【别名】星宿草、天胡荽、满天星。

【来源】为伞形科植物天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam.，全草入药。

【性味】辛、微苦，凉。

【功效】泻火败毒，利水通淋，化痰止咳。

【主治】黄疸，肝硬化腹水，尿路感染，伤风感冒，咳嗽，百日咳，扁桃体炎，湿疹，带状疱疹。

【用量】内服6~10g，外用适量。

12、苦瓜

土家语名：克欵致子那土

土家语拼音：keif zif zix laf tux

国际音标：kei³⁵ tsi³⁵ tsi⁵⁵ la³⁵ t'u⁵⁵

【别名】癞瓜、凉瓜、红姑娘。

【来源】葫芦科植物苦瓜 *Momordica charantia* L.，果实入药。

【性味】苦，凉。

【功效】泻火败毒，赶湿毒，除暑止渴。

【主治】中暑，痢疾，肠炎，牙痛。

【用量】10~30g。

【备考】有降血糖、抗癌、抗病毒作用。

13、雄黄连

土家语名：黄连阿巴

土家语拼音：huanr lianr av bax

国际音标：xuan²¹ lian²¹ a⁵³ pa⁵⁵

【别名】朱砂七、朱砂莲。

【来源】为蓼科植物毛脉蓼 *Polygonum ciliinerve* (Nakai) Ohwi.，根入药。

【性味】苦、涩，凉。

【功效】清热解毒，凉血，止泻，活血止痛。

【主治】瘟黄症，中暑腹痛，热泻，吐血，衄血，便血，烫火伤。

【用量】6~10g。

【备考】1、对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌有抑制作用。2、有广谱的抗病毒作用。3、连续应用可致部分菌株形成耐药性。

14、开喉箭

土家语名：朱砂机纳

土家语拼音：zux sax jix lar

国际音标：tsu⁵⁵ sa⁵⁵ tɕi⁵⁵ la²¹

【别名】开喉箭、山豆根、紫金牛、八爪金龙。

【来源】为紫金牛科植物朱砂根 *Ardisia crenata* Sims, 根入药。

【性味】苦、辛，平。

【功效】泻火败毒，活血祛瘀，消肿止痛。

【主治】咽喉肿痛，跌打损伤，腰背痛、无名肿毒、蛇伤。

【用量】3~6g。

【应用经验】

1、白喉：朱砂根（制）15g 玄参 10g 山豆根 10g 一把伞 10g 一枝黄花 10g 马勃 10g 麦冬 10g。水煎服，每日一剂。

2、跌打风湿酒：红蛇儿 15g 三百棒 20g 百金条 15g 竹节三七 20g 牛尾三七 20g 蛇尾七 20g 小血藤 20g 血当归 20g 制藤乌头 60g 木瓜 15g 三加皮 15g。水煎服。治跌打损伤、风湿筋骨疼痛、腰痛，有很好的疗效。

3、腰背痛：八爪金龙、杜仲、续断各 9g，活血藤 15g，细辛 1.5g，秦艽、川芎各 6g。水煎服。

4、跌打损伤、宿伤发痛：八爪金龙根 9g，水酒各半煎服或泡酒服。

5、无名肿毒、疮肿、蛇伤：八爪金龙根叶或根适量，研末，水调外敷，并内服八爪金龙根粉 9~15g。

【备考】1、化学成分：根含酚类、氨基酸、糖类、皂苷、密花醌（即酸金牛醌）；叶含酚性成分、香豆精类、氨基酸、糖类、皂苷。

2、药理作用：①抗蛇毒试验证明：煎剂预先半小时以 0.2 ml/10g 剂量给鼠灌胃，对眼镜蛇中毒保护率为 56%。②对金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌及炭疽、白喉等杆菌有抑制作用。③朱砂根三萜皂苷有较好的抗早孕作用。

[附注]：功用相同的还有同属植物红凉伞 *A. bicolor* walker 的根或根茎。与朱砂根的区别在于红凉伞叶片下面为红色或紫红色。

15、岩火炮

土家语名：阿火炮

土家语拼音：ar huox paof

国际音标：a²¹ xuo⁵⁵ p'au⁵⁵

【别名】石上莲、果上叶。

【来源】为兰科植物石仙桃 *Pholidota chinensis* Lindl.，全草和假鳞茎入药。

【性味】甘、微苦，凉。

【功效】泻火败毒，养元润肺，理气消瘀。

【主治】跌打损伤，肺热咳嗽，胸肋痛，痰中带血。

【用量】6~10g。

【备考】有麻醉作用。

16、刺黄连

土家语名：他色黄连

土家语拼音：tax ser huanr lian071

国际音标：t'a⁵⁵ se²¹ xuan²¹ lian²¹

【别名】虎刺黄连。

【来源】为小檗科植物刺黄连 *Berberis Soulieana* Schneid，根或茎、叶入药。

【性味】苦、寒。

【功效】泻火败毒，消肿止痛，清热止咳。

【主应考】急性黄疸，口舌生疮，小便淋痛，肺热咳嗽。

【用量】10~15g。

【应用经验】

1、瘟黄症：刺黄连 30g 虎杖 30g 白马骨 20g 梔子 10g 鸡矢藤 10g 茵陈 15g。水煎服。

2、痢疾：刺黄连茎 20g 地蜂子 10g。水煎服。

3、元王痹（类风湿性关节炎肿痛）：刺黄连 20g 木防己 10g 地骨皮 10g。水煎兑酒服。

17、岩黄芩

土家语名：阿黄芩

土家语拼音：ar huanr qinr

国际音标：a²¹ xuan²¹ tɕi²¹

【别名】岩黄连。

【来源】为罂粟科植物南黄紫堇 *Corydalis dauidii* Franch.，全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】泻火败毒。

【主治】痢疾，腹泻。

【用量】3~6g。

【应用经验】

1、痢疾腹泻：岩黄芩 6~10g，水煎服。

2、热淋症（小便赤黄）：岩黄芩 6g 豌豆七 10g 胡豆莲 1g。水煎服。

【备考】具有镇痛、抗菌、抗肿瘤作用。

18、岩黄连

土家语名：阿黄连

土家语拼音：ar huanr lianr

国际音标：a²¹ xuan²¹ lian²¹

【别名】土黄连、在屏连。

【来源】为毛茛科植物盾叶唐松草 *Thalictrum ichangense* Leeoyer ex Oliv.，根茎或全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】泻火败毒，活血消肿，抗癌肿。

【主治】小儿惊风抽搐，鹅口疮，丹毒游风，黄瘟症，热泻症，鼻癌，跌打损伤，骨折肿痛。

【用量】内服 3~6g，外用适量。

【应用经验】

1、尿急症、小便不通：土黄连 12g 海金沙 石苇 鸡脚金星 灰菟菜各 10g。水煎兑甜酒服。

2、烫火伤：土黄连未调麻油搽患处。

【备注】场行小毒。

19、十大功劳

土家语名：他色黄柏

土家语拼音：tax ser huanr ber

国际音标：t'a⁵⁵ se²¹ xuan²¹ pe²¹

【别名】老鬼天、刺黄柏。

【来源】为小檗科植物阔叶十大功劳 *Mahonia confuse* Sprague，根或茎、叶入药。

【性味】苦，寒。

【功效】泻火败毒（根茎），养阴清热（叶）。

【主治】黄疸，火痢，淋浊，目赤肿痛（茎、根）；肺癆发热，盗汗（叶）。

【用量】10~15g。

【应用经验】肺癆症：十大功劳叶 10g 麦冬 10g 炮火七 10g 地骨皮 10g 土党参 10g 陈皮 10g。水煎服。

20、黄连木

土家语名：黄连卡木

土家语拼音：huanr lianr kar mur

国际音标：xuan²¹ lian²¹ k'a²¹ mu²¹

【别名】苦木。

【来源】为漆树科植物黄连木 *Pistacia chinensis* Bunge，树皮或枝叶入药。

【性味】苦、涩，寒。

【功效】泻火败毒，消肿止痛。

【主治】火痢，热泻，疮疡。

【用量】10~15g。

【应用经验】

1、风湿疮、漆疮初起：岩林倍叶或树皮 250g 板栗根皮 120g。捣细，用沸水冲

泡，加盖 1~2 小时，取汁擦洗患处。

2、淋症：岩林倍叶研成细粉，每次 3~6g，糖水送服。

3、痔疮：岩林**培根** 槐树根各 15g 鸳鸯花 地榆各 9g。水煎服。

21、三花龙胆

土家语名：三花龙胆

土家语拼音：sanx fax longr danx

国际音标：san⁵⁵ xua⁵⁵ luŋ²¹ tan⁵⁵

【别名】山龙胆。

【来源】为龙胆科植物条叶龙胆 *Gentiana manshurica kitag*，根入药。

【性味】苦，寒。

【功效】泻肝胆火，除下元热。

【主治】肝火所致头痛，目赤肿痛，头晕耳鸣，阴部湿痒。

【用量】6~10g。

22、对叶四方草

土家语名：对叶四方实克查

土家语拼音：duif yer sif huanx sir ker car

国际音标：tui³⁵ je²¹ si³⁵ xuan⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】獐牙菜。

【来源】为龙胆科植物美丽獐牙菜 *Swertia pulchella* (D. Don) Buch. ~Ham.，全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】泻火败毒，退黄消肿。

【主治】肺、胆热症，急黄，热泻，热淋，外感发热等。

【用量】6~10g。

23、水黄连

土家语名：泽黄连

土家语拼音：cier huanr lianr

国际音标: ts'e²¹ xuan²¹ lian²¹

【别名】青鱼胆草。

【来源】为龙胆科植物青鱼胆草 *Swertia mileensis* T. N. Ho et W. L. Shi, 全草入药。

【辛味】苦，寒。

【功效】泻火败毒，消肿止痛。

【主应考】急黄，热淋。

【用量】3~6g。

【应用经验】

- 1、火眼：鲜水黄连幼苗捣烂兑甜酒敷患眼。
- 2、蚊蛇咬伤：水黄连适量，用酒泡，外搽患处。
- 3、火牙：水黄连 10g 千年矮根 10g。水煎服。

24、百金花

土家语名：百金卡普

土家语拼音：ber jinx kax pux

国际音标：pe²¹ tɕin⁵⁵ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】对叶生。

【来源】为龙胆科植物百金花 *Centaurium pulcnellum* Druce par. *altaicum* Kiegawa et Hara. , 全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】泻火败毒。

【应用】泻胆火，败肺火。

【主治】胆痛，热咳。

【用量】6~10g。

25、黑参

土家语名：烂嘎参

土家语拼音：lianf gax senx

国际音标：lan³⁵ ka⁵⁵ sen⁵⁵

【别名】玄参。

【来源】为玄参科植物玄参 *Scrophlaria ningpoensis* Hemsl.，块根入药。

【性味】甘、苦、咸，寒。

【功效】泻无根火毒，生津液。

【主治】热毒发斑，咽喉肿痛，丸子（瘰疬），热病烦渴。

【用量】6~10g。

26、山梔子

土家语名：黄珠子

土家语拼音：huanr zux zix

国际音标：xuan²¹ tsu⁵⁵ tsi⁵⁵

【别名】黄珠子、山枝子。

【来源】为茜草科植物梔子 *Gardenia jasminoides* Eliis，果实入药。

【性味】苦、微酸，寒。

【功效】泻火败毒，凉血散瘀。

【主治】高烧不退，心烦不眠，口舌生疮，吐血衄血，黄疸，疮疡，扭挫伤。

【用量】6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、瘟黄症：梔子 9g 黄柏 9g 甘草 6g。水煎服；或生梔子 黄柏各 9g 茵陈 六一散各 15g。水煎服。

2、热淋尿血：梔子 9g 白茅根 30g 冬葵子 9g 甘草 6g。水煎服。

3、跌打损伤：梔子 30g 大黄 30g 姜黄 30g 红花 15g 土鳖虫 9g。共研细末，每用适量，白酒调敷患处。

4、火眼症：梔子 诃子 川楝子各等分。共为粗末，一日一~三次，每次 3~5g，口服。

【备考】

1、化学成分：果实含梔子苷、山梔子苷、梔子素、D-甘露醇、β-谷甾醇、二十九烷、果胶、鞣质等。

2、药理作用：①利胆作用：梔子水浸膏对结扎输胆管后的动物具有抑制胆红素在血中升高的作用。梔子所含的藏红花素和藏红花酸对实验动物能增加胆汁的分泌量，也能抑制结扎输胆管的家兔血中胆红素的出现。②降压作用：本品煎剂、醇提取物对麻醉及不麻醉的多种动物不论口服或腹腔注射均有持久性降压作用，但静脉注射时降压迅速而维持时间短。③抗菌作用：梔子水浸液在试管内，对多种皮肤真菌有抑制作用，平板打洞法证明，梔子对金黄葡萄球菌、脑膜炎双球菌、卡他球菌有一定的抑制作用。水煎剂有杀死钩端螺旋体及血吸虫成虫的作用。④中枢抑制作用：动物实验证明，本品醇提取物中对中枢神经系统有一定的抑制作用，能减少自发活动，延长环己巴比妥睡眠时间，对抗戊四氮的惊厥和降低正常体温。其降温的有效成分为熊果酸。⑤止血作用：生梔子止血作用较熟梔子强，提取物制成的油膏能加速组织挫伤的愈合。

27、土大黄

土家语名：土大黄

土家语拼音：tux daf huanr

国际音标：t'u⁵⁵ ta³⁵ xuan²¹

【别名】山大黄、仔黄、土大黄。

【来源】为蓼科植物波叶大黄 *Rheum franzenbachii* Munt.，根茎入药。

【性味】苦，寒。

【功效】泻火毒，通便，破积行瘀。

【主治】火毒便秘，黄疸，痈肿疔毒，口舌生疮，火烫伤，瘀血。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、大便秘结不通、腹部胀痛：土大黄 30g，水煎顿服。

2、瘟黄症：土大黄 15g 虎杖 10g 茵陈 12g。水煎服。

3、癣：土大黄鲜根加醋，捣烂，取汁外搽。

【备考】1、化学成分：根含游离状态蒽醌衍生物，含两种大黄酸样成分和酸模素、鞣质。

2、药理作用：①酸模素对红色毛发癣菌及趾间发癣菌有抑制作用。②鞣质

有收敛止血作用。

【备注备考】同属植物齿果酸模，尼泊尔酸模有相同功效，其中齿果酸模有治小血劳作用。

28、黄个良

土家语名：王嘎里三七

土家语拼音：wanr gax lix sanx qir

国际音标：wan²¹ ka⁵⁵ li⁵⁵ san⁵⁵ tɕi²¹

【别名】土黄连、长果升麻。

【来源】为毛茛科植物长果升麻 *Souliea vaginata* (Maxim) Franch., 全草入药。

【性味】辛、微苦，凉。

【功效】泻火毒，除心烦。

【主治】心悸，烦躁不安，痈肿疮毒，口及咽喉肿痛。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】肠嘎痛症：黄三七 15g 奶浆草 15g 青木香 6g 小血藤根 6g 野黄豆根 10g。每日一剂，水煎二次服，忌酒、辣。

29、鸡爪连

土家语名：日阿吉爬连

土家语拼音：rar jir par lianr

国际音标：za²¹ tɕi²¹ pi²¹ lian²¹

【别名】王连、川连、三角叶黄连。

【来源】为毛茛科植物黄连 *Coptis chinensis* Franch, 根入药。

【性味】苦，寒。

【功效】泻火毒，除湿气。

【主治】时行热毒，伤寒，热盛心烦，热利，消渴，火眼，口疮。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、湿疹：黄连 黄柏各 15g 石膏 30g 青黛 9g。共研细末，香油调敷患处。

2、热病吐血、衄血、发斑、疮疡疔毒：黄连 6g 黄芩 黄柏 栀子各 9g。水煎服。

3、妊娠呕吐、胃热呕吐：黄连 6g 苏叶 2g。水煎服。

30、天青地白

土家语名：没辛嘎里阿石

土家语拼音：mef xinf gax liv ar sir

国际音标：me³⁵ ɕin³⁵ ka⁵⁵ li⁵³ a²¹ si²¹

【别名】小火草、细叶鼠曲草。

【来源】为菊科植物白背鼠曲草 *Gnaphalium japonicum* Thunb. 的全草。

【性味】甘、凉。

【功效】清热解毒、镇咳，明目。

【主治】口疮，着凉，咳嗽，目赤肿痛，白带，烧烫伤，跌打损伤，外伤出血，毒蛇咬伤，肿痛等症。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、口疮：天青地白鲜品适量，用淘米水浸泡后用棉签搽患处。

2、烧、烫伤：天青地白青蒿各 15g。共研细末，先将伤口用淡盐水洗净，涂菜油，然后撒上药粉，每日换一次。

3、肿毒、毒蛇咬伤：鲜天青地白适量，捣烂敷患处。

31、地苦胆

土家语名：里克欵致子胆

土家语拼音：liv keif zif zix danx

国际音标：li⁵³ kei³⁵ tsi³⁵ tsi⁵⁵ tan⁵⁵

【别名】：金莲胆、九龙胆。

【来源】：为防己科植物金果榄 *Tinospora sagittata* Gagn. 的块根。

【性味】：苦，寒。

【功效】：泻火败毒，消肿止痛，止咳利咽。

【主治】：咽喉肿痛，感冒，急性菌痢，痈肿疔疖，毒蛇咬伤，淋巴结核，痔疮，

烫火伤，烧心症。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、火喉症、蛾子症、口疮症：地苦胆研末吞服，每次0.3g。

2、烧心症：地苦胆 山豆根 青木香研末，冲服。

3、菌痢：地苦胆 仙鹤草各等量，研末每服3g。

【备考】1、化学成分：含青牛胆苦素、棕榈碱、药根碱、伽伦宾、黄酮苷、氨基酸、糖类。

2、药理作用：①棕榈碱有抗肾上腺素、5-羟色胺、胆碱酯酶作用。②棕榈碱对未孕家兔离体子宫有兴奋作用。③对脑膜炎球菌、金黄色葡萄球菌、流感病毒、抗酸性分枝杆菌有较强的抑制作用。

32、百味莲

土家语名：那黑欵黑欵味莲

土家语拼音：naf heix heix wuif lianr

国际音标：nea³⁵ xei⁵⁵ xei⁵⁵ wui³⁵ lian²¹

【别名】苦金莲、金龟莲、蛇莲、小蛇莲、金盆。

【来源】为葫芦科植物曲莲 *Hemsleya amabilis* Diels. 的块茎。

【性味】冷，苦。

【功效】泻火败毒，燥湿止泻，消肿止痛等。

【主治】烧心症，心口热痛，热泻症，火痢症，蛾子症，毒蛇咬伤。

【用量】内服：水煎，3~5g。粉散0.5~1g/次。

【应用经验】

1、胃痛：百味莲6g 雄黄连6g 赶山鞭10g。水煎服。

2、咳血、吐血：百味莲6g 白龙须15g。水煎服。

3、无名肿毒：百味莲适量，醋磨汁，敷患处。

【备考】1、化学成分：雪胆的块根中含皂甙、苦味素两种（雪胆素甲，为葫芦素F的23,24-双氢-25-乙酸酯；雪胆素乙为葫芦素F的23,24-双氢化合物）。

2、药理作用：①抑菌作用：雪胆素及雪胆皂苷在体外对福氏痢疾杆菌、伤

寒杆菌、猪霍乱沙门氏菌等都有不同程度的抑制作用。②解热作用：静脉注射雪胆素甲 40mg/kg（腹腔注射）对家兔注射伤寒、副伤寒混合菌引起的发热有轻度退热作用，但对正常体温及非细菌性发热则无明显影响。③雪胆总皂苷能增加小鼠冠脉流量，能对抗垂体后叶素引起的冠脉收缩，并能降低心肌耗氧量。④雪胆皂苷水溶液 60mg/kg 及血胆素溶液 4mg/kg，给猫静脉注射，对呼吸、血压、心率均有抑制作用，故临床上对心脏病患者应慎用；雪胆皂苷的溶血指数为 1:50。

33、山黄连

土家语名：克欵致子实克查

土家语拼音：keif zif zix sir ker car

国际音标：k'eⁱ³⁵ tsi³⁵ tsi⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】苦草、红胆草。

【来源】为龙胆科植物当药 *Swertia diluta* (Turcz.) Benth. et Hook. f.，全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】泻火败毒。

【主治】火毒伤骨症，蛾子症，火眼症，喉炎，扁桃体炎，结膜炎，疥癣。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、红眼症：山黄连 15~30g。水煎冲白糖服，或研细末，每次 1~1.5g，开水送服，日服 3~5 次。

2、蛾子症：山黄连全草 15~30g。水煎服。

3、蛇咬伤：伤口冲洗后，山黄连捣烂外敷，另取 60g，水煎服。

4、急慢性痢疾、腹痛：苦黄连 10g。水煎服。

5、着凉症：苦黄连 30g。水煎服。

6、牙龈肿痛：苦黄连 9g。煎水含漱。

【备考】1、化学成分：全草含当药苦苷约 2%-4%，还含当药素、黄色龙胆根素、黄色龙胆根素葡萄糖苷等。

2、药理作用：当药苦苷，经皮肤表面易于吸收，吸收后分解，生成

Erythocerntaurin 可扩张毛细血管，并激活或促进皮肤细胞的酶系统，提高皮肤组织的生化功能。静脉注射当药水溶液，能升高皮肤温度，与拟副交感类药物的作用相似，故认为可治疗脱毛症。

第六章 抗瘟毒药

土家语名：瘟毒报业药

土家语拼音：wenx duf dix nier yaof

国际音标：wen⁵⁵ tu³⁵ ti⁵⁵ ɹie²¹ jao³⁵

凡具有清除体中瘟气、驱赶体内瘟疫毒邪气功效，用于治疗瘟毒疫毒的药物称抗瘟毒药。

土家医认为瘟毒邪气是一种具有较强传播性病毒邪，存在于自然界中，在气候反常的情况下数量骤增，毒力增大，使大多数人体不能抵抗而发病。所以，全村同寨老少同患，症状相似，病情重，因病毒邪不同，各种瘟病症状、体征表现不同，共有特点是：发病快、病情重、传播大、症状同。

抗瘟毒药具有控制病势、杀灭疫毒、防止传播的功效，主要用于治疗瘟毒疫毒病症。某些药物还兼有清热毒、赶湿毒、凉血毒、化痰毒、解蛇虫毒、抑癌毒等功效，经配方用于治疗热毒病、湿毒病、血毒病、痰毒病、毒蛇毒虫咬伤症、某些肿瘤等病症。

常用抗瘟毒药物有：三叶青、猫儿头、百马骨、山牛膝等。

1、味牛膝

土家语名：务及提克

土家语拼音：wuf jir tir kex

国际音标：wu³⁵ t'i²¹ k'e⁵⁵

【别名】红牛克西、土牛膝、红牛膝、山牛膝、透血红。

【来源】为爵床科植物腺毛马蓝 *Stobilanthes forrestii* Diels 的根。

【性味】苦，温。

【功效】对抗疫毒，活血止痛。

【主治】白喉症，跌打损伤，风湿疼痛等。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、风湿疼痛：味牛膝 12g 九节风 秦艽 威灵仙各 9g。水煎服。

2、白喉：味牛膝 海金沙藤 玄参 三匹风各 9g。水煎服。

2、野升麻

土家语名：抗苦升麻

土家语拼音：kanr kux senx mar

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ sen⁵⁵ ma²¹

【别名】绿升麻。

【来源】为毛茛科植物单穗升麻 *Cimicifuga simplex* Wormsk. 的根茎。

【性味】甘、辛、微苦，微寒。

【功效】清除疫毒，升阳透疹。

【主治】小儿麸子病，时气疫疠，阳明头痛，喉痛，斑疹，风热疮疡，久泻脱肛，女子崩白带。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、头痛及偏头痛、目赤肿痛：野升麻 白芷 葛根 石膏 川芎各 9g 陈皮 法半夏各 6g 薄荷 3g。水煎服。

2、风热疮疡：野升麻、银花各 12g 当归 赤芍 连翘 大力子 山梔子 防风各 9g 甘草 3g。水煎服。

【备考】1、化学成分：根茎含升麻苷、甲基升麻苷、乙酰基升麻环氧化物、升麻环氧化物、25-O-甲基升麻环氧化物等皂苷、25-O-乙酰升麻醇等皂苷、升麻醇及其酯、凯诺醇、阿米醇、咖啡二甲醚、升麻精。

2、药理作用：根茎具有解热、解痉作用。解痉成分可能为凯诺醇和阿米醇，升麻素显示中枢神经系统抑制作用。

3、九龙盘

土家语名：里提披蜈蚣

土家语拼音：liv tir pix pax wur gongr

国际音标：li⁵³ t'i²¹ p'i⁵⁵ p'a⁵⁵ wu²¹ kuŋ²¹

【别名】蛇退、千年竹、爬地蜈蚣、盘龙七。

【来源】为百合科植物(褐黄蜘蛛抱蛋)九龙盘 *Aspidistra lurida* ker-Gawl, 根茎入药。

【性味】甘、辛，微温。

【功效】抗瘟疫毒，行气止痛。

【主治】小伤寒症，风湿痹痛，腰腿痛。

【用量】3~6g。

【应用经验】风湿疼痛，跌打损伤：九龙盘（酒炙）15g 金腰带 6g 八爪金 9g。水煎服。

【备注】场行小毒。

4、三叶青

土家语名：尔他信嘎所欵

土家语拼音：ex tax xinf gax sox eix

国际音标：e⁵⁵ t'a⁵⁵ ɕin³⁵ ka⁵⁵ so⁵⁵ ei⁵⁵

【别名】金线吊葫芦、小母猪藤、三叶岩爬藤。

【来源】为葡萄科植物三叶岩爬藤 *Tetrastigma hemsleyanum* Diels et Gilg, 块根入药。

【性味】苦、辛，凉。

【功效】对抗瘟毒，消肿散结，化痰止咳平喘。

【主治】高热惊厥，肺热咳嗽，喉咙痛，瘰疬，痈疔疮疖，跌打损伤，毒蛇咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、小儿腹痛，发热：鲜雷旦子 10g。捣汁冲服

2、取鲜三叶青根适量，与生理盐水共磨，取澄清液滴眼，每次1~2滴，每日4~6次。

3、肺热毒症：雷旦子 瓜子金 枸骨根各10g。每日一剂水煎二次服。

4、猴耳疮：雷旦子 鲜根块 用醋磨取汁，青熏粉5g。共调成糊状，外涂患部。

【备考】对乙脑、流感等病毒有抑制作用，对细菌无明显抑制作用。

5、马尾莲

土家语名：蒙列碰撞

土家语拼音：mongr lier pongf lianr

国际音标：muŋ²¹ lie²¹ p·uŋ³⁵ lian²¹

【别名】唐松草。

【来源】为毛茛科植物瓣蕊唐松草 *Thalictrum petaloideum* L，根入药。

【性味】苦，寒。

【功效】清热解毒，清肝明目，健胃消食。

【主治】瘟黄症，毒痢症，火眼症，痈肿疮疖，烧心症，腹泻。

【用量】内服6~10g，外用适量。

【应用经验】火痢症：马尾莲10g 海蚌珠10g 穿心莲10g 血蜈蚣10g 苦木10g。每日一剂，煎二次服。

【备考】对白喉杆菌、肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌、变形杆菌、福氏痢疾杆菌均有抑制作用。

6、乱鸡窝

土家语名：乱旦阿筒

土家语拼音：luanf rar tongr

国际音标：luan³⁵ za²¹ t° uŋ²¹

【别名】匿芒苳草。

【来源】为禾本科植物匿芒苳草 *Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino var. *cryptatherus* (Hack.) Honda，全草入药。

【性味】苦，平。

【功效】抗瘟退黄，消肿散结，止咳平喘。

【主治】恶疮，瘟黄症，丸子肿大症，奶症，喉咙肿痛，久咳上气喘逆，

【用量】10~15g。

7、螃蟹菊

土家语名：螃蟹菊

土家语拼音：banx qix jir

国际音标：p'an⁵⁵ tɕi⁵⁵ tɕi²¹

【别名】招收莲子草。

【来源】为苋科植物招收莲子草 *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb., 全草入药。

【性味】淡、微苦，凉。

【功效】对抗瘟毒，利尿。

【主应考】鸡窝症，麸子症，夏胞温，红痧症，瘟黄症，肺热咳嗽。

【用量】内服 10~15g，外用适量。

【应用经验】

- 1、麸子症（麻疹）：500%螃蟹菊煎剂，口服，每 8 小时一次，每次用量，1 岁以内 5ml，1~2 岁 10ml，2~3 岁 15ml，3~4 岁 20ml。
- 2、肺热咳嗽、咽喉肿痛：螃蟹菊 50g 大力子 三匹风 大青叶 桑白皮各 9g。水煎服。
- 3、痈肿疮毒：螃蟹菊 苦瓜叶 鱼腥草各适量。捣烂外敷。

【备考】1、化学成分：①全草含黄酮苷、三萜皂苷、有机酸、酚性成分、香豆精、糖、脂肪、蛋白质、无机盐等。又据文献记载含 6-甲氧基本木樨草素-7- α -L 鼠李糖苷及万寿菊素。近年来，又从中分离得到三种结晶：1、 α -3-谷甾醇和 β -谷甾醇；②十八酸；③齐墩果酸-3-O- β -D 葡萄糖苷。

2、药理作用：①抗菌作用：体外试验证明，对金黄色葡萄球菌、脑膜炎球双球菌、肺炎双球菌、流感杆菌均有抑菌作用。②抗病毒作用：本品注射液对亚洲甲型流感病毒（70~5 株）有抑制作用；对流脑和狂犬病毒有一定的灭活作用，对小鼠流感乙脑病毒和狂犬病毒有一些保护作用。临床用于治疗乙型脑炎、急性

黄疸型肝炎、麻疹、流感等有一定疗效。③小鼠灌胃给予本品，能使醋酸酚所致的血清谷丙转氨酶升高明显降低，能使饥饿小鼠肝糖原含量显著增加，对肝损害有保护作用。④临床观察本品对病毒性肝炎有改善临床症状、降低谷转氨酶的作用，并可提高细胞免疫功能，而对体液免疫及 C3 无明显影响。⑤本品对四氯化碳中毒性肝炎大鼠有促进肝脂肪代谢，改善肝细胞功能的作用。

8、香料

土家语名：香料

土家语拼音：xianx liaox

国际音标：ɕian⁵⁵ liau⁵⁵

【别名】黄花佩兰。

【来源】为**叫做科**植物黄花佩兰 *Teucrium simplex Vant.*，全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】对抗瘟毒，消肿散结，止痢。

【主治】天吋感冒高热，痢疾，疮疖疗毒。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、痢疾：白花石蚕 截叶扫帚各 15g。水煎服。

2、湿疹瘙痒：白花石蚕 艾叶 三角枫 苍耳草 桉叶 麻柳叶各适量。煎水洗。

9、包个良

土家语名：包布七

土家语拼音：baox buf qir

国际音标：pau⁵⁵ pu³⁵ tɕ²¹ i

【别名】开喉箭、万年青。

【来源】为百合科植物万年青 *Tupistra chinensis Baker*，根茎入药。

【性味】苦、甘，寒。

【功效】对抗瘟毒，驱狂犬、蛇毒，散瘀止痛。

【主治】白喉，狂犬咬伤，毒蛇咬伤，痈疽肿痛。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】心慌心悸症：包谷七 6g 茶叶树根 10g 绿水子 10g 茯神木 10g 臭甘草 10g。每日一剂，水煎二次服。忌生冷。

【备考场行小毒致呕吐。

【备注】1、兴奋心肌、抑制传导。2、扩张心、脑、四肢血管。3、利尿作用。4、抗白喉杆菌。

10、樱桃

土家语名：樱桃

土家语拼音：yenx taor

国际音标：jen⁵⁵ t'au²¹

【来源】为蔷薇科植物樱桃 *Prunus pseudocerasus* Lindl. 果核及叶入药。

【性味】叶：甘，平。果核：辛，平。

【功效】果核：抗瘟毒，托斑疹。叶：止咳平喘，解毒，解痉。

【主治】果核治麻疹透发不畅，麦粒肿。叶治支气管炎，毒蛇咬伤。

【用量】果核 6~10g，叶 10~15g。

【应用经验】

1、麻疹初起透发不畅：樱桃核 15g 或叶 30g，水煎服。

2、麦粒肿、青春子：樱桃核适量，泡酒或磨水外搽

3、毒蛇咬伤：鲜樱桃叶适量，捣汁内服；药渣外敷患处。

【备考】1、化学成分：种子含氰苷等，加水分解可得氰氢酸。叶含黄酮苷、强心苷、生物碱、酸酚性物质、树脂、挥发油、甾醇、鞣质。

2、药理作用：①叶含黄酮苷有较明显的祛痰作用，其粗黄酮有对抗组织胺所致的豚鼠支气管平滑肌痉挛的作用。②、叶对金黄色葡萄球菌极为敏感，对炭疽杆菌、乙型溶血性链球菌、白喉杆菌均有一定程度的抑制作用。

11、万年松

土家语名：枞各是嘎

土家语拼音: **congr gor sif gaf**

国际音标: ts'uŋ²¹ ko²¹ si³⁵ ka³⁵

【来源】为石松科植物万年松 *Lycopodium pulcherrimum* Wall. 的全草。

【性味】甘、淡，平。

【功效】驱瘟，透疹。

【主治】五心烦热、麻疹不透。

【用量】6~10g。

【应用经验】麻疹不透：万年松 15g，盐肤木 20g，冬葵子 9g，水煎空腹服，连服数次。

12、龙眼根

土家语名：铺糯布机纳

土家语拼音: **puf lof buf jix lar**

国际音标: p'u³⁵ lo³⁵ pu³⁵ tɕi⁵⁵ la²¹

【别名】类叶升麻、米升麻。

【来源】为毛茛科植物类叶升麻 *Actaea asiatica* Haea.，根入药。

【性味】辛、微苦，凉。

【功效】清热解毒，提升透疹。

【主治】麻疹发热不透，胃火牙痛，久泄脱肛。

【用量】10~15g。

【应用经验】

1、百日咳：米升麻根 黄果皮各 15g 土薄荷 15g。煨水服。

2、着凉头痛：米升麻 马鞭草 水杨梅各 15g。煨水服。

3、脱肛：米升麻 党参 黄芪 柴胡各 15g 木通 棕树根 蓖麻根 海金沙 败酱草各 12g。水煎服。

【备考】生叶外用易起水泡。

13、九头狮子草

土家语名：科巴给布狮子实克查

土家语拼音：kox bax gex bux six zix sir ker car

国际音标：k'o⁵⁵ pa⁵⁵ ke⁵⁵ pu⁵⁵ si⁵⁵ tsi⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】球花马兰。

【来源】为爵床科植物九头狮子草/*Peristrophe japonica* (Thunb.) Brem, 全草入药。

【性味】淡、微涩，凉。

【功效】对抗瘟毒，清脓化斑。

【主治】夏脑瘟，时行感冒，热病发斑，丹毒，急黄，肺热咳嗽，毒蛇咬伤。

【用量】内服 10~30g，外用适量。

【应用经验】

- 1、头晕：辣椒七章 120g，鸡蛋 8 个，同煮至蛋熟后，打破外壳再煮，每次吃蛋一个，1 日二次。
- 2、白带、经痛：辣椒七章 120g 炖猪肉吃或本品配的苋菜各 30g。水煎服。
- 3、痔疮：辣椒七章 60g 槐树根 60g 鱼腥草 60g。顿猪大肠头，吃 6 次。

14、山牛膝

土家语名：抗苦务吉提克

土家语拼音：kanr kux wuf jir tir kex

国际音标：kan²¹ ku⁵⁵ wu³⁵ tɕi²¹ ti²¹ k'e⁵⁵

【别名】大青根。

【来源】为马鞭科植物大青 *Clerodendron cyrtophyllum* Turcz, 根，叶入药。

【性味】苦，寒。

【功效】对抗瘟毒，退热利胆。

【主治】夏脑瘟，麻疹，黄疸，血痢。

【用量】6~15g。

15、广个良

土家语名：广趴古七

土家语拼音：guanx pax gux qir

国际音标: kuan⁵⁵ p'a⁵⁵ ku⁵⁵ tɕ²¹ i²¹

【别名】九层塔。

【来源】为爵床科植物杜根藤 *Calophanoides chinensis* (Champ.) C. Y. Wu. et. H. S. Lo 的全草。

【性味】微咸，温。

【功效】避瘟疫毒，止血、

【主治】春瘟、鸡窝症、吐血、衄血。

【用量】6~9g。

【应用经验】

1、外伤出血：广椒七鲜叶 60g，捣烂绞汁，冲黄酒服。

2、预防春瘟、鸡窝症：广椒七 18g 丹参 冲天炮各 9g。水煎服。

第七章 败血毒药

土家语名：灭毒败业药

土家语拼音：miev duf baif niex yaof

国际音标：mie⁵³ tu³⁵ pai³⁵ ɬie⁵⁵ jau³⁵

凡具有凉血活血、驱赶血中毒邪功效，用于治疗血毒病的药物称败血毒药。

土家医认为血毒病邪一是外邪热毒、火毒、瘟毒等入血分，形成急血毒病症；二是内生毒邪入血，形成慢血毒病症。病理变化血热、血寒、血虚、血瘀。血毒病因性质不同，病位不同各有其特殊的临床症状及体征，共有表现有：伏热、出血、头晕、乏力症状和舌红、舌白、舌暗，脉数、涩。

败血毒药物除**辛亥**血、活血和驱赶血毒功效外，某些药物还兼有清热、泻火、除瘟毒、活血、止血、补血、生血、解食毒、解蛇毒功效，经配方用于治疗：**外热证**、脏器火旺症、瘟毒病、血瘀病、出血病、血虚病、食物中毒症、毒蛇、毒虫咬伤症等。

常用败血毒药物包括凉血的**突**活血毒两大类。凉血毒类有：大寒药、火炭母、鸡脚黄、刺茄菜、香叶、岩田七、猫舌草、土三七、路边青、山皮条、黄鳝藤、白插泥花、黄海棠、金丝梅、贯叶连、元宝草、芫花根、紫血根、紫珠草、血盆草、大仙桃草、夜香牛、毛马兰、盘龙参、水八角莲、七角风、马齿苋九月花、十姊妹、地石榴、老汉背娃、灯笼花、花边草、铁仔、铁破罗、秋胡豆。活血毒

有：胭脂花、野扁韭、棉花七、霸王七、柴木道、肥猪苗、岩五爪。

1、大寒药

土家语名：此巴塞药

土家语拼音：cix bax hanr yaof

国际音标：ts'i⁵⁵ pa⁵⁵ xan²¹ jau³⁵

【来源】为马兜铃科植物大寒药 *Avistolochia keddei* Levl., 全草入药。

【性味】甘、苦，凉

【功效】凉败血毒，止出血。

【主治】咽喉肿痛，肚灼热，肚疡出血，跌伤出血。

【用量】内服 5~10g，外用适量。

【应用经验】肚热胃疡出血：大寒药 6g 血经大黄炒 6g 白芨 10g 石贝穿 15g 鸡爪莲 6g 仙鹤草 10g。每日一剂，煎二次服，忌辛辣。

【备注】场行小毒。

2、火炭母

土家语名：米实克罗阿捏

土家语拼音：miv sir kor lor ar niex

国际音标：mi⁵³ si²¹ k'o²¹ lo²¹ a²¹nie⁵⁵

【别名】乌炭子、晕药。

【来源】为蓼科植物火炭母 *Polygonum chinense* L., 块根入药。

【性味】酸、微涩，凉。

【功效】凉败血毒，消肿痛。

【主治】暴痢，下血，红眼病。

【用量】10~20g。

【应用经验】

1、痢疾：接骨笋 10g 崩大碗 10g 满天星 2g。水煎服。

2、跌打损伤、风湿骨痛：接骨笋 15~30g 络石藤 12g。水煎服。

3、粪毒：接骨笋适量捣烂外搽。

【备考】1、化学成分：含有山柰酚、槲皮素、黄酮甙如山柰酚-7-葡萄糖甙、山柰酚-3-葡萄糖醛酸甙、 β -谷甾醇、逆没食子酸、没食子酸等。

2、药理作用：①对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌、绿脓杆菌、大肠杆菌、痢疾杆菌等有较强抑制作用。②煎剂对离体豚鼠回肠无明显作用，对离体大鼠子宫有抑制作用；水提物对离体豚鼠回肠有收缩作用。③水提物可减少小鼠自发活动，且可轻度延长环己巴比妥钠的睡眠时间。

3、鸡脚黄

土家语名：日阿吉王嘎里

土家语拼音：rar jir wangr gax lix

国际音标：za²¹ tɕi²¹ wan²¹ ka⁵⁵ li⁵⁵

【别名】小酸广、咀儿大黄、九牛子、牛耳大黄。

【来源】为蓼科植物小酸广 *Rumex acetosa* L.，根入药。

【性味】苦，寒。

【功效】凉败血毒，通便，杀虫。

【主治】肚肠内出血，内痔出血，崩漏，吐血，痢疾，便秘，疥癣，疗疮，牛皮癣。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、痔疮出血、便秘：咀儿大黄 15g，开水泡服。
- 2、烧伤、烫伤：咀儿大黄适量，研末，麻油调搽。
- 3、神经性皮炎：咀儿大黄，加食盐少许，煎水外洗。

【备考】能抑制大孢霉菌的繁殖和生长。

4、刺苋菜

土家语名：他色苋菜

土家语拼音：tax ser xianf caif

国际音标：t'a⁵⁵ se²¹ ɕian³⁵ ts'ai³⁵

【别名】扯根菜。

【来源】为苋科植物刺苋菜 *Amarantnus spinosus* L.，全草入药。

【性味】甘、淡，凉。

【功效】凉败血毒，止血消肿。

【主治】胆石症，便血，呕血，浮肿，热痢，毒蛇咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】老年皮肤干痒症：刺苋菜子 15g 插泥花树皮 10g 罗钱松皮 10g 桐麻皮 10g 鱼腊树子 10g。每日一剂，水煎二次服。

5、香叶

土家语名：尔他香卡蒙

土家语拼音：ex tax xianx kar mongr

国际音标：e⁵⁵ t'a⁵⁵ ɕian⁵⁵ k'a²¹ muŋ²¹

【别名】香叶树。

【来源】为樟科植物香叶树 *Lindera communis* Hemsl.，茎皮，叶入药。

【性味】辛、涩、微苦，温。

【功效】散血毒，消瘀肿。

【主治】痈疖肿痛，跌打瘀肿，外伤出血。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】蛆蚊虫：香叶 黄花蒿 辣蓼草各适量。加工成佛香，在蚊虫地方燃烧。

6、岩田七

土家语名：阿田七

土家语拼音：ar tianr qir

国际音标：a²¹ t'ian²¹ tɕi²¹

【别名】芮务斩、山飘风、白花调口草。

【来源】为景天科植物山飘风 *Sedum major* (Hemsl.) Migo，全草入药。

【性味】苦、涩，凉。

【功效】凉败血毒，驱蛇毒。

【主治】鼻血，痔血，毒蛇咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

7、猫舌草

土家语名：莫玉那实克查

土家语拼音：mor yif lax sir ker car

国际音标：mo²¹ ji³⁵ la⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】石蝴蝶、丁字草、紫花景天。

【来源】为景天科植物紫花景天 *Sedum mingjinianum* Fu, 全草入药。

【性味】苦、酸，咸。

【功效】凉败血毒，活血止血。

【主治】小儿血毒惊风，胸气瘤（胸膜炎），吐血，血瘀腰痛，腰带疮，毒蛇咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】胸气瘤症（胸腹炎）：山皮条 15g 瓜蒌壳 10g 苏子 10g 白芥子 10g。每日一剂，水煎服。

8、土三七

土家语名：土三七

土家语拼音：tux sanx qir

国际音标：t'u⁵⁵ san⁵⁵ tɕi²¹

【别名】见血散、景天三七。

【来源】为景天科植物景天三七 *Sedum aizoon* L., 根入药。

【性味】微涩，平。

【功效】凉败血毒，止血止痛，定悸除烦。

【主治】小血劳（血小板减少紫癜），心悸心烦，不寐，各种出血。

【用量】6~10g。

9、枣儿红

土家语名：枣司免姐

土家语拼音：zaox six mianf jiex

国际音标：tsau⁵⁵ si⁵⁵ mian⁵⁵ tɕie⁵⁵

【别名】红地榆、鼠尾地榆。

【来源】为蔷薇科植物大花地榆 *Sanguisorba grandiflora* (Maxim.)

Makino, 根茎入药。

【性味】苦、涩，微寒。

【功效】凉败血毒，止血止泻。

【主治】吐血，衄血，血痢，崩漏，肠风下泻。

【用量】6~10g。

10、路有良

土家语名：拉苦信嘎

土家语拼音：lax kux xinf gax

国际音标：la⁵⁵ k'u⁵⁵ ɕin³⁵ ka⁵⁵

【别名】地椒、接骨丹、南水杨梅、头骨药。

【来源】为蔷薇科植物路边青 *Geum japonicum* Thunb. var. *chinense* F. Bolle, 全草入药。

【性味】甘、平。

【功效】活血败毒，补虚益肾。

【主治】咳嗽吐血，月经不调，疮肿，骨折，头晕目眩，四肢无力，阳虚，体虚感冒。

【用量】6~10g。

【应用经验】头晕症：路边青全草 30g。切细，鸡蛋 3 个。共煮至蛋熟，吃蛋和汤。

11、山皮条

土家语名：抗苦皮条

土家语拼音：kanr kux pir taor

国际音标：k'an⁵⁵ ku⁵⁵ p'i²¹ t'iau²¹

【别名】假大青蓝。

【来源】为豆科植物假大青蓝 *Indigofera callegoides* Dc.，种子入药

【性味】苦，凉。

【功效】凉败血毒，消斑止痒。

【主应考】肌血，鼻衄，皮肤痒，斑疹。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

12、黄鳢藤

土家语名：王三二拉

土家语拼音：wanr sanx ef lax

国际音标：wan²¹ san⁵⁵ e³⁵ la⁵⁵

【别名】皱皮草、熊柳、多花勾儿茶。

【来源】为鼠李科植物多花勾儿茶 *Berchemia floribunda* Wall. Brongn.，茎叶入药。

【性味】微苦，凉。

【功效】凉败血毒，化湿气。

【主治】衄血，黄疸，风湿腰痛，痛经（经前）。

【用量】6~10g。

【应用经验】痛经（经前）：黄鳢藤 15g 血通 10g 益母草 15g 回头青 15g。
每日一剂，煎二次服，痛停药停。

13、白插泥花

土家语名：阿实插泥卡普

土家语拼音：ar sir car nir kax pux

国际音标：a²¹ si²¹ ts'a²¹ ni²¹ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】木槿花。

【来源】为锦葵科植物木槿 *Hibiscus syriacus* L.，花入药。

【性味】甘、苦，凉。

【功效】凉败血毒，消肿胀。

【主治】热毒痢，痔肿出血，妇女血带，痈肿。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

14、黄海棠

土家语名：黄海棠

土家语拼音：huanr haix tanr

国际音标：xuan²¹ xai⁵⁵ t'an²¹

【别名】小连翘、红旱莲。

【来源】为藤黄科植物黄海棠 *Hypericum assyron* L., 全草入药。

【性味】微苦、涩，寒。

【功效】凉败血毒，止血，退黄。

【主治】黄疸，吐血，咯血，衄血，崩漏，黄水疮。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、月经过多、月经不调；小连翘 9~15g，水煎服。

2、外伤出血、烫伤：鲜草捣烂外敷。

15、金丝梅

土家语名：金丝梅

土家语拼音：jinx six meir

国际音标：tɕin⁵⁵ si⁵⁵ mei²¹

【别名】小板凳、木连毒、走连桃。

【来源】为藤黄科植物金丝梅 *Hypericum patulum* Tnunb., 嫩枝叶入药。

【性味】苦、辛，寒。

【功效】凉败血毒，止血、止痒。

【主治】血毒水肿，血崩，鼻血，皮肤痒，黄水疮。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、瘟黄症、着凉症：山连翘花 12~15g，水煎服。
- 2、鼻血症：山连翘鲜叶捣烂塞鼻。
- 3、黄水疮：山连翘茎叶研末，撒布患处。

16、贯叶连

土家语名：贯叶连

土家语拼音：guanf yer lianr

国际音标：kuan³⁵ je²¹ lian²¹

【别名】贯叶连翘、大田基黄、赶山鞭。

【来源】为藤黄科植物贯叶连翘 *Hypericum perforatum* L.，全草入药。

【性味】苦、涩，平。

【功效】凉败血毒，止血，调经。

【主治】吐血，咯血，皮肤出血，血崩，痈疔。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、吐血、崩漏下血：贯叶连翘 仙鹤草各 15g 旱莲草 12g 蒲黄炭 10g。水煎服。
- 2、血滞痛经：贯叶连翘 元宝草 当归各 10g 香附子 6g 鸡血藤 15g。水煎服。
- 3、风湿筋骨痛：贯叶连翘 寻骨风各 15g 伸筋草 木瓜各 9g 活血藤 15g。水煎服。

【备考】1、化学成分：含金丝桃苷、金丝桃萜苷、伪金丝桃萜苷、槲皮素、芸香苷、挥发油。油中主要成分为蒎烯、倍半萜烯；尚有维生素 C、胡萝卜素、花色素、蜡、二十八碳和三十碳蜡醇、β-谷甾醇、甘露醇、鞣质、树脂、咖啡酸、氯原酸等。

2、药理作用：①抗菌作用：贯叶连翘对金黄色葡萄球菌、结核杆菌、肺炎球菌、溶血性链球菌均有抑制作用。②驱虫作用：全草浸剂和提取物对复孔丝虫病、膜壳涤虫病有很好的效果。对狗蛔虫病部分有效。驱蛲虫的效果也很好。③所含黄酮类，可拮抗皮下注射可卡因引起的兴奋。浸剂和提取物能加强心脏活动，收缩血管，升高血压，还有利胆作用。④所含金丝桃素对人的大脑神经具有调整

作用，对中、轻度精神抑郁症有一定的疗效。

17、元宝草

土家语名：元宝实克查

土家语拼音：yanr baox sir ker car

国际音标：jan²¹ pau⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】狗尿香、对月草、刘寄奴。

【来源】为藤黄科植物元宝草 *Hypericum sampsonii* Hance., 全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】凉败血毒，止血，退热，消肿。

【主治】小儿血毒高热，热毒痢，吐血，衄血，乳痈。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、吐血、咯血、衄血：对月草 墨旱莲各 20g 虎杖 15g。水煎服。
- 2、月经不调：对月草 15~30g 益母草 9g 金锦香根 15g。水煎服。
- 3、跌打扭伤肿痛：鲜对月草根 15g 酒水各半煎服，另用对月草叶，加酒糟同捣匀敷患处。
- 4、肿包疮毒：对月草 紫花地丁 芙蓉叶 一把伞各适量，捣烂敷贴。

18、芫花根

土家语名：芫花卡普机纳

土家语拼音：yanr fax kax pux jix lar

国际音标：jan²¹ xua⁵⁵ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵ tɕi⁵⁵ la²¹

【别名】

【来源】为瑞香科植物芫花 *Daphne genkwa sieb. et. Zucc.*, 根入药。

【性味】甘、微辛，热。

【功效】败散血毒，散结消肿。

【主治】跌打损伤，痈肿，无名肿毒。

【用量】内服 3~6g，外用适量。

【备考】花蕾有祛痰、利尿功效。

19、珍珠菜

土家语名：珍珠哈车

土家语拼音：zenx zux hax cex

国际音标：tsen⁵⁵ tsu⁵⁵ xa⁵⁵ ts'e⁵⁵

【别名】红根散血草、芮松。

【来源】为报春花科植物珍珠菜 *Lysimachia clethroides* Duby., 全草入药。

【性味】酸、涩，平。

【功效】败散血毒，调经消肿，杀虫。

【主治】肿瘤，妇女月经不调，经闭，痛经，崩漏，白带，小儿疳积，水肿，痢疾，跌打损伤，痈肿疮疖，喉痛，乳痛。

【用量】内服 6~15g，外用适量。

【应用经验】

1、经闭：白花草 15g 大血藤 12g 小血藤 9g 月季花根 6g 泡酒 500 ml，早晚各服适量。

2、红肿疮疖：白花草 12g。水煎服，渣捣烂敷患处。

3、月经不调、白带：珍珠菜根 矮地茶根各 60g 瞿麦 30g 活血藤 15g。水煎服。

4、月经过多：珍珠菜根 金樱子根各 30g 鸡蛋 1 个。同煮熟，蛋、汤同服。

5、小走胎：珍珠菜根 20g 鸡蛋 1 个。水煮，服汤食蛋。

【备考】1、化学成分：根含报春花皂苷元 A、二氢报春花皂苷元 A 即山茶元。种子含多量脂肪油。

2、药理作用：①经临床观察丝虫性急性淋巴管炎发作期患者经用珍珠菜治疗后，在 1 天内有 66.6% 病例体温恢复正常，在 3 天内全部病例体温恢复正常；局部炎症消退时间平均为 3.39 天，说明有治疗效果，经 1 年半后复查说明现用剂量不能控制远期复发及减轻发作症状。②珍珠菜黄酮苷对大、小鼠移植性肿瘤的生长有一定的抑制作用。对淋巴肉瘤 1 号腹水型转实体、小鼠肉瘤 180、小鼠宫颈癌、肝癌腹水型转实体及艾氏腹水癌转实体、小鼠网状细胞肉瘤腹水型的抑

制作用较明显。

20、紫血根

土家语名：紫血机纳

土家语拼音：zix xier jix lar

国际音标：tsi⁵⁵ ɕie²¹ tɕi⁵⁵ la²¹

【别名】紫草。

【来源】为紫草科植物紫草 *Lithospermum erythrorhizon* Sieb. et Zucc., 根入药。

【性味】甘、酸，寒。

【功效】败散血毒，透疹，通便。

【主治】痢毒入血，毒疹不透，黄疸，便秘，痈肿。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】血毒皮疹：紫草 10g 赤芍 10g 生地 20g 紫珠子 10g。每日一剂，煎二次服。

21、紫珠草

土家语名：炮竹布里卡蒙

土家语拼音：paof zuf buf lix kar mongr

国际音标：p'au³⁵ tsu⁵⁵ pu³⁵ li⁵⁵ k'a²¹ muŋ²¹

【别名】炮火树、白棠子树。

【来源】为马鞭草科植物白棠子树 *Callicarpa dichotoma* (Lour.) K. Koch, 叶入药。

【性味】淡、微辛，凉。

【功效】败散血毒，止血。

【主治】吐血，咯血，衄血，便血。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】皮肤紫斑症：紫珠子 10g 四匹瓦 10g 白茅根 10g 仙鹤根 10g 贮麻根 10g 紫血根 10g。每日一剂，煎服。

22、血盆草

土家语名：灭格歛梯实克查

土家语拼音：miev geix tix sir ker car

国际音标：mie⁵³ kei⁵⁵ t'i⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】天青地红，土丹参。

【来源】为叫做科植物血盆草 *Salvia cavaleriei* Levl. var. *simplicifolia* Stib.，根入药。

【性味】味苦，凉。

【功效】败化血毒，散瘀止血。

【主治】血毒瘀斑，赤痢，血热。

【用量】6~10g。

【应用经验】妇女产后恶露不尽：血盆地 15g 锯草根 10g 红牛膝 10g 小血藤根 10g。每日一剂，水煎二次服。

【备考】具有抗凝和耐氧作用。

23、大仙桃草

土家语名：此巴仙桃实克查

土家语拼音：cix bax xianx taor sir ker car

国际音标：ts'i⁵⁵ pa⁵⁵ ɕian⁵⁵ tau²¹ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】北水苦荬。

【来源】为玄参科植物水苦荬 *Veronica anagallis-aquatica* L.，带果全草入药。

【性味】苦涩，凉。

【功效】败散血毒，消肿止痛，止血。

【主治】小血劳(血小板减少紫癜)，咽喉肿痛，月经不调，痈疔肿毒。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、咽喉肿痛：水仙桃草 30g，水煎服。

2、跌打损伤：水仙桃草适量研末，每服 5g，每日二次，酌加酒和服。

3、痈疔肿毒：鲜水仙桃草、鲜一把伞各适量，共捣烂外敷。

24、夜香牛

土家语名：铺土菊

土家语拼音：puf tux jir

国际音标：p'u³⁵ t'u⁵⁵ tɕi²¹

【别名】斑鸠菊、寄色草。

【来源】为菊科植物夜香牛 *Vernonia cinerea* (L.) Less, 全草入药。

【性味】苦、微甘，凉。

【功效】败散血毒，疏风热。

【主治】热咳，赤痢，风热感冒，蛇咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】仍旧蛇咬伤：鲜夜香中全。

25、毛马兰

土家语名：是嘎马兰

土家语拼音：sif gaf max lanr

国际音标：si³⁵ ka⁵⁵ ma⁵⁵ lan²¹

【别名】毛马兰丹、毡毛马兰。

【来源】为菊科植物毡毛马兰 *Kalimeris shimadae* (Kitam.) Kitam., 全草入药。

【性味】淡，凉。

【功效】败散血毒，赶退黄。

【主治】血痢，痈肿，吐衄，黄疸，蛇咬伤。

【用量】内服 15~30g，外用适量。

26、盘龙参

土家语名：盘龙参

土家语拼音：panr longr senx

国际音标：p'an²¹ luŋ²¹ sen⁵⁵

【别名】懒蛇上树、绶草。

【来源】为兰科植物绶草 *Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames, 根及全草入药。

【性味】甘、微苦，凉。

【功效】败散血毒，滋阴气。

【主治】小儿夏烧症（小儿夏季热），消渴，肺癆，毒蛇咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】肾虚漏精症：盘龙参 10g 糠刺果 10g 无根子 10g 峨参 10g。纱布包煮猪瘦肉服。

27、水八角莲

土家语名：泽叶角莲

土家语拼音：cer yer gor lianr

国际音标：ts'e²¹ je²¹ ko²¹ lan²¹

【别名】川八角莲、八角金盘、八角乌、金边七。

【来源】为小檗科植物川八角莲 *Dysosma veitchii* (Hemsl. et Wils.) Fu ex Ying, 块茎入药。

【性味】苦，凉。

【功效】败化血毒，活血祛瘀。

【主治】血热，咳血，毒蛇咬伤，跌打损伤。

【用量】3~6g。

【备注】有毒。

28、马苋菜

土家语名：马苋菜

土家语拼音：max xianf caif

国际音标：ma⁵⁵ xian³⁵ ts'ai³⁵

【别名】马齿菜、蛇子菜、长寿菜。

【来源】为马齿苋科植物马齿菜 *Portulaca oleracea* L., 全草入药。

【性味】性凉，味酸。

【功效】败散血毒，赶湿清热。

【主治】疮疡肿毒，蛇虫咬伤。

【用量】10~30g。

【备考】1. 有收缩子宫、心肌和松弛肌肉作用。2. 有抗菌作用。

29、九月花、(二郎箭)

土家语名：给司卡普

土家语拼音：gex six kax pux

国际音标：ke⁵⁵ si⁵⁵ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】土龙胆、喇叭花、红花胆草。

【来源】为龙胆科植物红花龙胆 *Gentiana rhodantha* Franch.，全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】败散血毒，清热利湿，解蛇毒。

【主治】目赤肿痛，痢疾，小便淋痛，黄疸，蛇咬伤，烧伤，烫伤及痈肿疔毒。

【用量】内服6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、目赤肿痛、小便淋痛：九月花9g。水煎服。

2、蛇咬伤：九月花 逼血雷 黄荆条 算盘子根各等量。捣烂敷患处。

3、疔毒：九月花根煎水服，并用叶捣烂外敷。

4、风热头晕：土龙胆根适量，炖肉吃。

5、痧症腹痛：土龙胆全草30g。水煎服。

6、瘟黄症：二郎箭 茵陈各12g 虎杖15g 铧头草 满天星 南天竹各9g 青木香6g。水煎服。

【备考】1、化学成分：含正三十一碳烷、正三十二碳酸乙酯、正三十二碳酸和β-谷甾醇。

30、十姊妹

土家语名：仍嘎黑欸那夫

土家语拼音：renf gax heif naf hux

国际音标: zen³⁵ ka⁵⁵ xei³⁵ za³⁵ xu⁵⁵

【别名】刺月红、小玫瑰、大红蔷薇。

【来源】为蔷薇科植物小玫瑰 *Rosa saturata* Brker., 花入药。

【性味】甘, 寒。

【功效】败散血毒, 调经。

【主治】血热经黑, 月经不调, 黑疽痞块, 骨折。

【用量】3~6g。

【应用经验】

- 1、月经不调: 红花 桃仁 鸡冠花 十姊妹花 血在各 20g。水煎汁, 加阿胶 20g 内服。
- 2、黄疸、痞块: 十姊妹 15g 猕猴桃根 15g 虎杖 10g 鸡矢藤 15g 赤阳子 10g 猪赤肉 60g, 同炒至焦黄, 再加红酒 30g, 共煮 2 小时, 同午饭服用。
- 3、跌打损伤、劳伤: 七姊妹 30g。水煎兑酒服。
- 4、疝气: 七姊妹 马鞭草 地胡椒 小通草各 10g。水煎服。

31、地石榴

土家语名: 里提石留

土家语拼音: liv tir sir liux

国际音标: li⁵³ ti²¹ si²¹ liu⁵⁵

【别名】叶间株、刷子草、黄花蛇舌草。

【来源】为檀香科植物百蕊草 *Thesium chinensis* Turcz., 全草入药。

【性味】甘、淡, 微凉。

【功效】败血毒, 益肾补虚, 解暑。

【主治】疔毒走瘕, 头昏, 耳鸣, 肺脓疡, 失眠, 肾虚腰痛, 小儿疳积。

【用量】10~30g。

【备考】1、化学成分: 含山柰酚、山柰酚-3-鼠李葡萄糖苷、紫云英甙、琥珀酸、D-甘露醇。

2、药理作用: 对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌、卡他球菌、甲型链球菌、白色念珠菌等均有较强的抑制作用; 对大肠杆菌、八叠球菌、变形杆菌等也有一定

的抑制作用。有抗癌作用。

32、老汉背娃娃

土家语名：破趴此波立窝

土家语拼音：por pax cix box lir wov

国际音标：p'o²¹ p'a⁵⁵ ts'i²¹ po⁵⁵ li²¹ wo⁵³

【别名】山慈菇。

【来源】为兰科植物独花兰 *Changnienia amoena* Chien, 全草入药。

【性味】甘、微苦，凉。

【功效】败散血毒，消肿散结。

【主治】热毒灼肺，咳嗽，痰中带血，热疔疮。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】肺热毒灼伤症：老汉娃 10g 杏叶沙参 10g 白芨果 10g 黄草 6g 地螺丝 10g 蜜制枇杷叶 10g。每日一剂，水煎二次服。

33、灯龙花

土家语名：灯龙卡普

土家语拼音：denx longr kax pux

国际音标：ten⁵⁵ luŋ²¹ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】倒地铃。

【来源】为无患子科植物倒地铃 *Cardiospermum halicacabum* L., 全草入药。

【性味】苦、微辛，凉。

【功效】败散血毒，消肿止痛，清热，利水。

【主治】疮疖钢的，黄疸，淋病，疔疮，水泡疮，疥癬，蛇咬伤，湿疹等，跌打损伤。

【用量】10~30g。

【应用经验】气毒伤肝肋痛症：灯龙花 10g 玫瑰花 10g 八月扎 10g 紫萁根 10g 土柴胡 7g 竹辛 7g。每日一剂，煎二次服。

34、花边草

土家语名：卡普边边实克查

土家语拼音：kax pux bianx bianx sir ker car

国际音标：k'a⁵⁵ p'u⁵⁵ pian⁵⁵ pian⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】肺形草、大叶吊鱼杆、毛大地丁。

【来源】为菊科植物杏香兔儿风 *Ainsliaea fragrans* Champ.，全草入药。

【性味】甘，凉。

【功效】败散血毒，清热利湿，止咳，散结。

【主治】口疮，脓耳，瘰疬，毒蛇咬伤等。

【用量】6~12g。

【备考】对金黄葡萄球菌有抑制作用。

35、金线吊乌龟

土家语名：金线吊乌龟

土家语拼音：jinx xianf daof wux guix

国际音标：tɕin⁵⁵ ɕian³⁵ tiau³⁵ wu⁵⁵ kui⁵⁵

【别名】山乌龟、金线吊戎芦。

【来源】为防己科植物金线吊乌龟 *Stephania cepharantha* Hayata，块根入药。

【性味】苦，寒。

【功效】败散血毒，清热化痰，消肿散结。

【主治】吐血，衄血，胃痛，水膨症，风湿骨痛，奔肿症，脱发，腰肌劳损，瘰疬，毒蛇咬伤，无名肿毒，痈疽疮毒。

【用量】内服6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、烧心症（胃痛）：山乌龟研粉压片，0.3g/片，2~4片/次，三次/日。

2、小霍乱症：山乌龟研粉，每次服0.6~0.9g。

3、胃气痛、气胀腹痛：山乌龟根研末，1.5g/次，姜汤送下。

【备考】药理作用：1、轮环藤碱对动物实验性矽肺有良好的防治作用。2、左旋箭毒碱的碘甲烷化合物可作为肌肉松弛剂，作用强度与d-筒箭毒碱相似，其二甲醚碘甲烷衍生物的肌肉松弛作用较原碱碘甲烷衍生物强3倍，作用维持比d-筒箭

毒碱为长，毒性亦低。3、西法安全能解毒和抑制结核杆菌作用，还能刺激网状内皮系统，激活造血系统，促进骨髓组织增生功能。4、本品所含的生物碱有镇痛、镇静作用。5、解热镇痛、抗风湿、抗过敏体 g、催吐、降压等作用。6、有抗麻风、抗变态反应的作用。

36、铁仔

土家语名：写仔

土家语拼音：xiev zaix

国际音标：ɕie⁵³ tsai⁵⁵

【别名】大红炮、米籽树。

【来源】为紫金牛科植物铁仔 *Myrsine africana* L.，全草入药。

【性味】苦、涩，凉。

【功效】败散血毒，收敛止血，止咳，止痛。

【主治】劳伤人地，刀伤出血，干咳咯血，风火牙痛，痢疾，泄泻，烧伤，烫伤，疮疹，毒蛇咬伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、久泻、痢疾：铁仔 15g 石榴皮 10g。水煎服。

2、烧伤、烫伤：铁仔适量，水煎洗患处。

3、劳伤咳嗽：铁仔 马兜铃 百合 白及 大肺筋草各 9g 黄秋葵花 6g。水煎兑冰糖服。

【备考】1、化学成分：全草含有信筒子醌（即摠贝素）和鞣质、酚性成分、甾体、黄酮类。叶和嫩枝含皂苷。

2、药理作用：①本品所含摠贝素有驱绦虫作用。②叶及小枝的乙醇提取物或其皂苷在接近中毒剂量时，对鼠瓦 g 肉瘤-256 有抑制作用。③100%煎剂及 100%注射液对志贺氏、福氏、宋内氏、史密氏痢疾杆菌高度敏感。对卡他球菌、伤寒杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎杆菌较敏感，对中型链球菌、肺炎球菌、白色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、绿脓杆菌、大肠杆菌有抑制作用。

37、秋胡豆

土家语名：秋胡豆

土家语拼音：qiux hur douf

国际音标：tɕiu⁵⁵ xu²¹ təu³⁵

【别名】胡枝子。

【来源】为豆科植物美丽胡枝子 *Lespedeza formosa* (Vog.) Koehne. 茎或全草入药。

【性味】苦，平。

【功效】败散血毒，除湿消肿。

【主治】湿热疮疹，蛇咬伤，跌打损伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、湿热疮毒、湿疹：秋胡豆 小槐花 蛇倒退 蛇蜕 蜂房 蓝桉叶各适量。煎水外洗。

2、蛇咬伤：秋胡豆 地苦胆 蛇参 南蛇藤各适量。捣烂外敷。

3、扭伤、骨折：秋胡豆根皮（鲜）或酒糟捣烂敷患处。

【备考】1、化学成分：根含生物碱、甙类、鞣质。

2、药理作用：抗菌试验，全草对金黄色葡萄球菌及绿脓、大肠、变形、痢疾、伤寒、产碱等杆菌均有抑制作用。

38、胭脂花

土家语名：借从菜

土家语拼音：jief congr caif

国际音标：tɕie³⁵ ts'uŋ²¹ ts'ai³⁵

【别名】紫茉莉。

【来源】为紫茉莉科植物胭脂花 *Mirabilis jalapa* L.，根或全草入药。

【性味】淡、微涩，平。

【功效】败散血毒，清热利湿。

【主治】尿急症，白浊，白带，田水劳症，跌打损伤，痈肿疔毒。

【用量】内服6~10g，外用适量。

【备考】有致泻和避孕作用。

39、野扁韭

土家语名：抗苦扁韭

土家语拼音：kanr kux bianx jiux

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ pian⁵⁵ tɕiu⁵⁵

【别名】白绿绵枣儿。

【来源】为百合植物白绿绵枣儿 *Scilla scilloids* var. *albouiridis* Wang et Y. C. Tang, 鳞茎或全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】败散血毒，消肿止痛。

【主治】乳痈，跌打损伤，腰疼痛。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】奶疮：鲜扁韭根适量，捣烂敷局部，每日一次。

【备注场行小毒。

【备考】有强心利尿和兴奋子宫的作用。

40、棉个良

土家语名：灭哈七

土家语拼音：mier har qir

国际音标：mie²¹ xa²¹ tɕi²¹

【别名】小升麻、米升麻、万年根。

【来源】为毛茛科植物金龟草 *Cimicifuga acerina* (S. et Z.) Tana., 根茎入药。

【性味】苦，微温。

【功效】败散血毒。

【主治】咽喉干痛，跌打，劳损，风湿腰腿痛，疔肿。

【用量】6~10g。

【备注场行小毒。

41、地胡椒

土家语名：里提胡椒

土家语拼音：lix tir hur jiaox

国际音标：li⁵³ t'i²¹ xu²¹ tɕiau²¹

【别名】小救驾、鹅不食草。

【来源】为菊科植物石胡荽 *Centipeda minima* (L.) A. Br. et Ascher.，全草入药。

【性味】辛、微苦，平。

【功效】败化血毒，散瘀消肿，通窍祛痰。

【主治】鼻渊，百日咳，痢疾，跌打损伤，蛇虫咬伤，痈肿疮毒。

【用量】内服 3~6g，外用适量。

【应用经验】

1、风寒头痛：土麻黄 水蜈蚣 积雪草 紫苏各 9g。水煎服。

2、毒蛇咬伤：土麻黄 雄黄各 6g 一支箭 12g。捣绒外敷。

【备考】1、化学成分：果、枝、叶均含挥发油。

2、药理作用：①有镇咳，祛痰，平喘作用。②对结核杆菌、流感病毒有抑制作用。③有恶心呕吐副作用。

42、霸个良

土家语名：泽务起起七

土家语拼音：cer wuf qif qix qir

国际音标：ts'e²¹ wu³⁵ tɕi³⁵ tɕi⁵⁵ tɕi²¹

【别名】冷水七、血三七、红苋、止痛丹。

【来源】为凤仙花科植物冷水七 *Impatiens pritzellii* Hook. f. var. *hupehensis* Hook. f.，根入药。

【性味】苦、辛，微寒。

【功效】活血解毒，祛风除湿，止痛止血。

【主治】跌打损伤、风湿疼痛、四肢麻木、腕腹疼痛、月经不调、痈疮肿痛、蛇

咬伤。

【用量】入汤剂内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、跌打损伤、腰腿疼痛：霸王七 大血藤 小血藤 牛膝 松节 柏树子各 10g。泡酒服。
- 2、痈疽肿毒：霸王七适量，捣烂敷患处。
- 3、虫、蛇咬伤：霸王七泡酒，外擦患处。
- 4、风湿关节炎、肢体麻木疼痛：冷水七 10g 凌霄花根 6g 地蜂子 6g 白酒 500ml。浸泡 1 周，每服 20ml，日服三次。

43、起泡草

土家语名：泡泡不实克查

土家语拼音：paof paox bur sir ker car

国际音标：p'au³⁵ p'au⁵⁵ pu²¹ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】石龙芮、辣子叶。

【来源】为毛茛科植物起泡草 *Ranunculus sieboldii* Miq.，全草入药。

【性味】苦，热。

【功效】败化血毒，通经活络。

【主治】跌打损伤，疮毒，蛇咬伤，哮喘，疟疾，偏头痛，牙痛，黄疸。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】瘟黄症：起泡草鲜品适量，捣烂的肩角穴口，每次约 1~3 小时，皮肤起水泡后取下，双手交叉时间用，隔 1~2 日一次。

【备注】有毒。

【备考】对皮肤有刺激。

44、肥猪苗

土家语名：莫恩且

土家语拼音：mor enr qief

国际音标：mo²¹ en²¹ tɕie³⁵

【别名】猫耳朵、黄花草、猴屁股。

【来源】为菊科植物蒲耳根 *Senecio oldhamianus* Maxim, 全草入药。

【性味】苦，微寒。

【功效】败散血毒，消肿散结。

【主治】疮毒，跌打损伤。

【用量】6~10g。

45、岩五爪

土家语名：阿五爪

土家语拼音：ar wux zaox

国际音标：a²¹ wu⁵⁵ tsau⁵⁵

【别名】岩葡萄、岩五爪龙、走游草。

【来源】为葡萄科植物岩爬藤 *Tetrastigma obtectum* (Wall.) Planch., 全草或根入药。

【性味】辛，温。

【功效】败散血毒，祛风除湿。

【主治】头痛，身痛，风湿痹痛，流注，疮毒，蛇咬伤。

【用量】6~10g。

46、朱砂莲

土家语名：朱砂联军

土家语拼音：zux sax lianr

国际音标：tsu⁵⁵ sa⁵⁵ lian²¹

【别名】血当归、避血雷。

【来源】为薯蓣科植物朱砂莲 *Dioscorea cirrhosa* Lour., 块茎入药。

【性味】甘、微涩，平。

【功效】败化血毒，活血止血，止泻止痢。

【主治】红崩，痢疾，外伤出血。

【用量】6~10g。

【应用经验】血毒吐血症：朱砂莲 10g 仙鹤根 10g 柏叶炭 10g 白芨果 10g 毛蜡烛（炒）6g 棕极炭 10g 头发炭（冲服）。每日一剂，煎二次服。

47、牛血莲

土家语名：务贝尔在

土家语拼音：wuf miev lianr

国际音标：wu³⁵ mie⁵³ lian²¹

【别名】称陀七，朱砂莲，双边，血葫芦，血当归，雄黄七，红孩儿，避血雷。

【来源】为薯蓣科植物薯蓣 *Dioscoera cirrhosa* Lour. 的块茎。

【性味】性平，味涩、甜、微苦。

【功效】收敛止血，活血疗伤，除湿止痛，补虚养血等。

【主治】出血症，跌打损伤，风气病，血虚症，泻痢症，虚汗症。

【用量】常用：10~15g，单味最大 30~60g。

【应用经验】

1、水泻、腰痛、经闭：牛血莲 6~9g，水煎服，或研粉，每服 6g。

2、红崩：牛血莲、红鸡冠花各 9g，百草霜 3g，研粉。开水冲服。

【备考】1、化学成分：含多酚类、鞣质、β-古甾醇、左旋表儿茶素及两种甙、蛋白质、淀粉、粘液质等，淀粉约占 16%~31%。

2、药理作用：1、止血作用：家兔灌服薯蓣煎剂其出血时间与凝血时间，均显著缩短。2、对子宫的作用：酊剂或煎剂对离体小鼠子宫明显兴奋作用，使收缩的张力、振幅及频率均增强。3、对心脏的作用：乙醇浸液对离体蛙心呈抑制作用。④抗菌作用：酊剂或煎剂体外对金黄色葡萄球菌有中等强度的抑制作用，对甲型副伤寒杆菌、宋内氏痢疾杆菌有较弱的抗菌作用。⑤毒性：小鼠皮下注射煎剂，半数致死量为 6.8±9.1g/kg；给家兔静脉注射，可引起迅速死亡。

48、血当归

土家语名：灭当归

土家语拼音: **miev danx guix**

国际音标: mie⁵³ tan⁵⁵ kui⁵⁵

【别名】土三七、紫背三七。

【来源】为菊科植物**长度**三七 *Gynura segetum* (Lour.) Merr. 的根或全草。

【性味】甘，平。

【功效】活血，止血，解毒。

【主治】跌打损伤、衄血、咳血、吐血、乳痈、无名肿毒、毒虫螫伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、跌打损伤、经闭、咳血、吐血：血当归 15-30g，水煎或捣汁，冲烧酒服。

2、乳痈：血当归 15g，水煎服。

3、毒虫螫伤：血当归叶捣汁，涂患处。

【备考】

1、化学成分：含生物碱：千里光碱、千里光菲灵碱、菊三七碱甲、菊三七碱乙，并显有机酸、鞣质反应。地上部分含有甘露醇、琥珀酸、芦丁、5-甲基腺嘧啶、6-氨基嘌呤、吡咯啉类生物碱和氯化铵。

2、药理作用：①水提液有麻醉作用。②水煎剂对鼠疟原虫有抑制作用。③有止血作用。④菊三七碱引起大鼠厌食，体重下降，肝脏呈广泛性急性肝坏死，大剂量短期即可引起广泛性肝坏死，还可引起小静脉和门静脉周围组织增生。

49、血蜈蚣

土家语名：灭蜈蚣

土家语拼音: **miev wur gongr**

国际音标: mie⁵³ wu²¹ kuŋ²¹

【别名】岩红、一口血、红孩儿、血蜈蚣、裂叶秋海棠。

【来源】为秋海棠科植物裂叶秋海棠 *Begonia palmate* D. Don.，全草入药。

【性味】酸，凉。

【功效】化瘀消肿，止血止痛。

【主治】横痃症，咳嗽吐血，血崩症，跌打损伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、血崩山（崩漏）、劳伤吐血：一口血 60g 阴地蕨 30g。炖鸡服。
- 2、血虚经闭：一口血 鹿衔草各 30g 牛膝 10g 蓝布正 15g。炖鸡服。
- 3、妇女赤白带下症：血蜈蚣 10g 红白鸡冠花 10g 红、白土茯苓各 10g 黄剥皮 10g。每日一剂，水煎二次服。

50、干漆

土家语名：阿嘎七

土家语拼音：ax gar qif

国际音标：a⁵⁵ ka²¹ tɕi³⁵

【别名】漆块。

【来源】为漆树科植物漆树 *Toxicodendron verniciflum* (Stokes F、A、Baril 的树脂经加工后的干燥品。)

【性味】辛，温。

【功效】破瘀血，消食积，杀虫体。

【主治】妇女经闭、症瘕、淤血、虫积等。

【用量】3~6g。

【应用经验】

- 1、破瘀消积散：制干漆 5g 茯苓 10g 水蛭月季花 20g 当归 10g 川芎 10g 桂枝 5g。共研细末，每日服 4 次，开水冲服，空腹服治虫积特效（民间方）。
- 2、瘀血经闭：干漆 30g，煨为末，以当归 15g，川芎、赤芍各 9g，煎水送服。
- 3、妇女干血癆、形体消瘦、低热：干漆研末，以生地汁为丸，每 3g，米酒送服。

【备注】有毒。

【备考】

1、化学成分：生漆含二氧安臭油、树胶及醇等。干漆含漆酚（为数种儿茶酚衍生物的混合物）。

2、药理作用：干漆在较高的浓度中及长时间的作用下对囊虫尚有抑制和杀虫效力。

第八章 理气毒药

土家语名：是思在阿土药

土家语拼音：sif six duf af tux yaof

国际音标：si³⁵ si⁵⁵ tu³⁵ t'u⁵⁵ jau³⁵

凡具有疏通机体气机、驱赶体内气分毒邪功效，用于治疗气毒病的药物称理气毒药。

土家医认为气毒病是气在运动中受到外邪、情感等不断刺激，导致气滞、气逆、气结等病理基础。气结日久，形成气毒病。气毒病因种类不同，程度不同，临床症状和体征各异，一般有：胀、痛、昏厥等症状及舌胖大、脉弦或紧等体征。

治气毒药具有疏通气机，防止毒邪再生，驱赶气中毒邪，修复失调气机的功效，主要用于治疗气毒病。某些药物还兼有调肝、运肚、理肠、止痛、开窍、醒神的功效，经配方用于治疗气伤肝症、肚肠气胀症、嘎痛症、臃胀症等。

常用治气毒药有：乌棒七、豌豆七、螃蟹七、鸡血连、雷公莲、……。

1、乌个良

土家语名：乌棒七

土家语拼音：wux banf qir

国际音标：wu⁵⁵ pan³⁵ tɕ²¹ i

【别名】倒莲花、三岔子、木本远志、水黄杨木。

【来源】为远志科植物三岔子 *Polygala caudate* Rehd. et Wils.，根入药。

【性味】辛、微苦，平。

【功效】理气化毒，活血止痛。

【主治】跌打损伤，腰肌劳损，肩周炎。

【用量】6~10g。

【应用经验】风毒骨节痛：乌棒子 7g 乌骨七 10g 松节 10g 白龙须 6g 透身汗 4g 生姜 3 片。每日一剂，水煎二次服，忌生冷。

【备考】1、化学成分：叶含生物碱：黄杨醇碱 E、环朝鲜黄杨碱 B、环小叶黄杨次碱、环锦熟黄杨碱 D、黄杨碱 E、环小叶黄杨碱及 4,4 α -二氢环小叶黄杨碱。木质部主要含环锦熟黄杨碱 D、C 及环原黄杨碱 A、C 等。

2、药理作用：①黄杨木中的黄杨木生物碱具有强心作用，抗心绞痛作用，扩张血管作用及抗心律失常作用。②环常绿黄杨碱能显著延长小鼠耐缺氧时间，能显著缩小结扎前降支家兔的心肌梗死范围。③黄杨木碱 I 号对垂体后叶素诱发的急性心肌缺血有保护作用。④环常绿黄杨碱 D、C 及环原黄杨碱 C 均具有增加冠状动脉血流量的作用，用于冠心病以及冠心病引起的心绞痛。

2、豌个良

土家语名：豌豆七

土家语拼音：wanx douf qir

国际音标：wan⁵⁵ təu³⁵ tɕ²¹ i

【别名】一代宗、水三七。

【来源】为景天科植物水三七 *Rhodiola henryi* (Diels) S. H. Fu.，全草或根入药。

【性味】甘、辛，温。

【功效】理气化毒，散瘀止痛，安神定志。

【主治】气滞胃痛，胸肋胀痛，失眠多梦。

【用量】6~10g。

3、螃个良

土家语名：螃嘎七

土家语拼音：panr gaf qir

国际音标：p'an²¹ ka³⁵ tɕ²¹ i

【别名】紧箍咒、白南星。

【来源】为天南星科植物螃蟹七 *Arisaema fargesii* Buchet，块根入药。

【性味】辛，温。

【功效】理气化毒，散水消肿。

【主治】全身走窜性胀痛，皮肤肿胀，半身不遂，小儿凉风，毒蛇咬伤。

【用量】3~6g。

【应用经验】

1、中风、口眼喎斜、半身不遂：螃蟹七 6g 茵灵芝 6g 峨参 10g 钩藤根 10g 当归 10g 白山七 6g 红牛膝 10g。研细末，白糖为丸，日服三次，每次 5g。

2、小儿惊风、痰厥：制螃蟹七 3g 南天竹 3g 血蜈蚣 3g 水灯芯草 3g 饿蚂蟥 3g。水煎服。

3、风湿性肩背疼痛、劳损腰痛：螃蟹七 10g 乌龟七 10g 活血株 6g 江边一碗水 12g 包袱七 6g 地枇杷根 20g 扣子七 10g 当归 20g 响铃草 20g 白酒 1.5 kg。浸泡 3 天即可，日服三次，每次 15ml。

【备注】有大毒。

4、鸡血莲

土家语名：日阿灭莲

土家语拼音：rar miev lianr

国际音标：za²¹ mie⁵³ lian²¹

【别名】铁板金、铁蕨鸡。

【来源】为金星蕨科植物鸡血莲 *Abacopteris penangiana* (Hook.) Ching, 根茎或全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】理气化毒，活血止痛。

【主治】劳伤，跌打损伤，气滞，月经不调，火眼。

【用量】6~10g。

5、雷公莲

土家语名：麦他泽莲

土家语拼音：mef tax cer lianr

国际音标：me³⁵ t'a⁵⁵ ts'e²¹ lian²¹

【别名】大软筋藤、青竹标、石南藤。

【来源】为天南星科植物雷公莲 *Epipremnopsis sinensis* (Engl.)

H. Li, 全株入药。

【性味】辛，凉。

【功效】理气化毒，散瘀消肿。

【主治】骨折，心胸痛。

【用量】6~10g。

【备注】有毒。

6、鸡个良

土家语名：日阿里科保

土家语拼音：trar lix kox lox qir

国际音标：za²¹ li⁵⁵ k'o⁵⁵ lo⁵⁵ tɕi²¹

【别名】猪蹄叉、白鸡七。

【来源】为兰科植物白鸡 *Bletilla striata* (Thunb.) Reichb. f.，鳞茎入药。

【性味】味苦、涩，凉。

【功效】泻火败毒，敛创止血。

【主治】肺热咳血，咯血，胃肠道出血。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、胃溃疡：鸡心七 10g 枳壳 6g 川芎 6g 小蛇参 3g 香血藤 10g。水煎服。

2、外伤出血：鸡心七、天麻各等份研粉撒于患处，血即止。

3、心绞痛：蛇菰 15g 山慈菇 乌药 黄精子各 10g。水煎服。

【备考】1. 有止血用作。2. 对黏膜的保护作用。3. 有抗肿瘤及抗菌作用。

第九章 利水毒药

土家语名：泽毒利捏药

土家语拼音：cer duf lif niex yaof

国际音标：ts'e²¹ tu³⁵ li³⁵ ʒie⁵⁵ jau³⁵

凡具有疏通体内水道、驱赶体内毒邪功效，用于治疗水肿毒气病的药物称利水毒药。

土家医认为水毒邪气一是存在于自然界中水中，为毒邪污染纯净水后，成为一种水毒病邪；二是人体在功能活动中产生的带毒邪水不能正常排出，成为一种致病邪气，两者作用机体组织脏器而发病。其病理变化是水溢皮下膜外，局部肿胀，影响气化，使脏器功能失调。水毒病邪致病共有症状体征有：胀满、浮肿、头重、小便不利，舌胖大、有齿痕、脉沉实等。

利水毒药具有疏通人体水道，清除多余水分，驱赶毒邪多种功效，主要用于治疗水毒病。某些药物还兼有破积、利尿、通乳、消肿毒、解蛇毒、止咳、杀虫、排脓、散结、补益的功效，经配方后可用于治疗积聚、小便不通、乳汁不通、痈疖、毒蛇毒虫咬伤、咳嗽、虫积、体虚等病症。

常用利水毒药物有：肥猪头、九牛造、水斤子、猫眼草、鬼打伞、千根草、泡花树、钓鱼竿、羊耳草、搜山虎、铁扁担、水莲、水车前、木子树、红豆、岩荞麦、秋胡豆、黄瓜藤、双肾参、地黄连、通泉草。

1、肥猪头

土家语名：子是古图科巴

土家语拼音：ziv sif gux tur kox bax

国际音标：tsi⁵³ si³⁵ ku⁵⁵ t'u²¹ k'o⁵⁵ pa⁵⁵

【别名】牛大腕、地萝卜、牛大腕、商陸。

【来源】为商陸科植物地萝卜 *Phytolacca acinose* Roxb.，根入药。

【性味】苦、寒。

【功效】利水毒，止呕血。

【主治】全身水肿，膨胀，带下，呕血，黑便。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、中满症：商陆 槟榔 大腹皮 木通 泽泻各 9g 茯苓 赤小豆各 15g 姜皮 6g 椒目 3g。水煎服。也可用鲜商陆 60g 切片，用凉开水拌湿，捣烂绞汁服。

2、外伤出血：商陆干品研细粉，外敷伤口，或鲜商陆适量，捣烂敷患处。

【备注场行小毒。

【备考】1、化学成分：①垂序商陆根中含 3 种三萜皂苷：商陆皂苷 B、E 和 G，水解后均得商陆皂苷元，还含一种抗炎有效的三萜成分加利果酸，以及 3 种齐墩果酸衍生物、 α -菠菜甾醇及其苷，7-豆甾醇等。以及名叫商陆碱的生物碱或和降压成分组胺、 γ -氨基丁酸。②商陆根中含三萜皂苷及甾醇类化合物，也含有加利酸、商陆皂苷元以及一种三萜成分去羟加利果酸和混合的甾醇以及这两种醇的混合苷。

2、药理作用：①抗炎作用：垂序商陆根中的总皂苷部分商陆皂苷 E 以及从商陆根中分出的加利果酸对实验动物均有显著的抗炎作用。②祛痰作用：商陆根的皂苷元加利果酸和商陆皂苷元均有显著的祛痰作用。临床上商陆治疗老年慢性气管炎，获得一定的效果。③其他作用：镇痛、解热、肌肉松弛、抗副交感、抗利尿等方面的作用。④毒性：给小鼠灌服商陆根水浸剂、煎剂及酞剂，其半数致死量分别为 26、28、46.5g/kg；腹腔注射分别分 1.05、1.3 及 5.3g/kg。垂序商陆根中商陆皂苷 E 有微弱的溶血作用。

2、九牛造

土家语名：务给龙造

土家语拼音：wuf gex longr caof

国际音标：wu³⁵ ke⁵⁵ luŋ²¹ ts'au³⁵

【别名】土杜仲、扶芳藤、水斤子、续随子。

【来源】为大戟科植物九牛造 *Euphorbia hylonoma*. Hand. -Mazz，根或果实入药。

【性味】根：味辣、苦，性冷。果实：辛，温。

【功效】利水毒，消水肿，消积化瘀，散寒温阳。

【主治】大小便不通，水肿，膨胀、积聚，阳痿，关节痛，血瘀经闭，顽癣，痰赘。

【用量】根：6~10g。果实：1~3g。外用适量。

【应用经验】

1、积聚腹胀，胸膈不利：九牛造 3g（醋炙） 制朱砂七 6g 红石耳 12g 白芥子 10g。水煎服。

2、阳痿：九牛造（酒炙） 10g 蜻蜓 10g 雀脑 2 只。其研末为丸，酒送下。

3、水毒浮肿症：水斤子 30g 藤菜子 100g 花椒目 60g。共研细粉，加工蜜丸，每次 3g，每日一~二次。

【备注】有毒。

3、土狗

土家语名：若哈列

土家语拼音：rox hax lier

国际音标：zo⁵⁵ xa⁵⁵ lie²¹

【别名】翻田埂虫。

【来源】为螞蛄科动物螞蛄 *Gryllotapa africana* Palisot et Besurois 的虫体。

【性味】咸，寒。

【功效】利水通便，消肿散结。

【主治】水肿、经闭、小便不利、疮肿疮毒。

【用量】3~6g。

【应用经验】

1、水肿：土狗 15g 甘遂 6g。研末，每次服 1.5~3g。

2、尿闭：土狗 2 只，研末，黄酒或温开水送服。

【备注】场行小毒。

4、猫眼草

土家语名：莫糯布实克查

土家语拼音：mor lof bux sir ker car

国际音标：mo²¹ lo³⁵ pu⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】红奶浆草、乳浆大戟。

【来源】为大戟科植物乳浆大戟 *Euphorbia esula* L.，全草入药。

【性味】苦、寒。

【功效】利水毒，消肿，止痒。

【主治】四肢浮肿，小便不利，打摆子，疮癣。

【用量】内服6~10g，外用适量。

【备注】有毒。

5、鬼打伞

土家语名：树叶伞爹

土家语拼音：av yer sanv dev

国际音标：a⁵³ je²¹ san⁵³ te⁵³

【别名】烂手草、泽漆。

【来源】为大戟科植物泽漆 *Euphorbia helioscopia* L.，全草入药。

【性味】辛、苦，微寒。

【功效】利水毒，消膨胀。

【主治】全身浮肿，小便不利，膨胀。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、咳嗽喘逆、面目浮肿：猫儿草 法半夏 生姜各6g 紫菀 白前 茯苓各9g 甘草4.5g。水煎服。

2、肛痿：猫儿草研末，加上凡士林成膏状，外敷，可促进分泌物增加及溃疡愈合。

3、癣疮：鲜猫儿草捣汁外搽或煎水洗。

【备注】场行小毒。

【备考】1、化学成分：全草含黄酮类化合物，为槲皮素-3,5-二-D-半乳糖苷，

又含溶血性皂苷泽漆素、金丝桃甙、泽漆醇、泽漆内酯、 β -二氢岩藻甾醇、葡萄糖、果糖、麦芽糖钙、少量丁酸。

2、药理作用：①对结核杆菌有一定杀菌作用。其杀菌所需浓度（1:50-1:25）可供治疗颈淋巴结核时参考；泽漆对于鬻菸肼、抗对氨水核酸钠、抗链霉素的结核杆菌也有抑制作用，而未见交叉耐药性。②泽漆制剂给实验性发热的家兔灌胃有退热作用，而肌肉注射及静脉注射则不明显。③对离体及在体肠管有兴奋作用。④对动物因注射鸡蛋清所致的毛细血管渗透性升高，泽漆能使之降低。⑤泽漆中含有槲皮素-3, 5-双半乳糖甙及金丝桃苷，有较好的镇咳作用。⑥泽漆中含有 12-去氧大戟萜醇的酯对皮肤有刺激作用而引起炎症。

6、千根草

土家语名：鬻子实克查

土家语拼音：yif zix sir ker car

国际音标：ji³⁵ zi⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】小飞扬草、小乳汁草、鬻子草。

【来源】为大戟科植物千根草 *Euphorbia thymifolia* L.，全草入药。

【性味】酸、涩，凉。

【功效】利水毒，消肿化湿。

【主治】雷公症，热痢，热泻，乳痈，痔疮。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】雷公症（全身浮肿、头闷）：千根草 6g 鬼打伞 6g 车前草 10g 木子树根皮 10g。每日一剂，煎二次服。

7、泡花树

土家语名：泡卡普卡蒙

土家语拼音：paox kax pux kar mongr

国际音标：p'au⁵⁵ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵ k'a²¹ muŋ²¹

【别名】大皮子药、细花毛栾树。

【来源】为清风藤科植物泡花树 *Meliosma cuneifolia* Franch，根皮入药。

【性味】甘、微辛，平。

【功效】利水毒，消肿痛。

【主治】水肿，腹水，痈疔肿毒，毒蛇咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

8 钓鱼竿杆

土家语名：宋钓竿

土家语拼音：songf diaof ganx

国际音标：suŋ³⁵ tiau³⁵ kan⁵⁵

【别名】腹水草。

【来源】为玄参科植物宽叶腹水草 *Voronicastrum latifolium* (Hems1.) ramazaki，全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】利水毒，消肿止咳。

【主治】鼓胀，水肿，淋病，水咳，毒蛇咬伤。

【用量】内服 10~15g，外用适量。

【应用经验】

- 1、中板症早期（肝硬化腹水）：钓鱼杆 30g 救命粮根 20g 铁筷子根 10g 红旱 5g 黄玉竹 20g 牛血莲 10g 地耳草 10g 红枣 20g。水煎，两天服一剂。
- 2、脱肛：钓鱼杆 15g 马鞭草 15g 十大功劳叶 10g 白三七 10g。共研细末，日服三次，每次 6g。
- 3、内、外痔：鲜钓鱼杆 60~120g，水煎，分两次服。

9、羊耳草

土家语名：若恩且实克查

土家语拼音：rof enr qief sir ker car

国际音标：zo³⁵ en²¹ tɕ³⁵ ie³⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】赤泽泻、窄叶泽泻、大箭。

【来源】为泽泻科植物大箭 *Alisma canaliculatum* A.Br. et Bouche.，根入药。

【性味】淡、微辛，平。

【功效】利水毒，驱蛇毒，消疹。

【主治】水肿，小便不通，皮肤疮疹，蛇咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、小便不通：大箭 木通 车前草 海金沙各 10g。水煎服。

2、蛇咬伤：大箭 乌敛莓根 降龙草 八角莲 黄荆叶各适量捣烂外敷。

【备考】对金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、大肠杆菌、炭疽杆菌、白喉杆菌、绿脓杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌等均有抑制作用。

10、搜山虎

土家语名：搜山利

土家语拼音：soux sanx lif

国际音标：səu⁵⁵ san⁵⁵ li³⁵

【别名】下山虎、土知母、蛤蟆七。

【来源】为鸢尾科植物鸢尾 *Iris tectorum* Maxim，根茎入药。

【性味】苦、辛，微寒。

【功效】利水毒，消积破瘀。

【主治】臌胀，食滞，跌打损伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、食积饱胀：搜山虎 3g，研细，开水或兑酒吞服。

2、咽喉肿痛：搜山虎 12g 玄参 连翘 山豆根 射干各 9g 桔梗 马勃 薄荷各 6g。水煎服。

3、跌打损伤：搜山虎研末，每次 3g，温开水吞服。

【备注】场行小毒。

【备考】1、化学成分：含鸢尾黄酮苷、鸢尾黄酮新苷 A 及 B、香荚兰己醇二葡萄糖苷。此外，尚含少量脂肪油。叶含维生素 C。

2、药理作用：鸢尾对透明质酸酶引起的大鼠足浮肿和巴豆油引起的炎性渗

出和增生均有明显的抑制作用。

11、铁扁担

土家语名：写扁担

土家语拼音：xiev bianx darn

国际音标：ɕie⁵³ pian⁵⁵ tan²¹

【别名】蝴蝶花、扁竹根。

【来源】为鸢尾科植物蝴蝶花 *Iris japonica* Thunb, 根入药

【性味】苦、辛，寒。

【功效】利水毒，破积消胀。

【主治】膨胀（肝脾肿大），胃痛。

【用量】6~10g。

【备注】场行小毒。

12、野鸭肉

土家语名：抗苦酒石

土家语拼音：kanr kux sav sir

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ sa⁵³ si²¹

【别名】大麻鸭、掏出鸭。

【来源】为鸭科动物掏出鸭 *Anas platyrhynchos* L, 肉入药。

【性味】咸，凉。

【功效】利水毒，和肚气。

【主治】水气浮肿，热毒疮疖，纳差。

【用量】两天一只炖服。

13、水莲

土家语名：泽莲

土家语拼音：cer lianr

国际音标：ts'e²¹ lian²¹

【别名】大浮萍。

【来源】为天南科植物水浮莲 *Pistia stratiotes* L.，全草入药。

【性味】辛，寒。

【功效】利水毒，消肿止痒。

【主治】水肿，荨麻疹，丹毒，小便不利，跌打损伤，无名肿毒。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、血热身痒：水莲 银花藤各 250g 地稔 120g 过塘蛇 250g 土荆芥 120g 樟树叶 90g。均用鲜品，煎水洗。

2、团成症：水莲 胡麻 皂角刺 白蒺藜 海桐皮各 4~15g。水煎服。

14、水车前

土家语名：泽车前

土家语拼音：cer cex qianr

国际音标：ts'e²¹ ts'e⁵⁵ tɕian²¹

【别名】龙舌草。

【来源】为水鳖科植物水车前 *Ottelia alismoides* (L.)Pers.，全草入药。

【性味】甘、淡，微寒。

【功效】解毒利尿，清热化痰。

【主治】水肿，肺热咳嗽，咳血，哮喘，烫火伤，痈肿。

【用量】10~30g。

【应用经验】

1、水肿：水车前 石菖蒲 通花根各 15g。水煎服。

2、烫火伤：水车前 9g 冰片 3g。研末，加麻油调敷患处。

15、木子树

土家语名：木油卡蒙

土家语拼音：muf your kar mongr

国际音标：mu³⁵ jəu²¹ k'a²¹ muŋ²¹

【别名】木油树、枯雀。

【来源】为大戟科植物乌柏 *Sapium sebiferum*(L.) *Roxb.*，根、皮和叶入药。

【性味】苦，微温。

【功效】逐水毒，驱蛇毒杀虫毒。

【主治】中板症（膨胀），大小便不利，毒蛇咬伤，疔疮，乳痈，湿疹等。

【用量】汤剂内服 6~10g，外洗 10~30g。

【应用经验】

1、蛔虫病：木子树根皮 30g 伸伸筋草 15g 鲜贯众 15g。水煎服。

2、疥癣、皮炎、湿疹、妇女阴痒：木子树叶适量，煎水洗。

【备注】有小毒。

【备考】1、化学成分：根皮含花椒油素、甾醇、脂肪、树胶、糖、无机盐等。

叶含异槲皮苷（为黄酮苷类）、鞣质、乌柏苦味质、酚类、氨基酸。

2、药理作用：①有较强的泻下作用，能迅速导泻。②叶煎剂在体外可明显抑制钩端螺旋体生长。③对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌和绿脓杆菌有抑制作用。④根皮所含花椒素有杀死肠虫的功效。

16、红豆

土家语名：面姐弃布里

土家语拼音：mianx jiex qif buf lix

国际音标：mian⁵⁵ tɕie⁵⁵ tɕi³⁵ pu³⁵ li⁵⁵

【别名】饭豆。

【来源】为豆科植物赤豆 *Phaseolus angularis* Wight. 及赤小豆 *P. calcaratus* *Roxb.* 和种子。

【性味】甘、酸，平。

【功效】利水毒，消肿排脓。

【主治】水湿浮肿，脚气病，泻痢，小便不利及痈疽疮疥。

【用量】内服 10~30g，外用适量。

17、岩荞麦

土家语名：阿青麦

土家语拼音：ar qinx mer

国际音标：a²¹ tɕin⁵⁵ me²¹

【别名】头花蓼。

【来源】为蓼科植物头花蓼 *Polygonum capitatum* Buch.-Ham, ex D. Don, 全草入药。

【性味】苦、辛，温。

【功效】利尿排毒，散瘀通淋。

【主治】浮肿症，尿急症，尿石症，风湿痛，跌打损伤，疮疡，湿疹。

【用量】10~15g。

【备考】有抗感染、解热作用。

18、黄瓜藤

土家语名：王瓜二拉

土家语拼音：wanr guar ef lax

国际音标：wan²¹ kua²¹ e³⁵ la⁵⁵

【别名】王瓜藤。

【来源】为葫芦科植物黄瓜 *Cucumis sativus* L.，藤茎入药。

【性味】苦，寒。

【功效】利水解毒，止痢止咳。

【主治】全身浮肿，水气湿热下痢，咳嗽，疮痈肿毒。

【用量】10~30g。

【备考】有降压、降胆固醇作用。

19、通泉草

土家语名：通泉实克查

土家语拼音：tongx qianr sir ker car

国际音标：t'uj⁵⁵ tɕian²¹ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】野田菜、虎仔草、脓疮药。

【来源】为玄参科植物通泉草 *Mazus japonicus* (Thunb.) O.Ktze.，全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】利尿排毒，消肿止痛。

【主治】水肿，消化不良，痈疽肿毒，风湿性关节炎。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、痈疽疮肿：乳腺草，研细，冷水调敷，每日一换。
- 2、热毒疮肿、乳痛：乳腺草适量，捣烂外敷或乳腺草 30g 橘叶 12g 生甘草 6g 一把伞 30g。水煎服。
- 3、火、烫伤：鲜乳腺草，捣绞汁。用净棉花蘸渍患处，频渍抹效速。

20、牵牛子

土家语名：务司布利

土家语拼音：wuf six buf lif

国际音标：wu³⁵ si⁵⁵ pu³⁵ li⁵⁵

【别名】黑丑、白丑、二丑。

【来源】为旋花科植物牵牛 *Pharbitis hederacea* Choisy 和圆叶牵牛 *P. purpurea*(L.) Voigt 的种子。

【性味】苦，寒。

【功效】逐水毒，消积杀虫，消肿。

【主治】尪肿症（肾炎水肿）、喘满、臌胀、二便不通、食积虫积、痰饮、脚气、中板症（肝硬化腹水）。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、水肿喘满、臌胀、二便不通：牵牛子 3~9g，研末，生姜汤送服。
- 2、虫积：牵牛子（炒）15g 槟榔 6g。共研末，每服 3g，紫苏汤送服。

【备注】有毒。

【备考】1、化学成分：牵牛子含牵牛子苷、脂肪油和树脂状物质、色素及有机酸。牵牛子苷是树脂苷、由牵牛子酸 A、B、C、D 所组成，它们是伊波罗酸的低聚糖甙。

2、药理作用：①泻下作用：种子的乙醇或水浸液 1.5~3g/kg灌胃，对于小鼠有泻下作用，但煎剂则失去致泻能力。②对平滑肌的作用：所含树脂在 0.2%浓度对家兔离体肠管及子宫均有兴奋作用。③驱虫作用：在体外实验，黑丑、白丑、对猪蛔虫的活动有轻度的抑制作用

21、山扁豆

土家语名：抗苦扁豆

土家语拼音：kanr kux bianx douf

国际音标：k²¹ an²¹ k⁵⁵ u⁵⁵ pian⁵⁵ tou³⁵

【别名】磕睡草、鸡毛箭、砂子草、水皂角、羞草决明。

【来源】为豆科植物含羞草决明 *Cassia mimosoides* L.，全草入药。

【性味】微苦，凉。

【功效】利尿排毒，通淋止痢。

【主治】湿热黄疸，痢疾，淋症，小儿疳积。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】二便不通、水肿：山扁豆子 10g 土大黄 6g 车前仁 10g 大通条 6g。每日一剂，水煎二次服。

22、大通草

土家语名：通草此巴

土家语拼音：tongx coax cix bax

国际音标：t⁵⁵ uŋ⁵⁵ ts⁵⁵ au⁵⁵ ts⁵⁵ i⁵⁵ pa⁵⁵

【别名】通条根。

【来源】为五加科植物通脱木 *Tetrapanax papyriferus* (Hook.) K. Koch. 的茎髓及根。

【性味】甘、淡，寒。

【功效】利尿毒，通乳汁。

【主治】小便不利、奔肿症、乳汁不通。

【用量】3~6g。

【应用经验】

1、产后乳汁稀少或乳汁不通：大通叶 15g 黄芪 15g 当归 12g 甲珠 9g。煎水取汁，炒米酒吃。

2、奔肿症（急性肾炎）：大通草 6g 茯苓皮 12g 大腹皮 9g。水煎服。

【备考】1、化学成分：茎髓含肌醇即环以六醇、多聚糖、维生素等。

第十章 排肠毒药

土家语名：被拉毒解业药

土家语拼音：bif lax duf gaix nier yaof

国际音标：pi³⁵ la⁵⁵ tu³⁵ kai⁵⁵ nie²¹ jau³⁵

凡具有排除肠内粪便、驱赶肠内毒邪功效，用于治疗肠毒邪病的药物称排肠毒药，又称排粪毒药。

土家医认为大肠是排除食物残渣和毒物的管道，一旦排废功能下降，过久停于肠道，易产生毒邪或毒物。毒气侵犯大肠，形成肠毒气病。其病理变化是肠道气机失调，肠道内肿胀，功能紊乱，运输食物功能下降，重者到全身。肠毒气病共有症状和体征有：腹痛、腹胀、腹泻、便血、**粘液**便、大便干结、里急后重，可伴有发热、四节痛、消瘦，舌胖、苔黄或黄腻，脉弦滑或滑数。

排肠毒药主要有清除肠内粪便，驱赶肠内毒物、毒气、修复肠膜，改善肠功能、缓解胀痛症状功效，主要用于治疗肠毒气病。某些药物还兼有、杀虫、散结、活血、消肿、通经的功效，经配方用于治疗虫毒病、痈疖、跌打损伤、闭经等。

常用治肠毒毒药物有：土大黄、地花椒、羊角豆、血丝大黄、朱砂莲、酸筒根、下搜山、通条根等。

1、土大黄

土家语名：土大黄

土家语拼音：tux daf **huanr**

国际音标：t'u⁵⁵ ta³⁵ xuan²¹

【别名】牛耳大黄、金不换。

【来源】为蓼科植物尼泊尔酸模 *Rumex nepalensis* Spr. 和齿果酸模 *R. dentatus* L. 巴天酸模 *R. patientia* L. 的根，根茎。

【性味】苦、酸，寒。

【功效】通便排毒，杀虫，止血。

【主治】瘟黄重症，痢疾，便秘，皮肤病，疥癣，各种出血，烧伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、鬼打青症（血小板减少性紫癜）：牛耳大黄根 15g 紫草 10g 红枣 30g。水煎服。

2、顽癣、肿毒：牛耳大黄根加醋磨汁，外涂患处。

3、红眼（急性结膜炎）、便秘：牛耳大黄根 15~30g，水煎服。重症加玄明粉 3-6g 冲服。

【备考】1、化学成分：根含大黄酚、大黄素、大黄素甲醚。此外，尚含有机酸、

鞣质、糖类、**粘液质**、淀粉、色素、树脂及草酸钙。叶含槲皮苷。

2、药理作用：①根酞剂对 17 株致病性真菌，均有明显抑制作用；大黄素对小鼠黑色素瘤有抑制作用，对艾氏腹水癌细胞呼吸有抑制作用；大黄酸、大黄素、大黄酚在体外对甲型链球菌、肺炎球菌、流感杆菌及卡他球菌有不同程度的抑制作用。②用美兰试管法及细胞呼吸器法证明，羊蹄对急性单核细胞型及急性粒细胞型的白血病细胞有抑制作用。③大黄酚能缩短血液凝固时间而有止血作用。

2、地花椒

土家语名：里提花椒

土家语拼音：lix tir fax **jiaox**

国际音标：li⁵⁵ t'i²¹ xua⁵⁵ tɕi⁵⁵au⁵⁵

【别名】豆瓣草。

【来源】为小二仙草科植物豆瓣草 *Haloragis micrantha* R. Br.，全草入药。

【性味】辛、苦，凉。

【功效】排毒通便，调经活血。

【主治】二便不通，热淋，痢疾，月经不调，跌打损伤，烫伤，毒蛇咬伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】粪毒病大便不通症：地花椒 10g 大通条根 6g 羊角豆子 10g 的横根 6g 九牛胆 6g。每日一剂二次服。

【备考】对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

3、羊角豆

土家语名：若克弃布里

土家语拼音：rof **kex qif buf** lix

国际音标：zo³⁵ k'e⁵⁵ tɕi³⁵ pu³⁵ li⁵⁵

【别名】望江南。

【来源】为豆科植物望江南 *Cassia occidentalis* L.，种子或全草入药。

【性味】甘、苦，凉。

【功效】排毒散结，润肠。

【主治】客氛中痛，目赤肿痛，下痢腹痛，习惯性便秘，消化不良，肺痈。

【用量】10~30g。

【应用经验】

1、瘟黄症：羊角豆 金钱草各 12g 白茅根 15g。水煎服。

2、痢疾腹痛、慢性便秘：羊角豆 15-30g，水煎服。

【备注】种子有明显的毒性，对肝、肾有损害。

【备考】1、化学成分：根及种子含大黄素、柯桎素、毒蛋白、鞣质、粘液汁、挥发油、脂肪。近期报导，含有山扁豆毒为 1,7-二羟基-5-甲氧羰基-3-甲基-氧杂蒽酮。

2、药理作用：①种子含大黄素，有致泻作用。②全草对金黄色葡萄球菌、甲、乙、丙型溶血性链球菌、肺炎双球菌、卡他球菌及炭疽、白喉等杆菌均有抑制作用。③根煎剂有改善消化、消除痉挛，并有驱虫作用。④种子因含毒蛋白表现明显的毒性，且具有抗原性质，狗可以得到免疫；种子的苯提取液含有毒蛋白及柯桎素，对动物的肝、肾有损害作用。

[附注] 羊角豆的茎、叶亦入药，性味：苦、寒，具有肃肺、清肝胃、消肿解毒作用。用于咳嗽、哮喘、脘腹疼痛、便秘、头痛、目赤、疔疮肿毒、蛇咬伤等症。

4、血丝大黄

土家语名：灭丝大黄

土家语拼音：miev six daf huanr

国际音标：mie⁵⁵ si⁵⁵ ta³⁵ xuan²¹

【别名】金不换、，红筋大黄。

【来源】为蓼科植物土大黄 *Rumex madai*o Makino，根入药。

【性味】苦、辛，寒。

【功效】解毒通便，散瘀止痛，杀虫。

【主治】大便秘结，咯血，衄血，内出血，外伤出血，烧伤，猴耳疮，跌打损伤，癍疮。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、凡外伤所致的血肿青紫疼痛、关节及筋骨挫伤：血丝大黄 20g 三百棒 10g，散血丹 10g 铁箍散 10g 冷水丹 15g。共研末，酒、蜜各半调敷患处。
- 2、汤火烫伤：血丝大黄粉末加少许冰片，用香油调敷患处。
- 3、疔疮肿痛：血丝大黄、地苦胆各等量研成细粉，用醋调敷患处。

【备考】1、化学成分：根含蒽醌类衍生物大黄酚、大黄素甲醚、大黄素以及大黄酸样物质 I 及 II。

2、药理作用：本品煎剂可使小白鼠凝血时间缩短，并能使血管收缩、通透性降低。

【备全靠】可使凝血时间缩短，能收缩血管，降低通透性。

第十一章 攻恶毒药

土家语名：恶毒攻业药

土家语拼音：wof duf gongx nier yaof

国际音标：wo³⁵ tu³⁵ kuŋ⁵⁵ nie²¹ jau³⁵

凡具有消除体内恶气，驱赶体内恶毒的功效，用于治疗恶疮、恶肿、恶血等肿瘤的药物称攻恶毒药。

土家医认为恶毒病邪是体内肌肉脏器受到损伤，发生病变长期不愈，变生生毒，恶气滋生，形成恶肿，影响气、血、精、神的正常活动，开始出现气滞、血瘀、痰淤、水积，后期出现气虚、血虚、津亏、神伤等病理变化。恶毒病因病邪种类不同，病位不同、程度不同、体质不同，临床症状及体征也不同，共有症状有：肿、胀、痛、身体消瘦；体征有：舌红绛、苔黄浊或舌质淡、苔白，脉滑涩，或细弱。

攻恶毒药物具有消除体内恶气，驱赶体内癌毒功效，用于治疗各种癌肿病症。但某些治恶毒药还兼有清热、泻火、消肿、利水、活血、散痰、解蛇毒功效，经配方用于治疗热病、火症、水肿症、血瘀病、痰症、毒蛇咬伤症等。某些药物还有一定的毒性，过量易中毒。

常用治恶毒药物有：红鬼笔、粗榧叶、九节茶、漆姑草、石龙芮、八角连、苦痧药、烙铁头、白毛藤、白花蛇舌草、半边莲、铁灯苔、黄药子、独角、癞蛤蟆、牛屎虫、天龙、石龙子、一口印、红桐、白屈菜、金刚藤、野辣椒、碎米亚、

藤贝母、三匹风等。

1、红鬼笔

土家语名：免姐树叶笔

土家语拼音：mianx jiex av ye bif

国际音标：mian⁵⁵ tɕie⁵⁵ a⁵³ je²¹ pi³⁵

【别名】狗吊菌。

【来源】为鬼笔科红鬼笔 *Phallus rubicundus* (Boss) Fr.，子实入药。

【性味】甘、涩，平。

【功效】攻毒消肿。

【主治】恶疮（血管瘤）。

【用量】3~6g。

【应用经验】恶疮（血管痛）：红鬼笔适量研细粉，食醋调，涂患处，每日一次。

2、粗榧子

土家语名：出嘎拉榧子

土家语拼音：cur gar lax huix zix

国际音标：ts'u²¹ ka²¹ la⁵⁵ xui⁵⁵ tsi⁵⁵

【别名】土香榧。

【来源】为三尖杉科土香榧 *Cephalotaxus oliveri* Mast.，树皮及枝叶入药。

【性味】枝、叶、皮：苦、涩，平。种子：甘、涩，平。

【功效】攻恶毒，拒肿块。

【主治】恶肿，恶疮，恶性肿瘤，梅疮等。

【用量】10~15g。

【应用经验】

1、肺燥咳嗽：粗榧种子 白血皮菜 石枣子 肺筋草 猪鬃草 麦冬 淫羊藿
各 9g。水煎服。

2、咽喉肿痛：粗榧种子 三匹风 桂花根 射干各 9g 地苦胆 3g。水煎服。

3、长虫症、痒昆虫症、盘肚虫症（蛔虫病、蛲虫病、绦虫病）：粗榧种子 槟榔各等份。为末，每服 9g。

【备考】果实有消食杀虫功效。

3、九节茶

土家语名：给梯科保旦阿古

土家语拼音：gex tix kox lox raf gux

国际音标：ke⁵⁵ t·i⁵⁵ k'o⁵⁵ lo⁵⁵ za³⁵ ku⁵⁵

【别名】九节花、草珊瑚。

【来源】为金粟兰科草珊瑚 *Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai，全草入药。

【性味】辛、苦，微寒。

【功效】攻毒抗癌。

【主治】肺、胃、肝、肠癌。

【用量】10~30g。

【应用经验】

1、着凉、头痛、咳嗽、咽痛：九节茶 10g 荆芥 5g 薄荷 10g 柴胡 10g 苏梗 10g。水煎服，一日二次。

2、风湿痹痛、肢体麻木：九节茶 灵仙各 15g 寻骨风 伸筋草 香血藤各 9g。水煎服或泡酒服。

【备考】1、化学成分：含延胡索酸、琥珀酸、挥发油，并有鞣质、香豆酮、黄酮苷等反应。

2、药理作用：①本品有广谱抗菌作用，对金黄色葡萄球菌、志贺氏痢疾杆菌均极敏感；对金黄色葡萄球菌耐药株、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌甲型为高敏；对大肠杆菌、绿脓杆菌有一定作用。有效成分为琥珀酸，反式丁烯二酸。②临床证明对胰腺癌、胃癌、直肠癌和食道癌等有较好疗效，能缩小肿块，改善自觉症状，延长缓解期及减少晚期性肿瘤引起的并发症。③大剂量对离体蛙心有一定抑制作用，但恢复快；家兔静脉注射，大剂量可产生短暂降压作用。④动物试验证明有镇咳、祛痰及平喘作用。

4、漆姑草

土家语名：窝阿实玉拉实查查

土家语拼音：wov ar sir yif lax sir ker car

国际音标：wo⁵³ a²¹ si²¹ ji³⁵ la⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】白花蛇舌草、蛇牙草、大龙叶。

【来源】为石竹科漆姑草 *Sagina japonica* (Sw.) Ohwi, 全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】散结消肿，解毒止痒。

【主治】恶血病，瘰疬，漆疮，痈肿。

【用量】10~30g。

【应用经验】

- 1、瘟黄症：白花蛇舌草 金钱草各 30g 茵陈 栀子 甘草各 10g。水煎服。
- 2、各种癌肿症：白花蛇舌草 60g 半支莲 30g 白茅根 75g 薏苡仁 30g。水煎服。
- 3、漆疮：漆姑草鲜全草捣汁，外敷患处，每天二次，或鲜全草捣烂，加丝瓜叶汁，调菜油外敷。
- 4、瓜藤丸（淋巴结核）：鲜漆姑草 鲜虎耳草各适量，捣烂外敷患处，二天换药一次。
- 5、毒蛇咬伤：鲜漆姑草 30g 捣烂，加雄黄 6g，调匀外敷，另用鲜漆姑草 30g，捣烂绞汁内服；也可配方泡酒服，作预防用。

【备考】1、化学成分：全草含黄酮类化合物，6,8-二 C-葡萄糖基芹黄素、6-C-葡萄糖芹黄素、8-C-葡萄糖基芹黄素、X'-O-鼠李糖-6-C-葡萄糖基芹黄素。

2、药理作用：①漆姑草对小鼠 S180、S37、U14 及 L617 有显著的抗癌作用。②漆姑草有明显的镇咳、祛痰作用，并有一定的镇痛作用。③漆姑草对家兔离体及在体大小肠均有兴奋作用，阿托品和肾上腺素可对抗其兴奋作用。

5、石龙芮

土家语名：石龙芮

土家语拼音：sir longr nuix

国际音标：si²¹ luŋ²¹ zui⁵⁵

【别名】水堇。

【来源】为毛茛科植物石龙芮 *Ranunculus sceleratus* L.，全草入药。

【性味】苦，热。

【功效】攻拔恶毒，消肿散结，截疟。

【主治】各类癌肿，瘰疬，痈疔，疟疾，穷骨疮。

【用量】6~10g。

【应用经验】阴毒恶露带下症（宫颈癌）：石龙芮 15g 白毛藤 30g 野辣子草 15g 蛇舌草 30g 红鬼笔 6g 白屈菜 10g 百全条皮 10g。每日一剂，水煎二次服。

【备注场行小毒。

6、八角莲

土家语名：叶各莲

土家语拼音：yer gor lianr

国际音标：je²¹ ko²¹ lian²¹

【别名】八卦连、独叶一支花、荷花莲、叶下花。

【来源】为小檗科植物八角莲 *Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng，块茎入药。

【性味】辛、苦，凉。

【功效】攻毒散结，消肿止痛。

【主治】鼻咽癌，乳腺癌，毒蛇咬伤，痈疮疔痛，丸子肿痛。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、劳伤腰痛：八角莲 20g 蛇尾七 30g 扣子七 10g 血三七 10g 红毛五加皮 10g。泡酒服。日服三次，每次服 20ml。

2、咽喉肿痛、咳嗽痰多：乌云伞 6g 地苦胆 6g。共研细末，日服三次，每次服 1g。

3、虫蛇咬伤、狗咬伤：乌云伞 6g 七叶一枝花 6g 小蛇参 9g 雄黄连 9g 地蜂子 6g。水煎服，用渣外敷患处。注：孕妇忌用。

【备注场行小毒。

7、野百合

土家语名：青苦里

土家语拼音：qinx kux lix

国际音标：tɕin⁵⁵ k'u⁵⁵ li⁵⁵

【别名】花生子草、农吉利。

【来源】为豆科植物野百合 *Crotalaria sessiliflora* L.，全草入药。

【性味】甘，寒。

【功效】攻毒抗癌。

【主治】皮肤癌，食道癌，宫颈癌，疔疮。

【用量】6~10g。

【应用经验】风寒人地：法半夏 陈皮各 9g 白瓦 橘红各 15g。水煎服。

【备注场行小毒。

8、蛋不老

土家语名：蛋不老

土家语拼音：danf bur laox

国际音标：tan³⁵ pu²¹ lau⁵⁵

【别名】仁砂草、地胡椒、地构皮。

【来源】为大戟科植物华南地构叶 *Speranskia cantonensis* (Hance) Pax et Hoffm.，全草入药。

【性味】苦，平。

【功效】攻毒削坚，散结平疮

【主治】腹内肿瘤，丸子肿大，疮疡，毒肿。

【用量】10~15g

9、四方刀

土家语名：四方托托

土家语拼音：sif huanx tor tor

国际音标: si³⁵ xuan⁵⁵ t'o²¹ t'o²¹

【别名】鬼见羽、八树。

【来源】为卫矛科植物鬼见羽 *Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb., 嫩枝入药。

【性味】苦、寒。

【功效】攻恶毒肿，除邪杀蛊。

【主治】恶肿，狂犬伤，崩漏。

【用量】10~15g。

【应用经验】

- 1、月经不调、产**后瘀**血腹痛：八树、当归各 10g 益母草 12g。水煎服。
- 2、跌打损伤、**瘀**血肿痛：八树 30g 赤芍 15g 红花 桃仁各 10g 大黄 3g。研末吞服。
- 3、漆疮：八树适量或加白果叶等量煎水洗。

10、指甲花

土家语名：借从菜卡普

土家语拼音：jief Congr caif kax pux

国际音标：tɕie³⁵ ts'un²¹ ts'ai⁵⁵ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】凤仙花、急性子。

【来源】为凤仙花科植物指甲花 *Impatiens balsamina* L., 种子入药。

【性味】酸、微苦，温。

【功效】攻毒开喉，活血止痛。

【主治】隔食症，肿块积聚，闭经，难产，**骨鲠**咽喉。

【用量】6~10g。

【应用经验】隔食症：指甲花子 10g **半支莲** 30g 天龙 6g 石贝穿 30g 干蟾皮 10g 蛇莓 10g 野辣子草 烂心木 20g。每日一剂，水煎二次服。

【备注**场行**小毒。

11、小五爪风

土家语名：被亏五爪风

土家语拼音：bif kuix wux zaox hongx

国际音标：pi³⁵ k'ui⁵⁵ wu⁵⁵ tsau⁵⁵ xuŋ⁵⁵

【来源】为葡萄科毛叶崖爬藤 *Tetrastigma obtectum* (Wall.)

Planch. var. *pilosum* Gagnep., 藤茎入药。

【性味】辛，凉。

【功效】散结消瘤，祛风活血。

【主治】癌瘤，风湿麻木，跌打损伤，疮疖。

【用量】内服 3~60g，外用适量。

【备考】懈的忌服。

12、头红袍

土家语名：兰八

土家语拼音：lanr bar

国际音标：lan²¹ pa²¹

【别名】臭牡丹、野牡丹、八宝莲。

【来源】为马鞭科植物臭牡丹 *Clerodendrum bungei* Steud., 根皮入药。

【性味】甘、辛，温。

【功效】攻毒散瘀，祛风利湿。

【主治】恶血病，头晕目眩，脱肛，吊茄子，风湿关节痛，眩晕，肺痈等。

【用量】10~15g。

【应用经验】弱热症（慢性淋巴瘤病）：头红袍根 30g 雷旦子 10g 铁灯台 10g 白毛藤 30g 石贝穿 20g 神花 10g。每日一剂，水煎二次服。

13、半枝莲

土家语名：半枝莲

土家语拼音：banf zix lianr

国际音标：pan³⁵ tsi⁵⁵ lian²¹

【别名】歪凡在、并头草、再生草。

【来源】为叫做科植物半枝莲 *Scutellariid barbata* D. Don., 全草入药。

【性味】辛、微苦，凉。

【功效】抗癌消瘤，消肿止痛。

【主治】肿瘤，胃瘕，瘟黄症，毒蛇咬伤。

【用量】内服 10~30g，外用适量。

【应用经验】胃癌症：半支莲 30g 白萸 30g 龙葵 15g 石贝穿 15g 苦痧药 15g 石龙子 3g 一口卵 3g。每日一剂，水煎二次服。

【备考】具有抗癌、抑菌和免疫调节作用。

14、苦痧药

土家语名：苦痧药

土家语拼音：kux sax yaor

国际音标：k'u⁵⁵ sa⁵⁵ jau²¹

【别名】内析香茶菜。

【来源】为叫做科内折香茶菜 *Isodon inflexus* (Thuhb.) Kud., 全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】抗癌止痛，止泻止痢。

【主治】胃癌，痢疾，腹泻。

【用量】10~15g。

【应用经验】

1、瘟黄症（急性黄疸型肝炎）：岩藿香 15g 半边莲 90g 车前草 30g。水煎服。

2、毒蛇咬伤：岩藿香适量，捣烂敷患处。

【备考】药理作用：1、香茶菜甲素能使四氯化碳所致的大、小鼠实验性肝损伤减轻，使血清 GPT 明显下降，肝内甘油三酯蓄积量减少，促进变性的和坏死的肝细胞修复，并有提高正常小鼠非特异性免疫功能的作用。2、香茶菜甲素对 QGY-7703、CaFs-17、Hela 细胞具有明显的杀灭作用。3、香茶菜甲素对金黄色葡萄球菌有较强的杀伤作用。

15、烙铁头

土家语名：烙铁科巴

土家语拼音：lor tiex kuor bax

国际音标：lo²¹ t'ie⁵⁵ k'uo⁵⁵ pa⁵⁵

【别名】柄叶香茶菜。

【来源】为叫做科植物柄叶香茶菜 *Isodon phyllopodus* (Diels) kudo, 全草入药。

【性味】微苦，凉。

【功效】攻毒化癌，散瘀止痛。

【主治】恶血病，肠癌，火痢，筋骨酸痛。

【用量】10~15g。

【应用经验】恶血症：烙铁头 15g 黄瓜香 30g 白屈菜 15g 碎米桠 30g 地松 10g 红茵皮 15g。每日一剂，水煎二次服。

16、白毛藤

土家语名：是嘎阿实二拉

土家语拼音：sif gaf ar sir ef lax

国际音标：si³⁵ ka⁵⁵ a²¹ si²¹ e³⁵ la⁵⁵

【别名】野酱果、白英、烂心藤。

【来源】为茄科植物白英 *Solanum lyratum* Thunb., 全草或根入药。

【性味】苦，微寒。

【功效】攻毒消肿，抗癌退黄。

【主治】藤叶治各种癌肿，黄疸；根治风湿关节炎。

【用量】10~30g

【应用经验】

- 1、白痢：毛和尚 30g 鸭跖草 60g。水煎服。
- 2、瘟黄症：毛和尚 金钱草 三百棒 茵陈 车前草各等量。水煎服。
- 3、红白带下：毛和尚 25g 一把伞 三百棒各 20g 锦鸡儿 30g。水煎服。

【备注场行小毒。

【备考】1、化学成分：茎皮和果实含龙葵碱（Sloannine）。果皮含色素花青苷元。

2、药理作用：①抗肿瘤作用：临床上对肺癌有抗癌作用。②对机体防御功能的作用：与红枣能促进机体的抗体形成，促进血清蛋白，尤其是 γ -球蛋白的合成。

17、白花蛇舌草

土家语名：窝阿实玉拉实克查

土家语拼音：wov ar sir yif lax sir ker car

国际音标：wo⁵³ a²¹ si²¹ ji³⁵ la⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】蛇舌草。

【来源】为茜草科植物白花蛇舌草 *Hedyotis diffusa* Willd.，全草入药。

【性味】甘、淡，凉。

【功效】攻毒消热，活血利尿。

【主治】恶性肿瘤，肠痛，黄疸，毒蛇咬伤，疮疖肿痛。

【用量】内服 10~30g，外用适量。

18、猪殃殃

克欵被亏实克查

土家语拼音：keif bif kuix sir ker car

国际音标：kei³⁵ pi³⁵ kui⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】小锯子草。

【来源】为茜草科植物猪殃殃 *Galium apdrine* Lvar *tenerun* L.，全草入药。

【性味】甘、淡、凉。

【功效】攻毒清热，利尿消肿。

【主治】癌肿，恶血病，肠痛，水肿，白带。

【用量】10~30g

19、铁灯苔

土家语名：写灯台

土家语拼音：xiev denx tair

国际音标：ɕie⁵³ ten⁵⁵ t'ai²¹

【别名】七叶一支花、蚤休。

【来源】为百合科植物七叶一支花 *Paris polyphylla* Sm., 块茎入药。

【性味】苦，凉。

【功效】攻毒散结，熄风定惊。

【主治】中上元癌肿，丸子重大（瘰疬），喉痹，毒蛇咬伤，小儿惊风。

【用量】内服 6~15g，外用适量。

【应用经验】小儿慢凉风症：白甘遂 3g 炒焦 七叶一枝花 3g。共研末，薄荷汤送下。

【备考】具有抗菌、抗肿瘤作用，杀精子和收缩子宫的作用。

20、黄药子

土家语名：黄药子

土家语拼音：huanr yaor zir

国际音标：xuan²¹ jau²¹ tsi²¹

【别名】黄独、土卵、滴水生、地乌龟。

【来源】为薯蓣科植物黄独 *Dioscorea bulbifera* L. *bulbifera* L., 块茎入药。

【性味】苦，平。

【功效】攻毒消肿，化痰散结。

【主治】瘰疬，颌下生丸子，癌肿，咽喉肿痛，咯血，疮疖。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

1、奋颈症（甲状腺肿）：黄药子 120g，研为粗末，白酒 500ml 泡 1 周，每次 30ml，每日 2-三次，或黄药子 15g 冲天炮 30g 海藻 牡蛎 24g 研细 浙贝 香附子各 9g。水煎服。

2、吐血：黄药子 大黄各 9g 牛膝 12g 鲜茅根 30g。水煎服。

3、吊小肠（疝气）：黄药子（酒炒） 预知子 荔枝核各 15g 车前子 9g。水煎

服。

4、咽喉肿痛、热病：黄药子 30g 地龙（微炙）30g 马牙硝 15g。上述药研细末，混匀，以蜜水调下 3g，每天二次。

5、衄血、便血、咯血：黄药子 15g 侧叶 12g 枳子 12g 白术 12g。水煎服，每日一剂。

6、胃痛：黄药子（炒） 陈皮 苍术 金钱草各 6g 青木香 4g。水煎服。每日一剂煎二次分服。

【备注】场行小毒，不宜久服。

【备考】1、化学成分：半干燥块茎含蔗糖约 22%，还原糖约 0.69%、淀粉 2.5%、皂甙、鞣质。薯蓣皂苷元视产区不同而有变化，或有或无。另含黄药子乙素、 β -谷甾醇。另据报道，全植物中存在 8 种属于一种新的呋喃去甲基二萜类成分，名为黄药子素 A~H。最近还报道块茎含 D-山梨糖醇、2,4,6,7-四羟基-9,10-二氢菲和 2,4,5,6-四羟基菲。

2、药理作用：①黄药子煎剂及酊剂对离体和在体蛙心均有直接抑制作用，使心收缩力减弱，心率减慢，传导阻滞。②对消化系统的作用：对离体兔肠有直接抑制作用，大鼠腹腔注射黄药子的丙酮提取物，可抑制进食。③对子宫的作用：20%酊剂或煎剂，对未孕家兔及豚鼠离体子宫有兴奋作用，出现强直性与节律性收缩，其兴奋作用可被苯海拉明所取消。酊剂较煎剂的作用强而快。④对缺碘食物所致的甲状腺肿有一定疗效，一些原因不明的甲状腺肿也有一些治疗作用。⑤止血实验证明有止血作用。⑥水煎剂对常见致病皮肤真菌有不同程度的抑制作用。⑦黄药子对肝肾组织有一定损害作用。对组织的损害在短时间即可表现出来，对肾组织的损害较长时间才表现出来，对狗的慢性毒性试验可见黄药子能引起食欲减退、厌油腻、恶心、呕吐及肝功能不正常。⑧黄药子提取物对实验性单纯疱疹病毒性角膜炎有治疗作用。⑨黄药子对小鼠肉瘤 S180 和子宫肿瘤 U14 有抑制作用。

21、独角

土家语名：独克

土家语拼音：duf kev

国际音标：tu³⁵ k'e⁵³

【别名】独蒜兰、杜鹃兰、山慈菇。

【来源】为兰科植物杜鹃兰 *Cremastra appendiculata* (D. Don)

Makino, 茎入药。

【性味】甘、微辛，寒。

【功效】攻毒散结，消肿止痛。

【主治】癌肿，丸子肿大，痈，疔，疮，毒蛇咬伤。

【用量】内服 10~15g，外用适量。

【应用经验】巴肺瘤症：虎爪草 20g 独角 15g 烂心木 30g 肺形草 20g 独脚鸡 10g 干蟾皮 1g 蛇舌草 30g。每日一剂，水煎二次服。

【备注】场行小毒。

22、癞蛤蟆

土家语名：癞克麻

土家语拼音：laif ker mar

国际音标：lai³⁵ k'e²¹ ma²¹

【别名】黑眶蟾蜍。

【来源】为蟾蜍科动物癞蛤蟆 *Bufo bufo gargarizans* Cantor，皮肉或皮肤分泌物入药。

【性味】咸，温。

【功效】攻毒消肿，通窍止痛。

【主治】各种癌肿，巴骨流痰，咽喉肿痛，中风昏迷。

【用量】内服 3~5g，外用适量。

【应用经验】

【备注】干皮有毒，分泌物为剧毒。

23、牛屎虫

土家语名：物色铁迫

土家语拼音：wuf ser tex per

国际音标：wu³⁵ se²¹ t°e⁵⁵ p'e²¹

【别名】推屎虫、屎蜞螂。

【来源】为金龟子科昆虫屎蜞螂 *Catharsius molossus* L., 虫体去翅入药。

【性味】咸，寒。

【功效】攻毒破血，消肿止痛。

【主治】胃癌，丹毒，痈肿，痔漏。

【用量】内服 3~6g，外用适量。

【备注】场行小毒。

24、石龙子

土家语名：抗苦尿池

土家语拼音：kanr kux niaof cir

国际音标：kan²¹ k'u⁵⁵ ɰia³⁵ ts'i²¹

【别名】山泥鳅、金脚蛇。

【来源】为石龙子科动物石龙子 *Eumeces chinensis* (Gray), 全体入药。

【性味】咸、寒。

【功效】攻毒破结，行水消肿

【主治】癌肿，恶疮，丸子肿大（瘰疬），小便闭。

【用量】3~6g。

【应用经验】

- 1、诸痿不愈：四脚蛇 3 枚 地胆 30 枚 斑蝥 40 枚。研末，为蜜丸，内服。
- 2、皮肤疮毒：四脚蛇适量，捣烂桐油混均，搽患处。
- 3、疔疮经久不愈，无名肿毒及瘰疬等病：石龙子 10g 蜈蚣 2 条千脚虫 10g 滚山珠 10g 乌梢蛇 20g 轻粉 10g 冰片 5g 野茶树根 20g。共研细末，同香油同浸泡 100 天，用油外搽患处，每日数次。

【备注】场行小毒。

25、红桐

土家语名：兔姐桐

土家语拼音: mianx jiex tongr

国际音标: mian⁵⁵ tɕie⁵⁵ t'uŋ²¹

【别名】重阳木。

【来源】为大戟科植物重阳木 *Bischofia javanica* BL., 叶入药。

【性味】微苦, 凉。

【功效】攻毒消肿, 开口退黄。

【主治】隔食病(食道癌), 胃硬胀症(胃癌), 黄疸, 咽喉肿痛, 疮疖肿痛。

【用量】内服 10~30g, 外用适量。

【应用经验】胃硬胀症: 红桐 30g 半支莲 30g 龙葵 15g 洋桃根 30g 牛屎虫 6g 一口卵 3g 甘草 6g。每日一剂, 水煎二次服。

26、一口印

土家语名: 印那这

土家语拼音: yenf naf zef

国际音标: jen³⁵ ʒa³⁵ tse³⁵

【别名】包袱七、黄包袱。

【来源】为小檗科植物小八角莲 *Dysosma difformis* (Hemsl. et Wills) T. H. Wang, 根入药。

【性味】苦、辛, 寒。

【功效】攻毒散结, 活血散瘀, 消肿止痛。

【主治】癌肿, 疥癣, 疗毒, 恶疮, 跌打损伤。

【用量】内服 6~9g, 外用适量。

【应用经验】丸子疗疮、咽喉肿痛: 一口印 6g 三角枫 10g 血蜈蚣 10g 豆瓣还阳 10g。水煎服。

【备注场行小毒。

27、白屈菜

土家语名: 阿黄连

土家语拼音: ar huanr lianr

国际音标: a²¹ xuan²¹ lian²¹

【别名】岩黄连。

【来源】为罂粟科植物白屈菜 *Chelidonium majus* L. 全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】消癌镇痛，止咳，利尿解毒。

【主治】癌肿，胃肠疼痛，黄疸，水肿，疥癣疮肿，蛇虫咬伤。

【用量】10~30g。

【应用经验】

1、瘟黄症：白屈菜 3g 一把伞 9g 商陆 9g 臭草根 9g 茵陈 15g。水煎服。

2、疔疮肿痛、疥癣、毒虫咬伤：鲜白屈菜适量，捣烂外敷或绞汁搽患处。

【备注】有毒。

【备考】1、化学成分：全草含白屈菜碱、白屈菜红碱、原阿片碱、血根碱、甲氧基白屈菜碱、金雀花碱等多种生物碱与白屈菜碱、苹果酸等结合的盐。此外尚含别 g 利托品碱、小檗碱、黄连碱、胆碱、组织胺、酪胺、皂苷、黄酮醇、维生素 C、胡萝卜素。乳液中主要含白屈菜醇、白屈菜红碱及原阿片碱。

2、药理作用：①白屈菜红碱有抑制中枢神经系统作用，具有微弱的麻醉效能，局部应用能麻痹感觉神经末梢；对肌肉和心脏有似罂粟碱的作用；可作阿片制剂的代用品，用以治疗胃肠疼痛和溃疡部分的镇痛。②对平滑肌有松弛作用，有镇咳、祛痰及平喘作用。③白屈菜红碱和血根碱具有抗炎作用，能抑制大鼠角叉菜胶所致的足肿胀。④白屈菜对体外培养的人食道癌细胞有杀伤作用；对卡他球菌、白色葡萄球菌、甲型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等有抑制作用。⑤毒性试验，白屈菜注射液静脉注射，小鼠 LD₅₀ 为 30±0.01g/kg；静注白屈菜总碱，小鼠 LD₅₀ 为 0.075±0.00067mg/kg。

28、江边一碗水

土家语名：胡泡泽拉书

土家语拼音：hur paof cef lax sux

国际音标：xu²¹ p'au³⁵ ts'e²¹ la⁵⁵ su⁵⁵

【别名】金边七、山荷叶、一碗水。

【来源】为小檗科植物山荷叶 *Diphylleia sinensis* H. L. Li, 根茎入药。

【性味】苦，寒。

【功效】攻恶毒，消肿止痛，祛风除湿，破瘀散结。

【主治】癌瘤，风湿腰腿疼痛，跌打损伤，痈肿疮疖，毒蛇咬伤。

【用量】3~6g。

【应用经验】

1、跌打损伤、腰肌劳伤、风湿疼痛：江边一碗水 6g 雪上一枝蒿 1g 白三七 10g 血当归 10g 当归 10g 接骨仙桃草 12g 八月瓜根 12g 花脸细辛 10g 白酒 2500ml。浸泡 6 天即可，口服三次，每次 15ml。

2、疮疖：鲜江边一碗水适量，捣烂，敷患处。

3、胃气痛（痛处拒按）：江边一碗水适量研粉，每次 0.3g，凉开水送服。

【备考】1、化学成分：本品含有木脂素类和黄酮类成分。木脂素类成分中已分离出鬼臼脂素 4.9%、山荷叶素 0.1%-0.15%、苦鬼臼脂素 0.04%、黄酮类成分中已分离分出山奈酚 0.15%和槲皮素。

2、药理作用：①抗癌作用：鬼臼脂素对小鼠和大鼠的多种肿瘤模型有抑制作用，包括急性白血病、转移淋巴瘤、局部淋巴瘤、腺瘤和黑色素瘤等。抗癌的作用机制是鬼臼脂素含有独特的反式内脂环的结构。动物试验和细胞培养证明，鬼臼脂素及其衍生物均是细胞垂体毒物，主要阻止细胞分裂前期（G₂期）或从G₂期进入分裂期的过程，故属于细胞周期特异性药物。内服鬼臼脂素或鬼臼树脂能刺激小肠，引起大量水泻，并伴有腹痛乃至出现血便，或导致严重衰竭性虚脱。由于鬼臼脂素毒性太大，不适于直接在临床上应用，故目前多用鬼臼脂素为骨架，进行结构改造，已制成多种毒性较低、疗效较好的新药应用于临床，对多种癌症有一定效果。②止咳祛痰作用：本品中所含的槲皮素和山奈酚对镇咳祛痰有一定效果，临床用于治疗慢性气管炎。③本品所含山荷叶素可进一步合成闭花木苷，闭花木苷对大鼠、小鼠、猫及猴等有显著提高嗜中性粒性白细胞（NGC）的作用以及对大鼠、小鼠由环磷酰胺引起的白细胞减少症和大鼠急性苯中毒有明显的效果。

29、花斑蝥

土家语名：斑蝥卡普

土家语拼音: banx miaor kax pux

国际音标: pan⁵⁵ miau²¹ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】花脸虫、南方大斑蝥。

【来源】为元青科昆虫大斑蝥 *Mylabris phalerata pallsa*, 全体入药。

【性味】辛, 热。

【功效】攻毒, 利尿, 破血, 发泡。

【主治】颈淋九子丸症, 恶疮, 顽癣, 歪嘴风, 狂犬咬伤, 三分症, 癌症。

【用量】入丸散 0.5~1g (1~3 个)。

【应用经验】

【备注】有大毒。

【备考】1、对真菌有抑制作用。2、对肉瘤有抑制作用。3、外用可刺激毛发生长。故可作生发药。

30、金刚藤

土家语名: 金刚二拉

土家语拼音: jinx ganx ef lax

国际音标: tɕin⁵⁵ kan⁵⁵ e³⁵ la⁵⁵

【别名】铁钉钯、金刚刺、红土茯苓。

【来源】为百合科植物菝葜 *Smilax china* L. 根茎和叶入药。

【性味】甘、淡, 平。

【功效】攻毒消肿, 祛风除湿。

【主治】癌肿, 疮毒, 风湿关节痛, 跌打损伤, 腹泻, 痢疾, 烧伤烫伤。

【用量】10~30g。

【应用经验】慢性汞中毒(轻): 金刚藤叶 50g, 每日一剂, 水煎服。

【备考】1、抗推锥虫作用。2、有解毒作用。3、对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、福氏痢疾杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌均有一定的抑制作用。4、有收敛止血作用。

31、狗牙瓣

土家语名: 哈列思思的

土家语拼音：hax lier six six manf

国际音标：xa⁵⁵ lie²¹ si⁵⁵ si⁵⁵ man³⁵

【别名】抗日牙半枝莲、垂盆草。

【来源】为景天科植物佛甲草 *Sedum lineare* Thunb.，全草入药。

【性味】甘、淡，凉。

【功效】抗癌，活血止痛，清热消肿，接骨。

【主治】肺癌，咽喉肿痛，牙痛，骨折，扭伤，劳伤咳嗽，烧烫伤，外伤出血，带状疱疹，毒蛇咬伤。

【用量】10~30g。

【应用经验】

- 1、咽喉肿痛：鲜半支莲 24g 鲜马鞭草 24g 食盐少许。水煎服。
- 2、肺痈：半支莲 鱼腥草各 30g。水煎服。
- 3、毒蛇咬伤：鲜半支莲、鲜乌敛莓各等量，捣烂绞汁，将药汁涂于伤口周围或用棉球蘸汁搽伤口。

【备考】1、化学成分：全草分离得到黄酮类成分有黄芩素、黄芩素苷、红花素及异红花素。此外还从其乙醚提取液中分离到一种新的生物碱，系白色结晶，熔点 148-150℃。

2、药理作用：①用美兰试管法筛选试验，对急性粒细胞型白血病白细胞有轻度的抑制作用；用细胞呼吸器法筛选试验，对上述白血病血细胞的抑制率大于 75%。②本品浸剂经乙醚提取的黄色针状结晶物经动物试验有利尿作用。③红花素有较强的对抗由组织胺引起的平滑肌收缩作用，并有很好的祛痰作用。④对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

32、狗半支莲

土家语名：哈列思思半支莲

土家语拼音：hax lier six six banf zix lianr

国际音标：xa⁵⁵ lie²¹ si⁵⁵ si⁵⁵ pan³⁵ tsi⁵⁵ lian²¹

【别名】抗日牙草、狗牙瓣。

【来源】为景天科植物垂盆草 *Sedum sarmentosum* Bge.，全草入药。

【性味】淡、微苦，凉。

【功效】攻毒散结，消肿退黄。

【主治】癌肿，咽喉肿痛，肝炎，痈肿疮毒，热淋，烫伤，毒蛇咬伤。

【用量】内服 10~30g，外用适量。

【应用经验】

1、痈肿疮毒、瘟黄症（传染性肝炎）：狗牙半支莲 30g，水煎服。

2、喉头肿痛：鲜的牙半支莲捣汁一杯，加烧酒少许漱 5~15 分钟，每日 3~4 次。

【备考】1、化学成分：含垂盆草苷和景天庚酮糖、蔗糖、果糖、葡萄糖、天冬酰胺、天冬氨酸、白氨酸、酪氨酸、缬氨酸、黄酮体、三萜类及植物甾醇以及消旋甲基异石榴碱、二氢异石榴碱、N-甲基-Z-β-羟丙基哌啶、3-甲酰-4-羟基-Z-H-吡喃。

2、药理作用：①本品所含的垂盆草苷对机体的细胞免疫反应有显著的抑制作用，能降低胸腺细胞数，并可使骨髓中 T 细胞比例显著增高。②重盆草苷对肝脏的糖代谢和能量代谢有促进作用，对肝细胞有保护作用。③垂盆草苷能降低肝炎患者血清谷丙转氨酶。

33、野辣椒

土家语名：抗苦海脚

土家语拼音：kanr kux haix jiaor

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ xai⁵⁵ tɕiau²¹

【别名】天落灯、苦葵。

【来源】为茄科植物龙葵 *Solanum nigrum* L.，全草入药。

【性味】苦，微寒。

【功效】抗癌，清热解毒，活血，利尿消肿。

【主治】癌症，亮肿症，尿急症，白带，疔疮，丹毒，跌打扭伤，咽喉肿痛，牙痛，目赤肿痛，湿疹。

【用量】内服 10~15g，外用适量。

【应用经验】

1、奔肿症（急性肾炎）、浮肿、小便少：野辣椒 芫花各 15g 木通 6g。水煎服。

2、胃癌：野辣椒 半支莲（或白花蛇舌草） 白英各 30g 石见穿（或黄毛茸草）15g。水煎服。

3、痢疾：野辣椒叶 25~30g，加白糖 25g，水煎服。

【备注】场行小毒。

【备考】1、化学成分：含皂苷和多种生物碱：龙葵碱、澳洲茄碱（由澳洲茄胺和鼠李糖、半乳糖、葡萄糖组成）、澳洲茄边碱、茄微碱、茄达碱及阿托品等。

2、药理作用：①龙葵碱有皂碱毒作用。过量可引起急性中毒，主要症状为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、心跳快速、发热、呼吸困难、瞳孔散大、头晕、精神错乱、昏迷等，死于呼吸麻痹。②澳洲茄碱有使正常动物血糖升高的作用。③澳洲茄胺的 2、药理作用较广；有强心作用（增强心肌收缩力和减慢心率）；抗炎、降低血管通透性；抑制血中透明质酶的活性作用；降低血液的凝固性；其剂量与可的松相等时，可延长豚鼠的过敏休克的生存时间。对烫伤性休克、胰岛素休克亦有一定疗效。对免疫过程中抗体的生成有一定刺激作用；长期应用可使动物肾上腺皮质重量减低，并有类似盐类皮质激素的作用；对神经系统小量增强兴奋过程，而大剂量则增强抑制过程。

34、紫藿草

土家语名：紫藿草

土家语拼音：zix hof ciao

国际音标：tsi⁵⁵ xo³⁵ ts'au⁵⁵

【别名】岩紫苏、香茶菜。

【来源】为叫做科植物香茶菜 *Isodon amethystoides* (Benth.) C. Y. Wu et Hara，全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】攻毒降热，散瘀退黄。

【主治】恶血症，黄板症，烧心症，小便癃闭，筋骨疼痛，经闭，跌打肿痛，烧烫伤，毒蛇咬伤，疮疡。

【用量】内服 30~50g，外用适量。

【应用经验】

- 【备考】1、能促进变性、坏死的肝细胞修复，有提高非特异性免疫功能的作用。
2、对金黄色葡萄球菌有较强的杀伤作用。

35、喜树

土家语名：欢喜卡蒙

土家语拼音：huanx xix kar mongr

国际音标：xuan⁵⁵ ɕi⁵⁵ k'a²¹ muŋ²¹

【别名】神花树、旱莲木。

【来源】为珙桐科植物旱莲木 *Camptotheca acuminata* Decne.，根、果实及枝叶、树皮入药。

【性味】苦、涩，凉。

【功效】攻毒消肿，杀虫止痒。

【主治】恶肿，疮毒，牛皮癣。

【用量】内服 10~15g，外用适量。

【应用经验】

- 1、痈疽初起：喜树嫩叶适量，加食少许，捣烂外敷。
- 2、牛皮癣：鲜喜树根皮适量捣烂外敷，若配合喜树碱局部注射疗效更好。

【备注】有毒，对肝、肾、心脏影响较大。

【备考】1、化学成分：含有抗肿瘤作用的生物碱：喜树碱（为色氨酸一萜烯类生物碱）、喜树次碱，并分离出 10-羟基喜树碱及 10-甲氧基喜树碱，后两者对白血病 L1220 及瓦 g 癌均具有与喜树碱相似良好的抑制作用。另据报道，尚含微量成分的去氧喜树碱。喜树碱以果实含量最高，从果中分离得 10-甲氧基喜树碱、去氧基喜树碱、喜树次碱、喜果苷、白桦脂酸，次为根皮、树根及树皮，而树枝含量最小。

2、药理作用：①喜树碱对小鼠 L615 白血病、吉田肉瘤、肉瘤-180、肉瘤-37 及艾氏腹水癌等肿瘤均有一定的抑制作用。②喜树果煎剂及酒提粗制剂的药理作用与喜树碱相似，对于动物实验性肿瘤的疗效较好，其副作用较小。小鼠艾氏腹水癌及小鼠肝癌经喜树果注射液治疗后主要作用于细胞核、使有丝分裂减少，核

染色质溶解，核固缩，呈玻璃样变、核膜深染、染色质凝聚等改变。有的瘤株出现瘤巨细胞增多，在治疗效果显著的瘤组织中还出现侏儒细胞，与一般烷化剂相似。③10-羟基喜树碱有较广的抗癌作用，对肝癌、头颈部肿瘤、胃癌等恶性肿瘤均有效。④10-羟基喜树碱对肿瘤相伴免疫有抑制作用。⑤10-甲氧基喜树碱体外试验能抑制疱疹病毒。⑥喜树碱对大鼠及兔有抗早孕作用。⑦10-氢基喜树碱能明显抑制中国仓鼠卵巢细胞的有丝分裂，可诱发CHK细胞染色体畸变率明显增高，诱发小鼠骨髓微核形成。⑧大剂量喜树果注射液对小鼠的肝脏、肾脏及心脏毒性较大。⑨抗菌试验，叶（鲜品）对金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌及大肠、炭疽、白喉、绿脓、痢疾等杆菌均有较强的抑制作用。

36、藤贝母

土家语名：二拉贝母

土家语拼音：ef lax beif mux

国际音标：e³⁵ la⁵⁵ pei³⁵ mu⁵⁵

【别名】土贝母。

【来源】为葫芦科植物土贝母 *Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franquet, 块茎入药。

【性味】苦，微寒。

【功效】抗癌消肿，清热解毒，排脓。

【主治】小腹包块，乳房结肿，乳痈，瘰疬，疮疡，肿毒，巴骨流痰，蛇虫咬伤。

【用量】内服 10~30g，外用适量。

【应用经验】

1、乳痈：藤贝母 瓜蒌各 9g 一把伞 15g。水煎服。

2、痈肿脓出而肿不消：藤贝母 旱莲草各 9g。水煎服。

3、巴骨流痰（骨结核）溃烂流脓：土贝母 蜈蚣各等量。共研细末，每服 3g，每日二次，甜米酒加热冲服。

4、手发背：土贝母 9（土炒）16g 知母 6g 半夏 4g 甲珠 6g 知母 6g 生甘草炙甘草各 6g。加葱、姜、水、酒煎服。

【备考】1、化学成分：块茎含五环三萜环状皂苷，土贝母甲、乙、丙、丁、戊。

叶柄主要含还原糖。叶主要含麦芽糖、蔗糖。

2、药理作用：①动物实验证明：土贝母对小鼠移植性肿瘤子宫癌 V-14 有效，抑制率为 45.8%，对甲基胆蒽诱导的小鼠宫颈癌也有效，使诱发率降低，瘤块缩小，存活率增加，临床用治乳腺癌等有一定疗效。②土贝母提取物对实体型 S180 和 H22 肿瘤的生长有显著的抑制作用，能延长带瘤小鼠的生存期。③土贝母总皂苷有较强的杀精子作用，可显著降低单个精子顶体酶的活性。④土贝母皂苷对单纯疱疹病毒 I 型有抑制作用。⑤土贝母皂苷甲具抗炎、抗癌和强抗促癌活性。⑥土贝母水煎液也能显著抑制小鼠溶血素生成和迟发性超敏反应，对小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能有微弱的抑制作用。

37、壁虎

土家语名：窝替米

土家语拼音：wov tif miv

国际音标：wo⁵³ t·i³⁵ mi⁵³

【别名】爬壁虎、天龙、守宫。

【来源】为壁虎科动物无疣壁虎 *Gekko subpalmatus* Gunther，虫体入药。

【性味】咸，寒。

【功效】攻毒散结，祛风镇惊。

【主治】癌肿，恶疮，丸子肿大，破伤风，厉风痛，惊风，癫痫，小儿下肢麻痹。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1 走胎症、下痢：壁虎 蜗牛壳 兰香草根 雄黄各 12g 冰片 3g。研细粉，每服 1.5~3g，冷开水冲服。

2、丸子症（瘰疬）：壁虎尾 1~3 条 朱砂 9g。共研末，调青油外搽。

【备注】场行小毒。

【备考】药理作用：1、壁虎有抗肿瘤作用，体外实验发现，其水溶可抑制人肝癌细胞的呼吸。2、本品对结核杆菌及常见致病性真菌有抑制作用。3、本品有抗惊厥及溶血作用。

38、秤砣梨

土家语名：洋托糯

土家语拼音：yanr tor lof

国际音标：jan²¹ t'o²¹ lo³⁵

【别名】团洋桃。

【来源】为猕猴桃科植物小洋桃 *Actinidia coriacea* (Fin. et Gagn.) Dunn, 果实或根入药。

【性味】根：苦、涩，温。果：酸、涩，温。

【功效】根：行气活血。果：抗肿瘤。

【主治】根主治跌打损伤，腰背疼痛，内伤出血。果主治肿瘤。

【用量】内服 10~30g。

【应用经验】

- 1、风湿痹痛症：团洋桃根 15g 木防己 15g 老鹳草 15g 虎杖 9g。水煎服。
- 2、腹胀、吐泻：团洋桃根 30~60g，水煎服。

39、小洋桃

土家语名：羊砣罗毕

土家语拼音：yanr tor lox bif

国际音标：jan²¹ t'o²¹ lo⁵⁵ pi³⁵

【别名】水洋桃。

【来源】为猕猴桃科植物软枣猕猴桃 *Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc) planch. 的根、叶。

【性味】淡、微涩，凉。

【功效】攻恶毒，健肠胃。

【主治】胃癌，腹胀、吐泻，风湿痹痛症，月经不调。

【用量】10~30g。

【应用经验】

- 1、风湿痹痛症：小洋桃根 15g 木防己 15g 老鹳草 15g 虎杖 9g。水煎服。
- 2、腹胀、吐泻：小洋桃根 30~60g，水煎服。

第十二章 消肿毒药

土家语名：浮毒消捏药

土家语拼音：hur duf xiaox niex yaof

国际音标：xu²¹ tu³⁵ ɕiau⁵⁵ ʒie⁵⁵ jau³⁵

凡具有消除肿结、驱赶毒邪功效，用于治疗痈疔、疔、疮、丸子肿、痔疮的药物称消肿毒药。

土家医认为肿毒邪气一是存在于自然界中，在机体抵抗力下降或皮肤受损后肿毒邪气侵犯皮肤肌肉而发病；二是体内火毒炽盛、灼伤筋肉形成肿毒而发病。病理特点是皮下肉上，火热灼肉伤脉，小脉不通，局部肿胀，肉腐成脓。肿毒病因程度和部位不同，各症又有各自特点的症状和体征。共同症状和体征有：皮肤或皮下、黏膜、咽喉、肛门红肿、热痛、化脓、皮肤溃烂，舌红、苔黄、脉数。

治肿毒药具有消除硬肿、驱赶毒邪、散脓平疮多种功效，主要用于治疗肿毒病症。部分清热毒、泻火毒的药物也有同样功效，主要用于因体内热毒、火毒炽盛引起的肿毒病症。某些消肿毒药还兼有清热毒、泻火毒、化脓毒、活血祛瘀、利尿、止血、调经、解蛇毒、止咳平喘、祛风湿、抗瘟毒功效，经配方可用于治疗热毒病、火毒病、脓毒病、跌打损伤、水肿、出血、月经不调、毒蛇咬伤、热咳喘、热风湿、丹毒症、猴耳疮等。

常用消肿毒药有：铁扣子、母猪藤、小对叶草、土甘遂、天韭、木鳖子、石蒜、地葫芦、羊马菊、条叶蓟、苦苣菜、狗爪半夏、兔耳伞、罗钱树皮、秋葵花、托儿七、野芋头、雾水葛、蝇子草、百疮七、一颗血、黑虎七、朴树叶、米口袋、黄瓜香、梨头草、五星草、盾形草、小蜡、锅烟草、烟管头、千里光、玉簪花等。

1、九子连环草

土家语名：写扣子

土家语拼音：xiev kouf zix

国际音标: ɕie⁵³ k'əu³⁵ tsi⁵⁵

【别名】铁扣子。

【来源】为兰科植物虾脊兰 *Calanthe discolor* Lindl.，根茎入药。

【性味】辛、甘，平。

【功效】消肿毒，活血祛瘀。

【主治】瘰疬，痈疮肿痛，跌打损伤，腰肋疼痛。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、腰肋疼痛、跌打损伤、压伤：九子连环草 15g，泡酒服。
- 2、痔疮、脱肛：九子连环草研末，加菜油调敷患处。

2、大母猪藤

土家语名：子泥嘎此巴二拉

土家语拼音：ziv nir gar cix bax ef lax

国际音标：tsi⁵⁵ ʐi²¹ ka²¹ ts'i⁵⁵ pa⁵⁵ e³⁵ la⁵⁵

【别名】见肿消。

【来源】为葡萄科植物五叶山葡萄 *Ampelopsis delavayana* var. *genliliana* Hand.-Mazz.，根入药。

【性味】苦，温。

【功效】消肿毒，祛风除湿。

【主治】痈疮肿毒，奶疮，丸子溃烂，黄疸，小便带血，风湿关节炎。

【用量】10~15g。

【应用经验】

- 1、跌打损伤：大母猪藤 10g 五加皮 10g 三百棒 10g 草乌 3g。水煎服或兑酒服。
- 2、痈肿疮毒：大母猪藤 隔山撬 天花粉各等量。研粉，冷开水调敷患处。

3、小母猪藤

土家语名：子泥嘎被亏二拉

土家语拼音: ziv nir gar bif kuix ef lax

国际音标: tsi⁵⁵ ʒi²¹ ka²¹ pi³⁵ k'ui⁵⁵ e³⁵ la⁵⁵

【别名】五爪龙。

【来源】为葡萄科植物乌敛莓 *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagn., 全草入药。

【性味】苦、酸, 凉。

【功效】消肿毒, 清热利尿, 活血止血。

【主治】咽喉肿痛, 丸子肿痛, 跌打损伤, 痈疔。

【用量】内服 10~30g, 外用适量。

【应用经验】

1、咽喉肿痛: 鲜小母猪藤全草 30g, 水煎服。

2、痈疔、痒子: 鲜小母猪藤全草适量, 捣烂外敷。

【备考】1、化学成分: 全草含甾醇、氨基酸、酚性成分、黄酮类以及硝酸钾、粘液质。又据报道: 本品含洋芹素、木樨草素、木樨草素-7-O-葡萄糖甙、羽扇豆醇、棕榈酸、内酯或酯类。

2、药理作用: ①对溶血性葡萄糖球菌、链球菌、痢疾杆菌、大肠杆菌具有抑制作用, 煎剂能抑制钩端螺旋体。②水煎醇沉液及醇提取液对不同的炎症模型均有不同的对抗作用。③能明显抗体外血栓形成和血小板粘附, 显著抑制 ADP、胶原诱导大鼠血小板聚集。④对细胞免疫有增强作用, 亦能增强腹腔巨噬细胞吞噬功能。⑤对由于皮下注射肺炎双球菌和流感杆菌引起的家兔体温升高有解热作用。

4、小对叶草

土家语名: 被亏对叶实克查

土家语拼音: bif kuix duif yer sir ker car

国际音标: pi³⁵ k'ui⁵⁵ tui³⁵ je²¹ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】对月草、黄花对月草。

【来源】为藤黄科植物小连翘 *Hypericum erectum* Thunb. 或密腺小连翘 *H. seniawinii* Maxim, 全草入药。

【性味】苦, 平。

【功效】消肿毒，调经止血，通乳。

【主治】疔疮肿毒，月经不调，吐血，衄血，子宫出血，跌打损伤，创伤出血，乳汁不能。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、跌打损伤肿痛：黄花对月草 20g 土牛膝 15g 香附子 10g 接骨木 20g 栀子 15g。捣烂外敷。

2、黄疸型肝炎、肝脾肿大疼痛：黄花对叶草 30g 地耳草 15g 虎杖 15g。水煎服。

3、月经不调、肾炎、尿路感染：黄花对月草根皮 30g 泡淘米水服。

【备考】1、化学成分：金丝桃植物含金丝桃苷及挥发油。

2、药理作用：①抑菌试验表明：对金黄色葡萄球菌有抑制作用。②金丝桃苷对乙酰胆碱引起的豚鼠、大鼠离体肠痉挛有拮抗作用。③金丝桃苷对鸡蛋黄引起的胆囊排空有抑制作用。④金丝桃苷对小鼠胃肠推进运动有抑制作用。⑤金丝桃苷对单纯疱疹病毒 I 型、II 型、流感病毒和疱疹性口炎病毒等有体外抗病毒活性。对鼠性 Friend 白血病毒可体内抑制活性。

5、土甘遂

土家语名：土甘遂

土家语拼音：tux ganx xix

国际音标：t'u⁵⁵ kan⁵⁵ ɕi⁵⁵

【别名】九头狮子草、灯台草。

【来源】为大戟科植物猫眼草 *Euphorbia lunulata* Bge.，全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】**口味**毒消肿，止痒散结。

【主治】疔疮肿毒，九子丸肿大症，疮癣及疟疾。

【用量】3~6g。

【应用经验】

1、疔疮肿毒：用鲜草捣烂外敷。

2、疮癬瘙癢：土甘遂全草（干品）研末，香油調敷患處。

【備注】有毒。

【備考】1、化學成分：莖葉含黃銅甙、甾醇、揮發油、酚類物質、有機酸、氨基酸與蠟質。從地上部分和種子分離出貓眼草素 I-VI。

2、藥理作用：①本品煎劑對福氏痢疾桿菌、宋內氏痢疾桿菌、金黃色葡萄球菌等均有抑制作用。②本品所含黃銅甙對動物有鎮咳、祛痰、消炎作用。

6、天韭

土家語名：沒嘎九菜

土家語拼音：mef gar jiux caif

國際音標：me³⁵ ka²¹ tɕiu⁵⁵ ts'ai³⁵

【別名】天大蒜、天蒜。

【來源】為百合科植物天蒜 *Allium paepalanthoides* Airy-Shaw，鱗莖入藥。

【性味】微辛，熱。

【功效】消腫毒，止痛，解蛇毒。

【主治】仍舊蛇咬傷，癰瘡腫痛。

【用量】3~6g。

【應用經驗】

1、毒蛇咬傷：天蒜 藤黃 半支蓮 白花蛇舌草各 10g。研末，用蜂蜜調勻，敷患處。

2、赤白帶下：野蒜適量，切碎，煮粥食。

3、咽喉腫痛：野蒜和醋搗爛，敷腫處，

4、鼻淵：野蒜 9g 木瓜花 9g 豬鼻管 120g。水煎服。

【備注】場行小毒。

7、木團魚

土家語名：卡壘古

土家語拼音：kar long gux

國際音標：k^{a21} luŋ²¹ ku²¹

【别名】**就的魚**、地桐子。

【来源】为葫芦科植物木鳖子 *Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spr.，种子入药。

【性味】苦，温。

【功效】消肿毒，散结止痛。

【主治】痈疔脓肿，丸子肿痛，头癣，痔疮，无名肿毒。

【用量】一般为外用，适量。

【应用经验】

- 1、头癣：木鳖仁适量，加醋磨汁，涂搽患处。
- 2、九子疔：木鳖仁粉末 15g 鸡子白 1 个，和匀蒸熟，每天服一次，连服半月。
- 3、黄疸病：制木鳖子 玫瑰花 诃子各等量，研末，制水丸如黄豆大。每日二次，每次 3g。
- 4、淋巴结核，无名肿毒：木鳖子仁 蓖麻子仁各等量，樟脑 冰片各适量。共捣碎，用猪胆汁调匀敷患处。每日一次。
- 5、外痔：木鳖子仁 荆芥 芒硝各等量。水煎，先熏后洗。

【备注】有毒。

【备考】1、化学成分：种子含甾醇、齐墩果酸、木鳖子酸、由棉根皂苷元所成的木鳖子皂苷、2-酮酸、栝楼酸。茎皮含生物碱。

2、药理作用：①对心血管系统的作用：木鳖子皂苷对离体蛙心有抑制作用；给大鼠镇静注射可产生暂时的血压下降；对麻醉犬、猫、兔等亦有降压作用。但其毒性较大。②溶血作用：木鳖子皂苷对兔红细胞有溶血作用。③抗炎作用：木鳖子皂苷给大白鼠口服或皮下注射，能显著抑制角叉菜胶引起的足肿胀。④对肠平滑肌的作用：木鳖子皂苷对离体兔十二指肠有抑制作用，但对豚鼠回肠段则能增强乙酰胆碱的作用。

8、石蒜

土家语名：阿石托

土家语拼音：ar sir tof

国际音标：a²¹ si²¹ t'o³⁵

【别名】老鸦蒜。

【来源】为石蒜科植物老鸦蒜 *Lycoris radiata* (L, Her.) Herb., 鳞茎入药。

【性味】辛，温。

【功效】消肿毒，催吐祛痰。

【主治】痈肿疮毒，牛皮癣，食物中毒，水肿。

【用量】内服 3~6g，外用适量。

【应用经验】

1、痈肿疮毒：石蒜捣烂，外敷。

2、食物中毒、痰涎壅塞：鲜石蒜 1.5~3g，水煎服催吐。

【备注】有毒。

【备考】1、有催吐、祛痰、降低血压、抑制胆碱酯酶，镇痛、解热、兴奋子宫和平滑肌、抗炎、抗阿米巴等作用。2、能提高白细胞的吞噬活性。3、能加强横纹肌、子宫的收缩，具有缩睡作用。4、有抗肿瘤作用。

9、地葫芦

土家语名：里提葫芦

土家语拼音：lix tir hur lur

国际音标：li⁵⁵ t·i²¹ xu²¹ lu²¹

【别名】客的粑粑叶、大马蹄草。

【来源】为菊科植物蜂斗菜 *Petasites japonicus* (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt 或毛裂蜂斗菜 *P. tricholobus* Franch. 全草或根茎入药。

【性味】苦、辛，凉。

【功效】消肿毒，散瘀，解蛇毒。

【主治】痈疔肿毒，毒蛇咬伤，跌打损伤，蛾子症。

【用量】10~15g。

【应用经验】痈疔肿毒症：鲜地葫芦捣烂外敷患处，每日一次。

【备考】1、对金黄色葡萄球菌有显著的抑制作用。2、蜂斗菜烯碱有致癌活性，对肝脏有损害。

10、老虎姜

土家语名：利科书

土家语拼音：lif kox sux

国际音标：li³⁵ k'o⁵⁵ su⁵⁵

【别名】生扯拢。

【来源】为百合科植物点花黄精 *Polygonatum punctatum* Royle. ex Kunth., 根茎入药。

【性味】辛，平。

【功效】消肿毒，止血。

【主治】痈疽疔毒，疥疮，头癣，外伤出血。

【用量】10~15g。

【应用经验】

- 1、湿热黄疸、全身发黄：生扯拢 10g 地苦胆 10g 吊杨尘 6g 刺黄连 10g。水煎服。
- 2、飞疔（危险三角区疮疖）：鲜生扯拢叶捣烂兑淘米水吞服。
- 3、跌打损伤、痈疔肿毒、扭挫伤：鲜生扯拢适量，捣烂敷患处。

11、羊马草

土家语名：若马实克查

土家语拼音：rof max sir ker car

国际音标：zo³⁵ ma⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】三叶草、千日红。

【来源】为豆科植物红车轴草 *Trifolium pratense* L., 全草入药。

【性味】苦、辛，平。

【功效】消肿毒，止咳祛痰。

【主治】疮疡溃烂，咳嗽哮喘。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、疮疡溃烂：煎膏外敷。

2、气喘咳嗽:羊马草 6-9g, 水煎服。

【备考】1、化学成分:叶及茎含车轴草花素, 叶另含一种葡萄糖苷及木糖、果糖、葡萄糖、蔗糖、果糖基果糖、果糖基葡萄糖、棉子糖的异构体等。花含车轴花素、红车轴草素、三叶醇、红车轴草酸、异槲皮苷、槲皮素、谷甾醇等。花、茎、叶均含芒柄花根素, 干草含紫苜蓿酚。

2、药理作用:①干草中含的紫苜蓿酚在动物体内有抗凝血作用。②三叶豆酸有抗霉菌的作用。

12、条叶蓟

土家语名: 没他泽他色

土家语拼音: mef tax cer tax ser

国际音标: me³⁵ t'a⁵⁵ ts'e²¹ ta⁵⁵ se²¹

【别名】雷公刺。

【来源】为菊科植物紫背蓟 *Cirsium lineare* (Thunb.) Sch.-Bip, 全草入药。

【性味】甘、苦, 凉。

【功效】消肿毒, 清热凉血, 活血散瘀。

【主治】奶疮, 尿急症, 月经不调, 经闭, 痛经, 暑热烦闷, 跌打吐血, 疗疮, 痔疮, 赤白带下, 牛皮癣。

【用量】6~10g。

13、苦苣菜

土家语名: 克歙致子苣哈车

土家语拼音: keif zif zix jif hax cex

国际音标: k'e³⁵ tsi³⁵ tsi⁵⁵ tɕi³⁵ xa⁵⁵ ts'e⁵⁵

【别名】苦麻菜、苦苣菜。

【来源】为菊科植物苦苣菜 *Sonchus oleraceus* L., 全草入药。

【性味】苦, 寒。

【功效】消肿毒, 清热凉血。

【主治】肠痛, 痈肿疗毒, 痢疾, 痔疮, 产后瘀血腹痛, 肠风下血, 烧烫伤。

【用量】内服 10~15g，外用适量。

【应用经验】

- 1、产后缺乳：白龙须 苦麻菜各 15g。水煎，穿山甲 15g，研末冲服。
- 2、热泻、痢疾：仙鹤草 百味莲 麻布七 水竹叶 水灯草 伏龙肝 生石膏 苦麻菜各 20g。水煎服。
- 3、热咳、口咽痛：苦麻菜单用 6~9g，水煎服。
- 4、痢疾：黄苦麻 30g 枫香树叶 15g。水煎服。
- 5、血崩、带下：黄苦麻 30g 红花 6g。水煎服。

【备考】药理作用：1、苦苣菜水煎醇提取液对急性及慢性粒细胞型白血病患者白细胞的脱氢酶都有明显抑制作用；但对白细胞的呼吸无抑制作用。2、提取物在体外实验对艾氏腹水癌细胞有破坏作用，口服对艾氏腹水癌有治疗作用；局部注射可使局部肿瘤逐渐变硬，脱落而修复。3、有兴奋心脏的作用。4、可使小动脉扩张。

14、岩节莲

土家语名：阿八糯梯莲

土家语拼音：ar bar lof tix lianr

国际音标：a²¹ pa²¹ lo³⁵ ti⁵⁵ lian²¹

【别名】人字果。

【来源】为毛茛科植物蕨叶人字果 *Dichocarpum dalzillii* (Drumm. et Hutch.) W. T. Wang et Hsiao, 根入药。

【性味】辛、微苦，寒。

【功效】消肿毒。

【主治】红肿疮毒。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】疮毒症：岩节莲鲜品适量，捣烂外敷，吹白。

15、金香炉

土家语名：科香炉

土家语拼音: kox xianx lur

国际音标: k'o⁵⁵ ɕian⁵⁵ lu²¹

【别名】天香炉。

【来源】为野牡丹科植物金锦香 *Osbeckia chinensis* L.，全草入药。

【性味】淡，平。

【功效】消肿毒，清热利湿，止咳化痰。

【主治】血痢，热泻，肠痛，感冒咳嗽，毒蛇咬伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、痢疾、热泻：金香炉根 60~120g，水煎服。

2、休息痢（阿米巴痢疾）：金香炉 30~60g，水煎，早晚空腹各服一次，忌食豆腐、鸡蛋等食物。

【备考】对绿脓、变形、伤寒、痢疾杆菌及金黄色葡萄球菌有抑制作用。

16、狗爪半夏

土家语名：哈列吉米三步跳

土家语拼音: hax ler jir mix sanx bux taox

国际音标: xa⁵⁵ lie²¹ tɕi²¹ mi⁵⁵ san⁵⁵ pu⁵⁵ t'iau⁵⁵

【别名】独解莲、虎掌、大三步跳。

【来源】为天南星科植物掌叶半夏 *Pinellia pedatisecta* Schott，块茎入药。

【性味】辛，平。

【功效】消肿毒，解蛇毒。

【主治】无名肿毒，毒蛇咬伤。

【用量】外用适量。

【应用经验】仍旧蛇咬伤症：狗爪半夏鲜品适量，捣烂外敷，每日二次。

【备注】有毒。

17、兔耳伞

土家语名：毛地里翁且伞

土家语拼音: mor tox lix ongr qief sanv

国际音标: mo²¹ t'o⁵⁵ li⁵⁵ uŋ²¹ tɕie³⁵ san⁵⁵

【别名】猴儿掌、翻痰七。

【来源】为菊科植物大头橐吾 *Ligularia japonica* (Thunb.) Less, 根或全草入药。

【性味】辛, 微温。

【功效】消肿毒, 舒筋活血。

【主治】无名肿毒, 毒蛇咬伤, 跌打损伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、跌打损伤: 兔耳伞 15~30g, 水酒各半煎服, 同时取鲜草捣烂外敷。
- 2、无名肿毒: 鲜兔耳伞根适量, 加白糖少许, 共捣烂外敷, 早晚各换药一次。
- 3、毒蛇咬伤: 兔耳伞根 虎掌 苕麻(根皮) 各适量。共捣烂外敷。

18、罗钱树皮

土家语名: 罗钱卡他爬

土家语拼音: lor qianr kar tax par

国际音标: lo²¹ tɕian²¹ k'a²¹ t'a⁵⁵ p'a²¹

【别名】紫荆树。

【来源】为豆科植物紫荆树 *Cercis chinensis* Bge., 树皮入药。

【性味】苦, 凉。

【功效】消肿毒, 活血通经, 解蛇毒。

【主治】疮疖钢的, 咽喉痛, 经闭腹痛, 牙痛, 风湿关节炎, 跌打损伤, 狂犬及蛇虫咬伤。

【用量】6~10g。

【备考】对病毒有抑制作用, 对葡萄球菌、化脓性球菌和肠道致病菌均有较强的抑制作用。

19、洞苋菜

土家语名：洞苋菜

土家语拼音：dongf hanf caof

国际音标：tuŋ³⁵ xan³⁵ ts'ai³⁵

【别名】麝香草。

【来源】为菊科植物下田菊 *Adenostemma lavenia* (L.) O. Ktze., 全草入药。

【性味】辛、甘，微寒。

【功效】消肿毒，祛风湿，解表。

【主治】痈疽疮毒，毒蛇咬伤，风湿关节痛，外感。

【用量】6~10g。

20、秋葵花

土家语名：凉捏老司司

土家语拼音：lianr niex laor six six

国际音标：lian²¹ ɲie⁵⁵ lau²¹ si⁵⁵ si⁵⁵

【别名】香秋葵、野芙蓉。

【来源】为锦葵科植物黄蜀葵 *Abelmoschus manihot* Medic., 花朵入药。

【性味】甘，寒。

【功效】消肿毒，清热凉血。

【主治】痈疽肿毒，猴耳疮，刀伤出血，淋症，烫伤。

【用量】内服6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、烫伤：秋葵鲜花浸于麻油中，2周后可用以涂抹伤处，每天多次。
- 2、痈疽、肿毒、恶疮：秋葵花，用盐掺，取入瓷器密封，经年不坏，患处敷之。
- 3、小儿秃疮：秋葵花 大黄 黄芩等份。为末，米泔水洗净，香油调搽。

【备考】有镇痛作用。

21、独叶一枝花

土家语名：独叶一枝卡普

土家语拼音：dur yer yir zix kax pux

国际音标: tu²¹ je²¹ ji³⁵ tsi⁵⁵ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】独叶兰。

【来源】为兰科植物细萼无柱兰 *Amitostigma gracile* (Bl.) Schltr., 全草入药。

【性味】微甘, 凉。

【功效】消肿毒, 止痛。

【主治】无名肿毒, 毒蛇咬伤, 跌打损伤, 吐血。

【用量】内服 6~10g, 外用适量。

22 托儿个良

土家语名: 托儿七

土家语拼音: haox er qir

国际音标: xau⁵⁵ e²¹ tɕ²¹ i²¹

【别名】犁头尖。

【来源】为天南星科植物犁头尖 *Typhonium divaricatum* (L.) Decne., 块茎或全草入药。

【性味】辛、苦, 温。

【功效】消肿毒, 祛痰, 止呕。

【主治】奶疮, 瘰疬, 毒蛇咬伤, 疔疮, 寒呕冷咳。

【用量】3~6g。

【应用经验】丸子症: 托儿七适量水涂患处, 每日二次。

23、黄姜

土家语名: 王嘎拉科书

土家语拼音: wangr gax lax kox sux

国际音标: wan²¹ ka⁵⁵ la⁵⁵ k'o⁵⁵ su⁵⁵

【别名】观音莲。

【来源】为薯蓣科植物盾叶薯蓣 *Dioscorea zingiberensis* C. H. Wright, 根茎入药。

【性味】甘、苦，凉。

【功效】消肿毒，清肺止咳，理气止痛。

【主治】肺热人地，肿毒，蜂螫虫伤，跌打损伤。

【用量】10~15g。

【应用经验】无名肿毒：生黄姜捣烂敷患处，每日1~二次。

24、野芋头

土家语名：抗苦你补

土家语拼音：kanr kux nix bux

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ ʔi⁵⁵ pu⁵⁵

【别名】山芋头。

【来源】为天南星科植物野芋头 *Colocasia antiquorum* Schott et Endl.，根茎入药。

【性味】辛，温。

【功效】消肿毒，止痛。

【主治】蛇咬伤，无名肿痛，痈疔。

【用量】外用适量。

【应用经验】无名肿毒，鲜品在火热灰中炮，捣烂敷患处，每日一次。

【备注场行小毒。

25、裂叶奶浆草

土家语名：尔他皮嘎拉江泽亏

土家语拼音：ex tax pir gar lax manr cer kuix

国际音标：e⁵⁵ t'a⁵⁵ pi²¹ ka²¹ la⁵⁵ man²¹ ts'e²¹ k'ui⁵⁵

【别名】九龙根。

【来源】为桑科植物琴叶榕 *Ficus pandurata* Hance，根、叶入药。

【性味】甘、微辛，温。

【功效】消肿毒，舒筋通络，活血调经。

【主治】乳痛，背痛，腰背酸痛，跌打损伤，闭经，月经不调。

【用量】6~10g。

26、雾水葛

土家语名：所泽阿不

土家语拼音：sox cer ar bur

国际音标：so⁵⁵ ts'e²¹ a²¹ pu²¹

【别名】水葛。

【来源】为荨麻科植物雾水葛 *Pouzolzia zeylanica* (L.) Benn.，全草入药。

【性味】甘、淡，寒。

【功效】消肿毒，排脓，清湿热。

【主治】疮，痈疽，乳痈，风火牙痛，热泻，痢疾，尿路感染。

【用量】内服6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、尿急症（尿路感染）、热泻（肠炎）、痢疾、乳痈：雾水葛鲜品30-50g或干品15-30g，水煎服。
- 2、外伤骨折（复位固定后）、痈疮：雾水葛鲜品捣烂敷患处，或用干粉调酒敷患处。
- 3、风火牙痛：雾水葛10g，煎水含嗽，每日二次。

27、蝇子草

土家语名：二拉实克查

土家语拼音：ef lax sir ker car

国际音标：e³⁵ la⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】银柴胡、岩竹参、石竹笋。

【来源】为石竹科植物蝇子草 *Silene fortunei* Vis.，全草及根入药。

【性味】辛、涩、微苦，凉。

【功效】消肿毒，清热利湿，利咽喉。

【主治】咽喉肿痛，痢疾，白带，尿急症，跌打损伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、挫伤、扭伤、风湿痹痛：蝇子草 15g 加烧酒 150g，或 75%酒精浸泡，取汁外搽伤痛处。
- 2、湿热带下：蝇子草根 15g 金灯藤 金樱子 白毛在各 10g 白槿花 12g。水煎服。
- 3、咽喉肿痛：蝇子草 山豆根 开喉箭各 9g。水煎服。

28、白花狗牙瓣哈

土家语名：哈列阿实思是阿迷

土家语拼音：hax lier ar sir six six ax mif

国际音标：xa⁵⁵ lie²¹ a²¹ si²¹ si⁵⁵ si⁵⁵ a⁵⁵ mi²¹

【别名】崖松、小鹅儿肠。

【来源】为景天科植物细叶景天 *Sedum elatinoides* Franch.，全草入药。

【性味】酸、涩，寒。

【功效】消肿毒，清利湿热。

【主治】小儿丹毒，烧伤烫伤，痢疾。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、小儿丹毒：百花狗牙瓣 15g 银花 连翘 大青叶 一把伞 丹皮 赤芍 败酱草各 9g。水煎服。
- 2、痢疾：百花狗牙瓣 15g 凤尾草 9g。水煎服。
- 3、烫火伤：鲜百花狗牙瓣捣汁涂患处。

29、竹叶莲

土家语名：母业尔他在

土家语拼音：mux ner ex tax lianr

国际音标：mu⁵⁵ ʒie²¹ e⁵⁵ t'a⁵⁵ lian²¹

【别名】白接骨、羊藿。

【来源】为鸭跖草科植物竹叶花 *Polliia japonica* Thunb.，根茎和全草入药。

【性味】辛，平。

【功效】消肿毒，补肺肾。

【主治】腰痛，胸、胃气痛，蛇虫咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

30、黑个良

土家语名：利烂嘎七

土家语拼音：lif lanf gax qir

国际音标：li³⁵ lan³⁵ ka⁵⁵ tɕi²¹

【别名】鸡脚莲、凤丫蕨。

【来源】为铁裸子蕨科植物凤丫蕨 *Coniogramme japonica* (Thumb)

Diels, 枝叶或根入药。

【性味】微辛、甘，寒。

【功效】解毒消肿，活血止痛。

【主治】皮肤肿毒，奶疮，目赤肿毒。

【用量】6~10g。

31、珠兰

土家语名：珠兰

土家语拼音：zux lanr

国际音标：tsu⁵⁵ lan²¹

【别名】雪香兰。

【来源】为金粟兰科植物雪香兰 *Hedyosmum Orientall Merr. et chum*，全草入药。

【性味】微苦、辛，平。

【功效】消肿毒，散瘀止痛。

【主治】乳痈初期，咽喉肿痛，跌打损伤。

【用量】内服 10~15g，外用适量。

【应用经验】奶症：生品珠兰适量，捣烂如泥敷患处，每日一次。

【备考】仍旧慎用。

32、朴树

土家语名：用卡蒙

土家语拼音：pur kar mongr

国际音标：p'u²¹ k'a²¹ muŋ²¹

【别名】子弹树。

【来源】为榆科植物紫弹树 *Celtis biondii* Pamp.，树皮及叶入药。

【性味】苦、涩，凉。

【功效】消肿毒。

【主治】乳痈初期，疮毒溃烂。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

33、米口袋

土家语名：女儿糯贴

土家语拼音：zir er lof tiex

国际音标：tʂi²¹ e²¹ lo³⁵ tʂie⁵⁵

【别名】地丁。

【来源】为豆科植物米口袋 *Gueldenstaedtia multiflora* Bge.，根及全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】消肿毒，散结止痛。

【主治】疔，疮，疖，痈。

【用量】内服 10~30g，外用适量。

34、黄瓜香

土家语名：黄瓜香

土家语拼音：huanr guax xianx

国际音标：xuan²¹ kua⁵⁵ ɕian⁵⁵

【别名】堇菜。

【来源】为堇菜科植物蔓茎堇菜 *Viola diffusa* Ging.，全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】消肿毒，止咳腓脓。

【主治】血劳，百日咳，乳痈，疖疔，毒蛇咬，跌打损伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、痈疽疮疖、外伤出血：鲜黄瓜香捣烂外敷。
- 2、烫火伤：鲜黄瓜香捣汁，外搽。
- 3、淋浊：鲜黄瓜香 30g，水煎服。

35、梨头草

土家语名：卡铁实克查

土家语拼音：kax tex sir ker car

国际音标：ka⁵⁵ tie⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】铧口尖、紫花地丁。

【来源】为堇菜科植物紫花地丁 *Viola philippica* Cav. ssp. munda W. Beck.，全草入药。

【性味】微苦，寒。

【功效】消肿毒，凉血退黄。

【主治】痈疔，丹毒，目赤肿痛，黄疸，泄泻，毒蛇咬伤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】疔疮：生品适量，捣烂敷患处，每日一次。

36、岩地丁

土家语名：阿地丁

土家语拼音：ar dif denx

国际音标：a²¹ ti³⁵ ten⁵⁵

【别名】地黄瓜、岩堇菜。

【来源】为堇菜科植物地黄瓜 *Viola grypoceras* A. Gray, 全草入药。

【性味】微苦，凉。

【功效】消肿毒，化瘀止血。

【主治】咽喉肿痛，疔疮肿毒，跌打损伤，外伤出血。

【用量】内服 3~9g，外用适量。

37、五星草

土家语名：五星实克查

土家语拼音：wux xinx sir ker car

国际音标：wu⁵⁵ ɕin⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】点地梅、喉咙草。

【来源】为报春花科植物点地梅 *Androsaceumbellata* (Lour.) Merr.，全草入药。

【性味】苦、辛，寒。

【功效】消肿毒，利咽止痛。

【主治】乳蛾肿大，口咽肿痛，跌打损伤，百日咳，牙痛，偏头痛。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、蛾子症：五星草 10g 开口箭 6g。每日一剂，水煎含漱三次。
- 2、白口疮：喉咙草 满天星 天青地白适量。用淘米水共捣烂，取汁洗口腔。
- 3、蛾子症（扁桃体炎）：点地梅 10g 射干 10g 开口箭 10g。水煎服。
- 4、粪毒：点地梅焙干，研粉，菜油调敷患处。

【备考】1、化学成分：全草显皂苷、鞣质、酚类、糖类和生物碱反映。粘地梅对离体或在体心脏均有明显地心肌收缩作用，并使心跳停于收缩期；去其皂苷后仍有明显强心作用。2、静脉注射使兔、猫血压升高，并持续兴奋呼吸；对离体肠平滑肌具有兴奋作用。3、乙醇浸液对红细胞有较强的溶血作用。

38、小蜡

土家语名：一蜡被卡蒙

土家语拼音：yir lar bif kar mongr

国际音标: ji²¹ la²¹ pi³⁵ k'a²¹ muŋ²¹

【别名】小鱼蜡树、香叶木。

【来源】为木犀科植物小蜡树 *Ligustrum sinense* Lour, 叶入药。

【性味】苦, 凉。

【功效】消肿毒, 清热止痛。

【主治】黄疸, 痢疾, 肺热咳嗽, 疮疡肿毒。

【用量】内服 6~10g, 外用适量。

39、盾形草

土家语名: 盾形实克查

土家语拼音: dunf xinr sir ker car

国际音标: tun³⁵ ɕin²¹ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】盾果草、铺地银。

【来源】为紫草科植物盾形草 *Thyrocarpus sampsonii* Hance., 全草入药。

【性味】苦, 凉。

【功效】消肿毒, 止痛。

【主治】痢疾, 痈肿疮毒。

【用量】内服 6~10g, 外用适量。

40、烟管头

土家语名: 烟管科巴

土家语拼音: yanx guanx kox bax

国际音标: jan⁵⁵ kuan⁵⁵ k'o⁵⁵ pa⁵⁵

【别名】天名精、野烟秋。

【来源】为菊科植物管烟头草或无天名精 *Carpesium cernuum* L. , 全草入药。

【性味】辛、苦, 寒。

【功效】消肿解毒, 利咽止痛。

【主治】外感发热, 咽喉肿痛, 牙痛, 热泻。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、鼻衄、吐血、毒虫刺螫：天明精 9~15g，水煎服。
- 2、牛皮癣：天明精用 70%乙醇浸泡 1 周，取汁外擦。
- 3、咽喉肿痛：金挖耳鲜草绞汁，调蜜服。
- 4、猴耳疮（腮腺炎）：金挖耳叶 250g 大葱头 4 个。合酒糟子捣合，炒热外敷，并用金挖耳根头 7 个，捣烂泡开水饮汁。
- 5、疮疖肿毒、带状疱疹：金挖耳，捣烂敷患处。
- 6、痔疮：野烟 10~15g，水煎服。

【备注场行小毒。

【备考】2、药理作用：全草煎剂体外试验有杀鼠蛻虫及猪蛔虫的作用。

41、千里光

土家语名：千里关

土家语拼音：qianx lix guanx

国际音标：tɕian⁵⁵ li⁵⁵ kuan⁵⁵

【别名】千里明、九里明、岩生千里光。

【来源】为菊科植物岩生千里光 *Senecio wightii* (DC. ·)Benteh. ，全草入药。

【性味】苦，凉。

【功效】消肿毒，祛风明目。

【主治】肺热人地，乳娥肿痛，肝病，红眼病，皮肤瘙痒。

【用量】内服 15~20g，外用适量。

【应用经验】皮肤格闹疮：千里光 20g 苦参 20g 黄柏 20g 野烟 10g 满天星 10g 冲天炮 10g。水煎取液洗澡用，每日一次。

【备注场行小毒。

42、玉簪花

土家语名：一簪卡普

土家语拼音：yif zanx kax pux

国际音标：ji³⁵ tsan⁵⁵ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】玉泡花、内消花。

【来源】为百合科植物玉簪花 *Hosta plantaginea* (Lam) H · Sieboldian Engl · Ascberson, 根入药。

【性味】甘、辛，寒。

【功效】消肿毒，止痛排脓。

【主治】乳痈，脓耳，瘰疬，痔疮，烧烫伤。

【用量】6~9g。

【应用经验】痔疮：玉簪花根碾水涂肛门周围，每日二次。

【备注】有毒。

第十三章 拔脓毒药

土家语名：热毒撇业药

土家语拼音：ref duf piev nier yaof

国际音标：ze³⁵ tu³⁵ pie⁵³ ɹie²¹ jau³⁵

凡具有消肿散结平疮、除清脓毒邪气功效，用于治疗脓毒病的药物称拔脓毒药。

土家医认为脓毒邪气是火邪、肿毒合并侵犯机体，破骨坏肉后所产生，在局部形成脓包，产生脓液而成。病理变化是脓毒邪气经经脉流到全身，破坏血液、脑髓等。脓毒病共有症状及体征有：1、有火毒病、肿毒病史；2、高热不退，口唇干焦，大便干，小便赤；3、精神萎靡、神志不清、烦躁谵语，甚至昏迷、不省人事，面色暗灰、目无神色；4、舌红绛、苔黄干，脉洪数。

治脓毒病药具有清热、泻火、消肿毒、拔脓毒多种功效，主要用于治疗脓病症。某些药物还兼有生发、通便、止痒、利尿、退黄、行气、止痛功效，经配方用于治脱发、大便干结、皮肤痒、水肿、黄疸、胃病等。

常用治毒药物有：裸朔、九节风、蓖麻、黄花龙牙、奶参、漏芦、红走马胎、神豆腐叶、南瓜木香、红豆、.....。

1、裸朔

土家语名：上艾阿实

土家语拼音：sanf ngax ar sir

国际音标：san³⁵ ŋai⁵⁵ a²¹ si²¹

【别名】白鱼腥草、百部还魂。

【来源】为三百草科植物裸朔 *Gymnotheca chinensis* Decne, 全草入药。

【性味】甘、淡，平。

【功效】排脓毒，消食积。

【主治】疮毒脓疡，小儿食积，脱发。

【用量】内服 10~20g，外用适量。

【应用经验】

- 1、腹胀水肿：水折耳 150g，炖肉吃，或淘米水煎服。
- 2、白带、白浊：水折耳 50g，煮甜酒吃。
- 3、跌打损伤：水折耳 9g，蒸酒服。

2、九节风

土家语名：给梯科保热书

土家语拼音：gex tix kox lox ref sux

国际音标：ke⁵⁵ t'i⁵⁵ k'o⁵⁵ lo⁵⁵ ze³⁵ su⁵⁵

【别名】接骨丹、金粟兰。

【来源】为金粟兰科植物金粟兰 *Chloranthus spicatus* (Thunb. ·)

Makino, 根入药。

【性味】辛、苦，平。

【功效】排脓毒，祛风止痛。

【主治】痈疖，疮痒，风湿疼痛。

【用量】6~10g。

【应用经验】流痰症：九节风 猪娘藤根 刺老苞根 五爪龙各适量。捣烂敷患处，每日一次。

【备注】场行小毒。

3、蓖麻

土家语名：兵马

土家语拼音：binx max

国际音标：pin⁵⁵ ma⁵⁵

【别名】比麻子。

【来源】为大戟科植物蓖麻 *Ricinus communis* L. ♀，种仁或叶入药。

【性味】辛、甘，平。

【功效】拔脓毒，消肿止痒。

【主治】叶治疮疡肿毒、湿疹、皮肤瘙痒。种仁治便秘、胞衣不下、吊茄子、脱肛。

【用量】外用适量。

【备注】有毒。

4、黄花龙牙

土家语名：黄花龙牙

土家语拼音：huar fax longx yar

国际音标：xuan²¹ xua⁵⁵ luŋ⁵⁵ ja²¹

【别名】黄花败酱。

【来源】为败酱科植物黄花龙牙 *Patrinia scabiosaefolia* Fisch, 全草入药。

【性味】苦、辛，微寒。

【功效】排脓毒，化瘀肿。

【主治】肠痈，脓痢，血瘀腹痛，痈疖。

【用量】内服 6~15g，外用适量。

【应用经验】

- 1、风寒感冒：黄花龙牙菜 15g，水煎服。
- 2、腹泻：黄花龙牙菜 30g，水煎服。
- 3、小儿阴缩：黄花龙牙菜 9g 茴香根 9g。水煎服。

5、冬瓜仁

土家语名：冬瓜布里

土家语拼音：dongx guax buf lix

国际音标：tuŋ⁵⁵ kua⁵⁵ pu³⁵ li⁵⁵

【别名】冬瓜子。

【来源】为葫芦科植物冬瓜 *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.，种仁或皮入药。

【性味】甘、淡，凉。

【功效】排脓毒，消臃肿，生津，利尿。

【主治】肺痈，肠痈。

【用量】10~20g。

【应用经验】肺痈症：果朔 30g 乔三七 15g 银花 15g 败将草 15g 红走马胎 10g 冬瓜仁 20g 甘草 5g。每日一剂，水煎二次服。

6、奶参

土家语名：忙策参

土家语拼音：manr cer senx

国际音标：man²¹ ts'e²¹ sen⁵⁵

【别名】山海螺、四叶参。

【来源】为桔梗科植物羊乳 *Codonopsis lanceolat* (siedetzucc) Trautv., 根入药。

【性味】甘、平。

【功效】排脓毒，消肿催乳。

【主治】肺痈，乳痈，肠痈，瘰疬，乳少。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、身体虚弱、头晕头痛：四叶参 60g，水煎汁用汁煮鸡蛋，食蛋服汤。
- 2、阴虚咳嗽：四叶参 15g 百部 麦冬 功劳叶各 9g 贝母 6g。水煎服。

【备考】

1、化学成分：根部含皂甙，还含淀粉 23.65%、葡萄糖 4.81%。

2、药理作用：①四叶参对实验性小鼠咳嗽有镇咳作用。②家兔皮下注射或灌服四叶参煎剂对红细胞及血红蛋白有明显的增加作用，对白细胞有明显的降低作用，但剂量增大时反而没有作用。③有抗疲劳作用，能使小鼠游泳时间延长。④麻醉兔静脉注射或灌服煎剂可使血压下降，呼吸兴奋，并能消除肾上腺素的升压作用。⑤家兔灌服煎剂有明显升高血糖作用。⑥抑菌实验，对肺炎球菌有较强的抑制作用，对甲型链球菌、流感杆菌亦有抑制作用。

7、滤斗草

土家语名：利子实克查

土家语拼音：lif zix sir ker oar

国际音标：li³⁵ tsi⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】漏芦、野兰、大花薊。

【来源】为菊科植物漏芦 *Rhaponticum umiflorum* (L. ·) DC. ，根入药。

【性味】咸、苦，寒。

【功效】排脓毒，通乳。

【主治】乳痈，乳汁不通，猴儿疮，瘰疬。

【用量】6~10g。

【备注】场行小毒。

8、红走马胎

土家语名：免姐走马胎

土家语拼音：mianx jiex zoux max taix

国际音标：mian⁵⁵ tɕie⁵⁵ tsəu⁵⁵ ma⁵⁵ t'ai⁵⁵

【别名】老叶细辛、红背兔耳风。

【来源】为葡科植物红背兔耳风 *Ainsliaea ruhnikolia* Franch, 全草入药。

【性味】辛、苦，平。

【功效】排脓毒，清热退黄。

【主治】肺痈，肺癆痰多，乳痈，黄疸。

【用量】内服 5~15g，外用适量。

9、差珠子

土家语名：泽移时布里

土家语拼音：cer yir sir buf lix

国际音标：ts'e²¹ ji²¹ si²¹ pu³⁵ li⁵⁵

【别名】水薏仁、车珠子、五谷子。

【来源】为禾科植物薏苡 *Coix lachryma~jobi* L. ，种仁入药。

【性味】甘、淡，凉。

【功效】排脓毒，化湿止泻。

【主治】肺痈，肠痈，久泻，白带多，胃癌，养儿肠癌（子宫癌）。

【用量】10~20g。

【应用经验】养二肠（子宫）癌带下脓血症：野辣子 15g 白毛藤 30g 蛇舌草 30g 穿心刺 15g 差珠子仁 30g 红土茯苓 20g 红走马胎 15g 甘草 5g 小败酱草 15g。每日一剂，煎二次服。

【备考】1、对子宫作用，可致流产；2、抗癌作用，抑制癌细胞生长；3、解热镇痛、镇静作用。

10、小败酱草

土家语名：败酱草被亏

土家语拼音：baif jianx caox bif kuix

国际音标：pai³⁵ tɕian⁵⁵ ts'au⁵⁵ pi³⁵ k'ui⁵⁵

【别名】小苦窝麻、小苦麻菜。

【来源】为菊科植物山苦荬 *Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai，根及全草入药。

【性味】苦、微甘，微寒。

【功效】排脓解毒，清热利胆，凉血。

【主治】胆痛症，肠痈，疮疗痈肿，痧气腹痛。

【用量】10~15g。

【备考】对心肌有抑制作用。

11、四叶参

土家语名：尔他惹欸参

土家语拼音：ex tax rex eix senx

国际音标：e⁵⁵ t'a⁵⁵ ze⁵⁵ ei⁵⁵ sen⁵⁵

【别名】奶参、土党参。

【来源】为桔梗科植物羊乳 *Codonopsis lanceolata* Benth. et Hook.，根入药。

【性味】甘，平。

【功效】排脓消痈，益气养阴。

【主治】病后体虚，乳少，肺阴不足，肺痈，乳痈，疮痈肿毒。

【用量】6~10g。

【应用经验】奶疮化脓久不收口症：四叶参根 羊乌根 黄花丁 白芷各 10g 漏节 6g 桔梗 6g 银花 15g 甘草 6g。每日一剂，水煎二次服，忌辛辣、蛋鱼。

【备考】1、有镇咳作用。2、对红细胞及血红蛋白有明显的增加作用，对白细胞有明显的降低作用。3、有抗疲劳作用。4、可使血压下降。5、有明显升高血糖作用。6、对肺炎球菌、甲型链球菌、流感杆菌有抑制作用。

12、败酱草

土家语名：败酱实克查

土家语拼音：baif jianx sir ker car

国际音标：pai³⁵ tɕian⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】苦酱草。

【来源】为十字花科植物菥蓂 *Thlaspi arvense* L. 全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】排脓消肿，清热解毒。

【主治】肠痈，肺痈，目赤，白带，瘀血腹痛，肾病水肿，丹毒。

【用量】10~30g。

【备考】1、有杀菌作用。2、亦可用于痛风，以增加尿酸排泄。

13、神豆腐

土家语名：叶嗲黑欸

土家语拼音：yer dex heix

国际音标：je²¹ te⁵⁵ xei⁵⁵

【别名】斑鸠榨叶、腐婢。

【来源】为马鞭草科植物豆腐木 *Premna microphylla* Turcz. 茎、叶入药。

【性味】苦，寒。

【功效】排脓，消肿，败毒消痈。

【主治】奔波，痢疾，痈疗肿毒，创伤出血。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、三分症(疟疾)：神豆腐叶 9~15g，开水冲泡，于发病前 2 小时服。
- 2、痢疾：神豆腐叶 15g 海金沙藤 15g。水煎服。
- 3、刀斧创伤：新鲜神豆腐叶，捣烂如泥，敷患处，能止血止痛。
- 4、月经推后：斑鸠占根 小血藤根各 9g。水煎服。
- 5、风湿关节炎：斑鸠占根 大风藤各 60g。泡酒服。
- 6、无名肿毒：斑鸠占叶一把，捣绒敷患处。

【备考】

1、化学成分：含萜类化合物。叶含一种**粘液**，可制凉粉，故呼神豆腐。

2、药理作用：①体外试验对金黄色葡萄球菌中度敏感；对宋氏痢疾杆菌轻度敏感。②有抗蛇毒作用：300%水煎剂预先半小时以 0.2ml/10g 剂量给小白鼠灌胃，对眼镜蛇毒保护率为 56%。

[附注]：神豆腐的根亦入药。具有清热解毒、利尿止血作用。用于尿道炎、白浊、淋巴结炎、阑尾炎、烧烫伤、无名肿毒等症。

14、南瓜广木香

土家语名：那土广木香

土家语拼音：laf tux **guanx** mur **xianx**

国际音标：la³⁵ t'u⁵⁵ kuan⁵⁵ mu²¹ **ɕian**⁵⁵

【别名】脓根草。

【来源】为马兜铃科植物广木香 *Aristolochia kwangsiensis* W. Y. Chun et F. C. Howex C. F. Liang，块根入药。

【性味】苦、涩，凉。

【功效】解毒排脓，行气止痛。

【主治】胃痛，风湿痹痛，气子肿痛，巴骨流瘫。

【用量】3~6g。

【应用经验】

- 1、风湿性关节炎疼痛、胃脘胀闷：南瓜广木香适量研成细粉，温开水送服，日

服三次，每次 0.5~1g。

2、漏小肠炎（疝气）、少腹胀痛：南瓜广木香 6g 香血藤 6g 小九龙盘（小杆子）6g 地蜂子 3g。水煎服。

3、骨结核、骨髓炎长久不愈：南瓜广木香 10g 当归 10g 宝铎草根茎 20g 饿蚂蟥 10g。水煎常饮。

15、血藤

土家语名：[贝尔二拉](#)

土家语拼音：miev ef lax

国际音标：mie⁵³ e³⁵ la⁵⁵

【别名】血通、活血藤、鸡血藤、红木通、红藤。

【来源】为木通科植物大血藤 *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.)

Rehd. et wils. 的藤茎。

【性味】苦涩，平。

【功效】排脓毒消痈，活血通络，祛风杀虫。

【主治】风湿痹痛、赤痢、血淋、月经不调、虫积腹痛、跌打损伤。

【用量】6~9g。

【应用经验】

1、风湿腰痛：血藤 15g 铁筷子 8g 铁扁担 12g 黄包袱 12g 螃蟹七 12g 三百棒 15g。泡酒服。

2、跌打损伤：血藤 菊叶三七 景天三七各 30g。水煎服，每日二次。

【备考】

1、化学成分：茎含鞣质约 7%。另含大黄素、大黄素甲醚、毛柳苷、胡萝卜苷、β-谷甾醇、香荚兰酸、原儿茶酸、对香豆酸-对羟基苯乙醇及木质素成分(η)-二氢愈创木脂酸。

2、药理作用：①抑菌作用：25%煎剂对金黄色葡萄球菌、乙型链球菌有极敏感抑菌作用，对大肠杆菌、绿脓杆菌、甲型链球菌、卡他球菌、白色葡萄球菌均有高敏感抑菌作用。②其水溶性提取物给心肌梗死的家兔静脉注射，能使已升高的 ST 段显著下降，改善结孔冠状动脉前降支所致的心肌乳酸代谢紊乱，并缩小

心肌梗死范围；对狗实验性心肌梗死也有治疗作用。③水溶性提取物体内外均可抑制血小板聚集，有促血小板解聚作用，能增加离体豚鼠心脏冠状动脉流量，抑制大鼠血栓形成，提高兔血浆 cAMP 水平，对异丙肾上腺素诱发的大鼠心肌缺血有保护作用。

第十四章 化痰毒药

土家语名：聋色毒化捏药

土家语拼音：longx ser duf huaf niex yaof

国际音标：luŋ⁵⁵ se²¹ tu³⁵ xua³⁵ ʒie⁵⁵ jau³⁵

凡具有化散体内痰液、驱赶体内毒邪功效，用于治疗痰毒病药物称化痰毒药。

土家医认为痰毒邪气一是体内功能活动所产生的废水不能正常排出化生；二是外邪作用于肺，化生痰液入肺内毒邪相搏而成。其病理变化是痰毒通过经脉渗入骨节缝、胸间隙、腹隙间、丸子内、脑内。痰毒病因部位不同、症也不同，表现症状体征各异，共有特点为：局部闷、胀、隐痛、精神状态差、消瘦，病程长；舌胖大、苔白腻，脉滑。

化痰毒药具有化散体内痰液，抑制痰液生产、降低毒性、驱赶毒邪达到消肿散结多种功效，治疗各部痰毒病症。某些化痰毒药还兼有杀虫、止咳平喘、醒神、安神、解痉、消食功效，经配方用于治疗癩癧、咳嗽、痈疔、失眠、食积等病症。

常用治痰毒药物有：癩疔草、狗卵子、白粉藤、蛇盘花、米菖蒲、动蕊花、泥胡菜、小远志、樱桃、南竹笋、猪牙皂。

1、癩子草

土家语名：拉铁石克查

土家语拼音：lax tiex sir ker car

国际音标：la³⁵ tie⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】土常山、大叶老鼠竹。

【来源】为虎耳草科植物腊莲绣球 *Hydrangea strigosa* Rehd. ♂, 根入药。

【性味】苦，微温。

【功效】化痰毒，散结肿。

【主治】痰结肿块，三分症，胸腹胀满，癰癤。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】癰癤症：癰疔草 炮磺 烟尘各适量。用法癰疔草鲜品捣烂，砲不黄、烟尘各研细粉共调匀涂头部患处。

【备考】具有抗菌、抗癌作用。

2、狗卵子

土家语名：哈列列迫

土家语拼音：hax ler lef pev

国际音标：xa⁵⁵ lie²¹ lie³⁵ p'e⁵³

【别名】白蕊。

【来源】为葡萄科植物白蕊 *Ampelopsis japonica* (Thunb. ♂) Makino, 块根入药。

【性味】苦，寒。

【功效】化痰毒，消肿结。

【主治】丸子（淋巴结核），疮疖肿痛，咳嗽痰多。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】九子丸症：狗卵子 15g 铁丁台 10g 雷旦子 10g 冲天炮 10g 猫爪草 15g 猫屎果 10g。每日一剂，煎服。

【备注场行小毒。

3、白粉藤

土家语名：阿实屁屁二拉

土家语拼音：ar sir pif pix ef lax

国际音标：a²¹ si²¹ pi³⁵ pi⁵⁵ e³⁵ la⁵⁵

【别名】酸葡萄。

【来源】为葡萄科植物白粉藤 *Cissus modecoides* Planch. ♂ var *subintegra*

Gagn. •, 根皮入药。

【性味】苦、酸，凉。

【功效】化痰毒，拔毒肿。

【主治】九子丸（颈淋巴结核），疮疡肿毒。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】火瘤症：生白粉藤根皮 生刺老苞根皮 芭蕉根（闷）生六月凉全草 生五爪龙全草各适量。捣烂敷局部，每日一次。

4、蛇盘花

土家语名：窝盘卡普

土家语拼音：wov panr kax pux

国际音标：wo⁵³ p'an²¹ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】银线盘、大叶斑兰。

【来源】为兰科植物大叶斑兰 *Goodyera Schlechtendatiana Reichb. f.*，全草入药。

【性味】淡，寒。

【功效】化痰毒，散结肿。

【主治】丸子肿大，巴骨流（骨结核），痈疽肿毒。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】巴骨瘤痰症：蛇盘花 懒泥巴根皮 猫屎果 蛇每生品各适量。捣烂外敷，每日一次。

5、动蕊花

土家语名：动蕊卡普

土家语拼音：dongf ruif kax pux

国际音标：tuŋ³⁵ zui³⁵ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】冷花草。

【来源】为叫做科植物动蕊花 *Kinostemon ornatum (Hemsl.) Kudo*，全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】祛痰解毒，清热开窍。

【主治】热痰蒙神窍。

【用量】6~10g。

【应用经验】痰蒙油窍症：动蕊花 10g 九节菖蒲 10g 法半夏 10g 陈皮 6g 天麻 10g 鹰爪风 10g 惊风藤根 10g。每日一剂，煎二次服。

6、泥胡菜

土家语名：泥胡菜

土家语拼音：nir hur caif

国际音标：ʒi²¹ xu²¹ ts'ai³⁵

【别名】耐子草。

【来源】为菊科植物泥胡菜 *Hemistepta lyrata* Bge.，全草入药。

【性味】微苦，凉。

【功效】化痰毒，消肿结。

【主治】乳核，九子丸（淋巴结核），痈肿疔疖。

【用量】内服 6~10g，外用适量。

【应用经验】

- 1、各种疮疡：癞子草 一把中各 30g。水煎服。
- 2、刀伤出血：癞子草叶适量，捣烂敷伤处。
- 3、颈火丸症（颈淋巴结炎）：癞子草全草适量，加食盐少许，捣烂、外敷患处。

【备考】1、化学成分：本品含金合欢素、山柰酚-3-O-β-D-葡萄糖（1→6）-α-L-鼠李糖甙、芸香甙、一把伞塞醇乙酸酯、异一把伞塞醇乙酸酯、β-谷甾醇等。

7、石菖蒲

土家语名：阿菖蒲

土家语拼音：ar canx pux

国际音标：a²¹ ts'an⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】水菖蒲。

【来源】为天南**侵占物**石菖蒲 *Acorus gramineus Soland*，根茎入药。

【性味】辛、苦，温。

【功效】化痰毒，醒神开窍。

【主治】痰蒙神窍，神志不清，癫痫，胸腹胀闷。

【用量】6~10g。

8、小远志

土家语名：远志被

土家语拼音：yanx zif bif

国际音标：jan⁵⁵ tsi³⁵ pi³⁵

【别名】宽叶远志、甜远志。

【来源】为远志科植物甜远志 *Polygala sibirica L.*，根入药。

【性味】微辛、苦，微温。

【功效】化痰解毒，安神镇静。

【主治】痰厥症、蛇伤，疔疮，跌打损伤，心悸失眠。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、心悸失眠：小远志 30g，甘草 9g，水煎服。

2、毒蛇咬伤：小远志 30g，切碎，捣烂，加水绞汁服，渣捣烂外敷。

【备考】

1、化学成分：根含三萜皂苷、树脂、脂肪油、远志醇、远志糖。

2、药理作用：①根有溶血作用。②对金黄色葡萄球菌有抑制作用。③有较好的镇静安眠效果。④对乙型肝炎表面抗原有明显的抑制作用。

9、南竹笋

土家语名：南竹**迷迷**

土家语拼音：lanr zur mif miv

国际音标：lan²¹ tsu²¹ mi³⁵ mi⁵⁵

【别名】毛竹笋。

【来源】为禾植物毛竹 *Phyllostachys pubescens* Mazel, 嫩茎（苗）入药。

【性味】甘，寒。

【功效】解毒化痰，消食。

【主治】刻地涎过多，小儿痘疹不出，食积胀满，火伤。

【用量】6~10g。

10、猪牙皂

土家语名：子牙皂

土家语拼音：ziv yar zaof

国际音标：tsi⁵³ ja²¹ tsau³⁵

【别名】牙皂。

【来源】为豆科植物皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam., 果实入药。

【性味】辛，温。

【功效】祛痰涎毒，开窍，解痉。

【主治】咳嗽气喘，猝然昏厥，癫痫痰盛，中风牙关紧闭。

【用量】3~6g。

【应用经验】

【备注】有毒，能杀死丝虫幼虫。

【备考】有溶血作用。

11、空心杆

土家语名：空心杆

土家语拼音：kongx xinx ganx

国际音标：k'uŋ⁵⁵ ɕin⁵⁵ kan⁵⁵

【别名】花秤杆。

【来源】为蔷薇科植物狭叶绣线菊 *Spiraea japonica* L. F. var. *acuminata* Franch. 的全草。

【性味】微苦，平。

【功效】解毒生肌，通经，通便利尿。

【主治】流痰（慢性骨髓炎）、闭经、月经不调、便秘腹胀、小便不利、外伤出血。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、流痰（慢性骨髓炎）：鲜叶适量捣烂或干叶研粉适量，加酒调敷瘰管口，胶布固定，每天换药一次，连敷3~4周。

2、小便不利、月经不调：空心杆全草 车前草各15g。水煎服。

3、外伤出血：鲜嫩叶适量，捣烂敷患处。

第十五章 驱兽毒药

土家语名：谢写毒职业药

土家语拼音：xief xiev duf jiev nier yaof

国际音标：ɕie³⁵ ɕie⁵³ tu³⁵ tɕie³⁵ nie²¹ jau³⁵

凡具有驱赶机体中动物毒邪、消肿止痛，用于治疗有毒动物咬伤或误食，人体中毒、局部红肿溃烂的药物称驱兽毒药。

土家医认为某些动物体内含有对人体致病毒邪，或动物本身无毒邪，患病后体内含毒，人通过食用或被有毒动物咬伤后使人患病。其病理变化是首先伤及皮肤或口腔、肚肠，后到气血、眼神，出现气血逆乱，眼神失控病理变化。因兽毒侵入部位不同，种类不同，出现不同的临床症状和体征。常见的主要表现有：伤口红、肿、痛，以及上腹痛，恶心呕吐或腹泻，重者出现神志不清、惊厥抽搐，甚至危及生命。

驱兽毒药具有驱赶、化散、解除体内毒邪、消肿止痛、保护受伤部位作用，主要用于治疗兽毒病。某些药还兼有杀虫、活血、清热、止血、止痛、利尿、止疟、祛风、散结等功效，经配方用于治疗虫症、血瘀症、热病、出血症、痛症、水肿症、疟疾、风痛症、丸子症等。

常用驱兽毒药有：小凤尾草、金鸡尾、烟叶、斑叶兰、一支箭、一点白、铁灯台、山蚂蝗、大汗、小仙桃草、小岩青菜、千年矮、孔雀尾、灯盏七、花蛇一支箭、杯子七、细梗胡枝子、急解索、海金子、黄豆七、万年青、长蕊杜鹃、土常山、紫竹根、羊豆角、红娘子、相思虫、网蜘蛛、大芫菁。

1、小凤尾草

土家语名：日阿列碰被亏

土家语拼音：rar ler pongf bif kuix

国际音标：za²¹ lie²¹ p·uŋ³⁵ pi³⁵ k'ui⁵⁵

【别名】猪毛草。

【来源】为凤尾蕨科植物小凤尾草 *Pteris henryi* Christ，全草入药。

【性味】苦、涩，凉。

【功效】驱赶狗毒，消肿止痛。

【主治】抗日咬伤，烫火伤，刀伤以及便血，带下。

【用量】6~9g。

2、红荷叶

土家语名：面姐萨尔他

土家语拼音：miax jiex ngoux ex tax

国际音标: mian⁵⁵ tɕie⁵⁵ ŋəu⁵⁵ e⁵⁵ t'a⁵⁵

【别名】巴巴叶树、岩麻。

【来源】为大戟科植物山麻杆 *Alchornea davidii* Franch.，茎皮及叶入药。

【性味】淡，平。

【功效】驱赶癫狗、蛇毒，驱虫，止痛。

【主治】风湿关节炎，狂犬咬伤，蛇伤，蟠虫症。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、蛇咬伤：红荷叶适量，捣烂敷患处。
- 2、蛔虫病：红荷叶 3g，研粉，吞服。
- 3、风湿痹痛症：红荷叶根 9g 牛马藤 石蜂子（云南石仙桃）松节各 30g。泡酒服。

3、金鸡尾

土家语名：查七列碰

土家语拼音：car qir lier pongf

国际音标：ts'a²¹ tɕi²¹ lie²¹ p'uŋ³⁵

【别名】小叶凤尾草、钢金叉。

【来源】为凤尾蕨科植物金鸡尾 *Pteris dactylina* Hook.，全草入药。

【性味】淡、微涩，平。

【功效】驱狂犬毒，清热利湿，定惊，利尿。

【主治】狂犬咬伤，消肿止痛，清热定惊，猴耳疮，丸子肿痛，小儿急惊风。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、狂犬咬伤：金鸡尾 杨梅皮 化梅皮各 6g。煎水兑酒服，一日三次，一次半杯。
- 2、水肿：金鸡尾 水菖蒲 萝卜子 臭草根各 6g。煮石膏豆腐，早晚各吃一次。
- 3、热泻、痢疾：金鸡尾 30~60g，水煎服。

4、烟叶

土家语名：烟尔他

土家语拼音：yanx ex tax

国际音标：jan⁵⁵ e⁵⁵ t'a⁵⁵

【别名】日友烟、土烟。

【来源】为茄科植物土烟 *Nicotiana tabacum* L.，叶入药。

【性味】辛，温。

【功效】驱赶犬、蛇毒，杀虫，消肿。

【主治】蛇犬咬伤，食滞饱胀，气结疼痛，痈疽，疔疮，无名肿毒。

【用量】3~6g。

【应用经验】

- 1、无名肿毒、对口疮：鲜烟叶和红糖捣烂外敷。
- 2、背痛：烟叶 9~15g，酒水煎服或捣烂外敷。
- 3、狂犬咬伤：鲜烟叶适量，捣汁一汤匙和红酒炖服。

【备注】有大毒。

【备考】

1、化学成分：全草含烟碱、新烟碱、去氧新烟碱等多种生物碱、芸香苷、苹果酸、柠檬酸、脂肪油。生物碱含量达 1%-9%，其中以左旋烟碱、毒藜碱、去氢毒藜碱较为主要。

2、药理作用：①对植物神经的作用：本品所含烟碱，小剂量作用于植物神经节细胞的胆碱受体，引起去极化兴奋；大剂量使去极过程持久不恢复，表现为节细胞的先兴奋而后迅速转入麻痹，小量烟碱尚可刺激颈动脉化学感受器，引起呼吸兴奋和血压上升。②局部作用：本品所含其他成分吡啶、糖醛和焦油等，都有刺激性，长期刺激可致慢性咽炎，甚至发生口、唇、舌、食道及呼吸道的恶性肿瘤，肺癌与吸烟有关。③毒性：烟草的烟对家兔可致慢性中毒，产生动脉粥样硬化、视网膜萎缩等中毒症状，严重中毒时，可出现痉挛及呼吸中枢麻痹而死亡。

5、花个良

土家语名：卡普尔他七

土家语拼音: kax pux ex tax qir

国际音标: k'a⁵⁵ p'u⁵⁵ e⁵⁵ t'a⁵⁵ tai²¹

【别名】斑叶兰、蕲蛇药。

【来源】为兰科植物大斑叶兰 *Goodyera schlechtendaliana* Reichb. F. 和小斑叶兰 *G. repens* (L.) R. Br.，全草入药。

【性味】淡，寒。

【功效】驱赶蛇毒，消肿止痛。

【主治】**仍旧**蛇咬伤，骨节疼痛，跌打损伤，痈肿疮疖。

【用量】3~6g。

【应用经验】

- 1、肺癆（肺结核）咳嗽：斑叶兰 15g，炖肉吃。
- 2、毒蛇咬伤：斑叶兰 3~6g 牡蒿叶 6g 土细辛 3g 鸳鸯花 9~12g。水煎服，每日三次饭前服。
- 3、骨节疼痛不红不肿者：斑叶兰捣烂，用酒炒热，外包痛处，每日换一次。
- 4、肺虚咳嗽：斑叶兰 15g 款冬花 10g 知母 5g 甘草 15g。水煎服。

6、一支箭

土家语名：日阿那致

土家语拼音: rax naf zif

国际音标: ze⁵⁵ na³⁵ tsi³⁵

【别名】独叶一支箭。

【来源】为瓶尔小草科植物瓶尔小草 *Ophioglossum Pedunculosum* Desv.，全草入药。

【性味】甘、酸，凉。

【功效】驱赶蛇毒，消肿止痛。

【主治】**仍旧**蛇咬伤，疔疮肿毒，乳痛，腕腹胀痛，跌打损伤。

【用量】6~10g。

7、一点白

土家语名：江泽二拉

土家语拼音：manr cer ef lax

国际音标：man²¹ ts'e²¹ e³⁵ la⁵⁵

【别名】奶浆藤。

【来源】为萝藦科植物一点白 *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino 的全草或果内白绒毛入药。

【性味】甘、涩，温。

【功效】驱赶蛇毒，败毒消肿。

【主治】仍旧蛇咬伤，奶痈。

【用量】6~10g。

【应用经验】蛇、虫咬伤：全草捣烂挤汁内服，外敷患处。

【备考】

1、化学成分：植物体各部分均含多种苷，糖的部分有 D-加大麻糖、D-沙门糖、L-夹竹桃糖、D-洋地黄毒糖等。苷元部分，地上部分含肉珊瑚苷元、萝藦苷元、鸟吞定、帕古拉林；根部分含以上成分外并含有苯酰拉马弄、脱酰牛皮苷元，种子含诺曼内苷元、脱酰牛皮消苷元、肉珊瑚苷元、萝藦苷元。

2、药理作用：①抑菌试验，萝藦对甲型链球菌有抑制作用。②琥珀酸对蝮蛇及眼镜蛇中毒小鼠保护作用较小，其钠盐对眼镜蛇中毒保护率为 87.7%。

8、蚂蟥蝗

土家语名：抗苦撒拉

土家语拼音：kanr kux piex lax

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ p'ie⁵⁵ la⁵⁵

【别名】铁扫把。

【来源】为豆科植物山蚂蝗 *Desmodium racemosum* (Thunb.) Dc.，全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】驱赶蛇毒，消肿止痛。

【主治】仍旧蛇咬伤，痞积，跌打损伤，风温关节炎。

【用量】6~9g。

【应用经验】

1、风湿痹痛：山蚂蝗 5g，猪脚一个，加水久炖服汤及猪脚。

2 走后胎症：山蚂蝗 12g 狼把草 6g 望江南全草 15g。水煎服。

【备考】

1、化学成分：山蚂蝗叶含山奈苷。

2、药理作用：山蚂蝗茎、叶对金黄色葡萄球菌极为敏感；对乙型溶血性链球菌、白喉杆菌、痢疾杆菌也有较强抑制作用；对炭疽杆菌、绿脓杆菌也有一定的抑制作用。

9、大汗

土家语名：古泽此巴

土家语拼音：gux cer cix bax

国际音标：ku⁵⁵ ts'e²¹ ts'i⁵⁵ pa⁵⁵

【别名】青木香、汉中防己。

【来源】为马兜铃科植物青木香 *Aristolochia heterophylla* Hemsl.，根入药。

【性味】辛、苦，寒。

【功效】驱赶蛇虫毒，行气止痛，清热。

【主治】蛇虫咬伤，脘腹胀痛，疝气痛，痈肿，。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、胃气胀症：大汗 缬草 尿珠子根各 6g 隔山撬 鱼腥草 吴萸根各 9g ，
鱼鳅串 通花根各 15g。水煎服。

2、毒蛇咬伤：大汗 24g 雄黄 白芷各 9g。捣烂厚敷伤口及肿胀处，24 小时内
消肿；内服：大汗 12g 黄荆叶 白芷 五灵脂 大黄各 9g。水煎服。

【备考】酸能提高吞噬细胞活力。

10、小仙桃草

土家语名：仙桃草被

土家语拼音：xianx taor caox bif

国际音标: ɕian⁵⁵ t'au²¹ ts'au⁵⁵ pi³⁵

【别名】蚊母草。

【来源】为玄参科植物小婆婆纳 *Veronica serpyllifolia* L.，带虫瘿的全草入药。

【性味】苦、涩，平。

【功效】驱赶蛇毒，消肿止痛。

【主治】蛇咬伤，跌打损伤，创伤出血。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、蛇咬伤：小仙桃草、冲天炮、雄黄各适量，捣敷。

2、跌打损伤：小仙桃草、扣子七、红花、桃仁、铁乌用各 15g，泡酒服。

11、小岩青菜

土家语名：阿信捧被

土家语拼音：ar xinf pongx bif

国际音标：a²¹ ɕin³⁵ p'uŋ⁵⁵ pi³⁵

【别名】青菜还阳、岩豆办菜。

【来源】为苦苣苔科植物岩豆菜 *Briggsia mihieri* (Franch.) Craib.，全草入药。

【性味】苦，微温。

【功效】驱赶蛇毒，化瘀消肿。

【主治】蛇咬伤，跌打损伤，疔疮肿毒。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、虫蛇咬伤：小岩青菜 10g 小蛇参 6g 虎杖根 6g 四块瓦 40g。水煎内服，外洗伤口。

2、跌打损伤青肿：小岩青菜、透骨消各适量，捣烂外敷患处。

12、千年矮

土家语名：千年矮

土家语拼音：qianx nianr ngaix

国际音标：tɕian⁵⁵ ɳian²¹ ŋai⁵⁵

【别名】印章木。

【来源】为蔷薇科植物植匍伏柃 *Cotoneaster adpressus* Bois, 全草入药。

【性味】苦，微温。

【功效】驱赶蛇毒。

【主治】仍旧蛇咬伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】仍旧蛇咬伤：千年矮叶，雷旦叶各适量，鲜品捣烂外敷伤口周围。每日1~二次。

13、孔雀尾

土家语名：孔雀列碰

土家语拼音：kongx qiaor lier pongf

国际音标：k'uj⁵⁵ tɕiau²¹ lie²¹ p'uj³⁵

【别名】旋鸡尾、金线蕨。

【来源】为碗蕨科植物溪洞碗蕨 *Denstaedtia wilfordii* (Moore) Christ, 全草入药。

【性味】苦，微寒。

【功效】驱狗、蜈蚣、蛇毒，生肌长肉。

【主治】抗日咬伤，蛇伤，蜈蚣咬伤，刀伤，烫伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、蛇伤、蜈蚣咬伤、刀伤、烫伤：鲜草捣烂外敷。

2、狗咬伤、久溃不愈：孔雀尾 15g 鱼腥草 15g。捣烂敷患处。

14、灯个良

土家语名：灯盏七

土家语拼音: denx zanx qir

国际音标: ten⁵⁵ tsan⁵⁵ tɕi²¹

【别名】灯盏草、一柱草。

【来源】为菊科植物粗齿兔耳风 *Ainsliaea grossedentata* Franch.，全草入药。

【性味】辛、微甘，平。

【功效】驱赶蛇毒，散寒镇痛。

【主治】仍旧蛇咬伤，风寒头痛，胃寒疼痛，痈肿疮毒。

【用量】6~10g。

【应用经验】

15、花蛇一支箭

土家语名: 窝卡普日阿那致

土家语拼音: wov kax pux rax naf zif

国际音标: wo⁵³ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵ za⁵⁵ ʒa³⁵ tsi³⁵

【别名】降龙草、蛇剑草。

【来源】为兰科植物朱兰 *Pogonia japonica* Rchb. f.，全草入药。

【性味】微甘、辛，寒。

【功效】驱赶蛇毒，消肿止血。

【主治】蛇咬伤，痈疽疮毒，外伤出血，肋痛，胆痛。

【用量】6~10g。

【应用经验】

16、杯个良

土家语名: 杯子七

土家语拼音: beix zix qir

国际音标: pei⁵⁵ tsi⁵⁵ tɕi²¹

【别名】蒜果七、毛慈菇。

【来源】为兰科植物独蒜兰 *Pleione bulbocodioides* (Franch.) Rolfe，球茎入药。

【性味】甘、微辛，寒。

【功效】驱赶蛇、蜈蚣毒，消肿散结。

【主治】蛇咬伤，蜈蚣咬伤，痈疽疔毒，九子丸症。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、蜈蚣咬伤：杯子七鲜品捣烂，用木梓油调敷患处。

2、丸子肿痛症、蛇咬伤：杯子七适量，研细，外敷患处；或用本品 3g 水煎服。

【备注】场行小毒。

17、胡枝子

土家语名：胡枝子

土家语拼音：hur zix zix

国际音标：xu²¹ tsi⁵⁵ tsi⁵⁵

【别名】豆藤。

【来源】为豆科植物细梗胡枝子 *Lespedeza uirgata* (Thunb.) Dc.，全草入药。

【性味】苦，微寒。

【功效】驱赶蛇虫毒，消肿止痛。

【主治】虫蛇咬伤，痈疮肿毒，疔肿。

【用量】10~15g。

18、急解索

土家语名：唯的二拉黑欸

土家语拼音：weir dix ef lax heif

国际音标：wei²¹ ti⁵⁵ e³⁵ la⁵⁵ xei³⁵

【别名】细木草、瓜仁草、半边莲。

【来源】为桔梗科植物半边莲 *Lobelia chinensis* Lour.，全草入药。

【性味】辛，平。

【功效】驱蛇虫毒，利尿消肿，抗癌攻毒。

【主治】蛇虫咬伤，中板症，疔肿，蛾子肿大，肝癌、肠痈。

【用量】10~15g。

【应用经验】

- 1、肚气痛及胃疡症：小蛇参 10g 红毛七 6g 文王一支笔 6g。共研细末，温开水送服，每服 0.5~2g。
- 2、虫蛇咬伤：小蛇参鲜叶或根茎捣烂外敷。
- 3、痢疾腹泻：小蛇参全草 10g 地苦胆 10g 乌龟七 10g。水煎服。
- 4、痈疔肿毒、扭伤肿痛：鲜急解索捣烂，敷患处。
- 5、毒蛇咬伤：鲜急解索捣烂（或加雄黄、或加水慈姑、鱼腥草）外敷，并用鲜品 30-60g，水煎服。
- 6、腹水、（肾炎）浮肿：急解索 15~30g（鲜品 60g），水煎服。

【备考】

1、化学成分：含山埂菜碱、山埂菜酮碱、山埂菜醇碱和异山埂菜酮碱等多种生物碱。根含马兜铃酸 A、马兜铃内酰胺-β-D-葡萄糖甙、尿囊素和 Eupomate-noid-7。

2、药理作用：①半边莲对实验动物和正常人体均有显著的利尿作用，不仅使尿量增加，而且也增加了氯化物的排泄，在人体其利尿效力仅次于氨茶碱，但比咖啡因、利尿素均强。②半边莲煎剂、流浸膏、浸膏静脉注射，对实验动物有兴奋呼吸、降低血压等作用。煎剂对离体蛙心、蟾蜍心脏有直接抑制作用，极大剂量则可使实验动物产生呼吸麻痹和心跳停止而死亡。③半边莲注射于毒蛇咬伤的狗，有一定的保护作用。④抑菌试验：对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、福氏痢疾杆菌、大肠杆菌、绿脓杆菌均有抑制作用。⑤对小鼠剪尾的出血，显示止血作用。

19、海金子

土家语名：海金子

土家语拼音：haix jinx zix

国际音标：xai⁵⁵ tɕin⁵⁵ tsi⁵⁵

【别名】钉桐皮。

【来源】为海桐科植物海金子 *Pittosporum illicioides*. Mak. 根或根皮入药。

【性味】苦，微温。

【功效】驱赶蛇毒，活络止痛。

【主治】**仍旧**蛇咬伤，疔疮疖痛，关节肿痛。

【用量】10~15g。

【应用经验】**痛肿红火欣痛**：海金子鲜叶捣烂贴痛周围，每日一次。

20、黄个良

土家语名：弃布里七

土家语拼音：qif buf lix qir

国际音标：tɕi³⁵ pu³⁵ li⁵⁵ tɕi²¹

【别名】饿蚂蝗。

【来源】为豆科植物饿蚂蝗 *Desmodium sambuense* (D. Don) De.，全草入药。

【性味】甘，平。

【功效】驱赶蛇毒，健胃止痛。

【主治】**仍旧**蛇咬伤，胃痛，疝积。

【用量】10~15g。

【应用经验】

1、胃痛、疝积：黄豆七根 9~30g，水煎服。

2、毒蛇咬伤：黄豆七全草 30g，水煎服，并用鲜叶适量，捣烂外敷伤口周围。

21、万年青

土家语名：万年信嘎

土家语拼音：wanf nianr xinf gax

国际音标：wan³⁵ nian²¹ ɕin³⁵ ka⁵⁵

【别名】千年矮、细叶黄杨。

【来源】为黄杨科植物万年青 *Buxus harlandii* Hance，叶入药。

【性味】苦，平。

【功效】驱狂犬毒。

【主治】**癫狗咬伤**。

【用量】10~30g。

22、长花杜鹃

土家语名：长花恰亏哈

土家语拼音：canr huax qiar kuif har

国际音标：ts'an²¹ xua⁵⁵ tɕia²¹ k'ui³⁵ xa²¹

【别名】映山红。

【来源】为杜鹃花科植物长蕊杜鹃 *Rhododendron nstamineum* Franch, 叶入药。

【性味】苦，凉。

【功效】驱攻犬毒，醒神。

【主治】狂犬咬伤

【用量】10~30g。

23、土常山

土家语名：翻天印

土家语拼音：nuax tianx yenf

国际音标：xuan⁵⁵ t'ian²¹ jen⁵⁵

【别名】狗屎木、微毛山矾。

【来源】为山矾科植物土常山 *Symplocos wikstroemiifolid* Hay, 根入药。

【性味】苦、涩，凉。

【功效】驱攻犬蛇毒，退疟热。

【主治】狂犬病，毒蛇咬伤，三分症（疟疾）。

【用量】内服6~10g，外用适量。

【备注】有毒。

24、紫竹根

土家语名：母业烂嘎机纳

土家语拼音：mux nier lanf gax jix lar

国际音标：mu⁵⁵ ɕie²¹ lan³⁵ ka⁵⁵ tɕi⁵⁵ la²¹

【别名】黑竹根。

【来源】为禾木科植物紫竹 *Phyllostachys nigra* (Lodd.) Munro.，根茎入药。

【性味】苦，凉。

【功效】驱攻犬毒，祛风，破瘀。

【主治】狂犬咬伤，抽风，气血积滞，经闭。

【用量】10~30g。

【应用经验】癫狗咬伤：黑竹根 30g 千年矮树 30g 红娘 3 个 大芫菁 3 个。
每日一剂，水煎二次服，连服 7 天。

25、红娘

土家语名：免姐阿捏

土家语拼音：mianx jiex ar niex

国际音标：mian⁵⁵ tɕie⁵⁵ a²¹ ɲie⁵⁵

【别名】红黑胡子虫。

【来源】为蝉科昆虫红娘子 *Huechys sanguinea* De Geer，全体入药。

【性味】咸，温。

【功效】驱攻狂犬毒，散结肿。

【主治】狂犬咬伤，九子丸症。

【用量】每次 3~5 个 (0.2g~0.3g)，去翅研粉服。

【应用经验】九子丸症：红娘虫 3 个去翅，放入鸡蛋内者至蛋熟，吃蛋，每次 1 个蛋，每日一次。

【备注】有剧毒。

26、相思虫

土家语名：相思铁迫

土家语拼音：xianx six tiex per

国际音标：ɕian⁵⁵ si⁵⁵ tie⁵⁵ p'e²¹

【别名】青娘虫。

【来源】为芫青科昆虫相思虫 *Lytta caraganae* Paiias.，全虫入药。

【性味】咸、微苦，温。

【功效】驱攻狂犬毒，散结肿。

【主治】狂犬咬伤，瘰癧。

【用量】每次 3~5 个 (0.1g~0.3g)，去翅研粉服。

【备注】有剧毒。

27、猫爪刺

土家语名：莫吉迷他色

土家语拼音：mor jir mif tax ser

国际音标：mo²¹ tɕi²¹ mi³⁵ t'a⁵⁵ se²¹

【别名】大蛇舌草、蛇不过。

【来源】为蓼科植物小箭叶蓼 *Polygonum sieboldii* Meisn. 和大箭叶蓼 *P. sagittifolium* Levl. et Vant.，果实或全入药。

【性味】酸、涩，平。

【功效】驱蛇、狗毒，祛风除湿，清热解毒，止痛止痒。

【主治】疮疖肿毒，瘰癧，带状疱疹，湿疹，皮肤瘙痒。

【用量】10~15g。

【应用经验】

1、咽喉痛：鲜大箭叶捣烂，取汁，加醋适量含漱。

2、奶疮：鲜大箭 30~60g，水煎酌加酒服，渣捣烂加热外敷患处。

28、网蜘蛛

土家语名：网补此

土家语拼音：wanx bux cix

国际音标：wan⁵⁵ pu⁵⁵ ts'i⁵⁵

【别名】大腹网蛛、蜘蛛。

【来源】为圆网科大腹圆网蛛 *Aranea ventricosa* (L. • Koch)，虫体去足入药。

【性味】咸，温。

【功效】攻毒祛风。

【主治】蜈蚣咬伤，蜂螫伤，疮疡，中风口歪。

【用量】多外用，内服 0.5~1g/次。

【备注】有毒。

第十六章 解食毒药

土家语名：叶嘎毒改业药

土家语拼音：yer gaf duf gaix nier yaof

国际音标：je²¹ ka³⁵ tu³⁵ kai⁵⁵ ʒie²¹ jau³⁵

凡具有消除肚肠毒物、化解体内毒邪的功效，用于治疗食毒病的药物称解食毒药。

土家医认为食毒病邪包括毒物和毒气两类毒邪，通过食用入体内而发病。毒物包括有毒食品、有毒药物，有毒动植物，气毒为变质食物。食毒入体内肚肠先受之，后经血到全身，对人体造成严重的伤害，引起胃膜受损和功能紊乱，气血失调、神志模糊病理变化。食毒病因种类不同，毒邪量不同，故临床症状和体征各异，一般有：恶心呕吐、肚痛、腹痛、腹泻、心烦心慌，甚至不省人事症状和舌红苔白或黄脉数或紧等体征。

解食毒药具有消除肚肠毒物，化解体内毒邪，缓解临床症状，恢复气血功能的功效，主要用于治疗食毒病。某些药物还兼有行气、止呕、消食、化积、止痛、解蛇毒、杀虫功效，经配方用于治疗气滞症、呕吐症、食积症、胃脘痛症、腹痛症、毒蛇咬伤症、虫症等。

解食毒药包括：解药物毒、解食物毒和解酒毒三大类。

其中：一：解药物中毒的药分别有（1）解砒毒：白芷，防风，土茯苓，小野鸡尾，岗梅，金粉蕨，积雪草；（2）解汞毒：土茯苓，赤石脂，小野鸡尾，金钱草；（3）解铝毒：党参，大青叶，鸡血藤，菊花，甘草，木贼，金钱草；（4）解苯毒：升麻，女真子，旱莲草，岗念根。（5）解天南星毒：生姜，乌头，半夏；（6）解钩吻毒：三叉苦，松树精；（7）解草乌毒：千金坠，刮金板；（8）解雷公藤毒：萆解，连钱草，在风软乌韭。（9）解农药（有机磷）毒：生甘草，滑石粉，曼陀螺花，天仙子（见《中药学》），凤尾草，金花草，乌蕨，鸡矢藤。

二：解食物中毒的药物分别有（1）解鱼蟹毒：苏叶，生姜，芦根；（2）解木薯

类：厚皮树，乌韭，金粉厥；（3）解菠萝毒：葫芦茶。

三：解酒中毒的药有葛（花、根），松花粉，枳椇，虎耳还阳。

1 种心心树

土家语名：起布里卡蒙

土家语拼音：qix buf lix kar mongr

国际音标：tɕi⁵⁵ pu³⁵ li⁵⁵ k'a²¹ muŋ²¹

【别名】百解、土甘草。

【来源】为冬青科植物梅叶冬青 *Ilex asprella* (Hook. et Arn.) Champ. et Benth.，根入药。

【性味】苦、甘，寒。

【功效】解食毒、药毒，清热生津，活血止痛。

【主治】食物、药物中毒，感冒头痛，热病燥酒，淋病，痈毒，热泻。

【用量】100~200g。

【应用经验】毒草中毒症：岗梅鲜根 100g 生甘草 30g。每日一剂，水煎三次服。

【备注】治食野菌或砒霜中毒：岗梅鲜根四两，水煎服。

2、葫芦茶

土家语名：葫芦旦阿古

土家语拼音：hur lur raf gux

国际音标：xu²¹ lu²¹ za³⁵ ku⁵⁵

【别名】地马庆。

【来源】为豆科植物葫芦茶 *Desmodium triquetrum* (L.) DC.，全草入药。

【性味】苦、涩，凉。

【功效】解果（菠萝）毒，消滞杀虫。

【主治】菠萝中毒，咽痛，咳血，痢疾，黄疸，钩虫病，疳积，疮疥等。

【用量】20~30g。

【应用经验】菠萝中毒症：葫芦茶 50g。水煎当茶饮。

3、厚皮树

土家语名：他爬那卡蒙

土家语拼音：tax par laf kar mongr

国际音标：t'a⁵⁵ p'a²¹ la³⁵ k'a²¹ muŋ²¹

【别名】喃木。

【来源】为漆树科植物厚皮树 *Lannea grandis* (Dennst.) Engl.，根皮入药。

【性味】淡、涩，凉。

【功效】解河豚毒，合骨。

【主治】河豚鱼中毒，骨折。

【用量】100~200g。

【应用经验】

1、河豚鱼中毒症：厚皮树内白皮 50g 红苏麻 30g。每日一剂，水煎二次服，忌辛、辣。

2、河豚鱼中毒：喃木（二层皮）二至四两。加水 300~600 毫升，煎 200~400 毫升，顿服或灌肠。

4、金粉藤

土家语名：科屁屁二拉

土家语拼音：kox pif pix ef lax

国际音标：k'o⁵⁵ pi³⁵ pi⁵⁵ e³⁵ la⁵⁵

【别名】金粉蕨、半边旗。

【来源】为膜蕨科植物半边旗 *Mecodium microsorum* (V. d .B.) Chung，全草入药。

【性味】甘、淡，凉。

【功效】解野菜毒，清热退黄，消肿止血。

【主治】仍旧蛇咬伤，痢疾，热泻，黄疸，外伤出血，疮疡疔肿。

【用量】50~100g。

【应用经验】

5、积雪草

土家语名：积雪实克查

土家语拼音：jir xier sir ker car

国际音标：tɕi²¹ ɕie²¹ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】铜钱草、连线草、崩大碗。

【来源】为伞形科植物积雪草 *Centella asiatica* (L.) Urban, 全草入药。

【性味】淡、辛，寒。

【功效】解砒霜毒，消肿利尿。

【主治】砒霜中毒，咽喉肿痛，热泻，肾病水肿，湿疹，疔痈肿毒。

【用量】100~200g。

【应用经验】慢性砒霜中毒症：积雪草 30g 三叉苦叶 30g。每日一剂，水煎二次服。

6、三丫苦叶

土家语名：三丫苦尔他

土家语拼音：sanx yax kux ex tax

国际音标：sna⁵⁵ ja⁵⁵ k'u⁵⁵ e⁵⁵ t'a⁵⁵

【别名】三丫苦、三叉虎、三枝枪。

【来源】为芸香科植物三丫苦 *Evodia tepta* (Spr.) Merr., 叶入药。

【性味】苦，寒。

【功效】解钩吻毒，除瘟，祛风祛湿。

【主治】咽喉肿痛，黄疸，风湿，疮疡，钩吻中毒，鼠咬伤。

【用量】50~100g。

【应用经验】钩吻中毒症：三叶苦叶 100g，水煎当茶饮，每日一剂。

7、千金坠

土家语名：千斤坠

土家语拼音：qianx jinx zuif

国际音标：tɕian⁵⁵ tɕin⁵⁵ tsui³⁵

【别名】千金子，滩板救。

【来源】为大戟科植物千金子 *Euphorbia lathyris* L.，种子入药。

【性味】辛，温。

【功效】解蛊毒、药毒，逐水消肿，破癥杀虫。

【主治】水肿腮痛，痰饮宿滞，癥瘕积聚，疮毒，中蛊，恶草、菰子、菌蕈，中毒，死马肉、河豚毒。

【用量】10~20g。

【备注】有毒。

8、岗稔根

土家语名：岗稔根

土家语拼音：ganx renf genx

国际音标：kan⁵⁵ zen³⁵ ken⁵⁵

【别名】山稔根。

【来源】为桃金娘科植物 *Rhodomyrtus tomentosa* (Ait.) Hassk.，根入药。

【性味】甘、微酸，性平。

【功效】解苯毒，祛风除湿，止痛止血。

【主治】苯中毒，肝病，血崩，胃痛，风湿病，瘰疬，癥瘕。

【用量】10~15g。

9、松花粉

土家语名：猫枞卡普屁屁

土家语拼音：maox congr kax pux pif pix

国际音标：mau⁵⁵ ts'uj²¹ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵ p'i³⁵ pi⁵⁵

【别名】松花、松黄。

【来源】为松科植物马尾松 *Pinus massoniana* Lamb.，花粉入药。

【性味】甘，温。

【功效】解酒毒，祛风益气，收湿，止血。

【主治】头眩晕，中虚胃痛，诸疮湿烂，创伤血，醉酒。

【用量】10~20g。

【应用经验】大量饮酒中毒：松花 30g（焙） 陈皮 15g 川黄连 15g 甘草 6g。
俱微火炒为末，与松花和匀。每早晚各服 6g，白汤调服。

10、冷水丹

土家语名：务气起实克查

土家语拼音：wuf qif qix sir ker car

国际音标：wu³⁵ tɕi³⁵ tɕi⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】冷草。

【来源】为凤仙花科植物长萼凤仙花 *Impatiens longialata* E. pritz. ex Diels, 全草入药。

【性味】甘、淡，凉。

【功效】解食物毒，消肿止痛。

【主治】食物中毒，小儿食积，肝病，烧心症。

【用量】10~20g。

【应用经验】

- 1、小儿食积、有虫作痛：青皮 陈皮 吴茱萸 冷水丹 使君子 鹤虱 滑石 甘草各 10g。水煎服。
- 2、瘟黄症、烧心症、食物中毒：冷水七 鱼腥草 藕节 苦参 散血丹 活血莲 血藤 冷水丹各 20g 甘草 30g。水煎服。

11、窃衣根

土家语名：窃衣机纳

土家语拼音：qier yix jix lar

国际音标：tɕie²¹ ji⁵⁵ tɕi⁵⁵ la²¹

【别名】家子草。

【来源】为伞形科植物华南鹤虱 *Torilis japonica* (Houtt.) DC.，根或全草入药。

【性味】苦、辛，平。

【功效】解食物毒，杀虫。

【主治】食物中毒，疗疮。

【用量】10~15g。

【应用经验】

- 1、疗疮：全草适量，捣烂外敷。
- 2、食物中毒：窃衣根 6g，水煎服。

【备注】场行小毒。

【备考】2、药理作用：鲜全草对金黄色葡萄球菌、乙型溶血链球菌及炭疽、白喉、伤寒等杆菌均有不同程度的抑制作用。

12、野饭豆、节蚂蟥蝗

土家语名：抗苦多不

土家语拼音：kanr kux dox bur

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ to⁵⁵ pu²¹

【别名】山豇豆、野苦参。

【来源】为豆科植物山蚂蝗 *Desmodium fallax* Schindl.，根或全草入药。

【性味】辛，寒。

【功效】解毒消食，活血止痛，祛风毒。

【主治】食物中毒，毒蛇咬伤，崩中带下，跌打损伤，风湿痹痛症。

【用量】10~20g。

【应用经验】

- 1、咽喉肿痛：野饭豆 八爪金龙 刺黄芩 射干各 9g。水煎服。
- 2、风湿痹痛症：野饭豆根 15g，炖猪脚服。
- 3、毒蛇咬伤症：鲜叶适量，捣烂敷伤口周围，每日二次。

13、马胡梢

土家语名：马胡梢

土家语拼音：max hur saox

国际音标：ma⁵⁵ xu²¹ sau⁵⁵

【别名】一味药。

【来源】为豆科植物马棘 *Indigofera pseudotinctoria* Mats.，全草入药。

【性味】苦，平。

【功效】消食导滞，化痰破结。

【主治】食积腹胀，咳嗽气喘，痔疮及创伤出血。

【用量】10~20g。

14、飞蛾藤

土家语名：他司二拉

土家语拼音：tax six ef lax

国际音标：t'a⁵⁵ si⁵⁵ e³⁵ la⁵⁵

【别名】打米花。

【来源】为旋花科植物翼萼藤 *Porana racemosa* Roxb.，根及全草入药。

【性味】辛，微温。

【功效】消食毒，破血行气。

【主治】食积不消，无名毒，劳伤疼痛，伤风感冒。

【用量】10~20g。

【应用经验】食积停肚症：飞蛾藤根 20g 化食草 15g 藤豆根 10g。每日一剂，水煎二次服。

15、化食草

土家语名：化食草

土家语拼音：huaf sir caox

国际音标：xua³⁵ si²¹ ts'au⁵⁵

【别名】三点金。

【来源】为豆科植物小叶三点金 *Ddsmodium microphyllum* (Thunb.) DC.，全草入药。

【性味】甘，平。

【功效】健肚化毒，止咳平喘。

【主治】停食症，食物中毒，咳嗽，吼症，毒蛇咬伤，痈疮溃烂，漆疮，痔疮。

【用量】10~20g。

【备考】1、有明显的镇咳、祛痰、平喘作用。2、对金黄色葡萄球菌有微弱的抑制作用。3、对肠痉挛有对抗作用。

16、甜瓜蒂

土家语名：甜瓜借那

土家语拼音：tianr guax jief lax

国际音标：t²¹ kua⁵⁵ t³⁵ie³⁵ la⁵⁵

【别名】香瓜。

【来源】为葫芦科植物甜瓜 *Cucumis melo* L.，果柄入药。

【性味】苦，寒。

【功效】消食化毒，祛痰催吐，除湿。

【主治】食物中毒，鼻息肉，鹅口疮，热痰壅塞，咳逆上气，癫痫。

【用量】10~20g。

【备考】1、有强烈的催吐作用。2、有降低黄疸指数及降低转氨酶的作用。3、提高细胞免疫的作用。

17、虎耳还阳

土家语名：热撇思欵

土家语拼音：ref piev seix

国际音标：ze³⁵ pie⁵³ sei⁵⁵

【别名】猫耳草、岩青菜。

【来源】为报春花科植物岩青菜 *Primula obconica* Hance，全草及根入药。

【性味】辛、甘，凉。

【功效】解酒毒，醒神，活血止痛，疗疮。

【主治】饮酒中毒，腹痛，跌打青肿，劳伤，风湿。

【用量】10~20g。

【应用经验】饮酒过量：虎耳还阳 30g 龙枣 30g 葛花 10g。水煎当茶饮。

18、雉鸡尾、大叶金花草

土家语名：日阿尼嘎列碰

土家语拼音：rar nir gar ler pongf

国际音标：za²¹ ʒi²¹ ka²¹ le²¹ p·uŋ³⁵

【别名】金花草、乌韭、小鸡尾草。

【来源】为鳞始蕨科植物乌韭 *Stenoloma chusanum* (L.) Ching, 全草入药。

【性味】微苦，寒。

【功效】解药毒，利湿，止血，解狂犬、蛇毒。

【主治】砒霜、雷公藤、木薯、黄紫树根中毒，热泻痢疾，白浊，吐血，便血，烫伤。狂犬、毒蛇咬伤。

【用量】10~20g。解药毒 100~200g。

【应用经验】

- 1、痢疾：鲜雉鸡尾全草、鲜水蜈蚣全草各 30g，水煎服。
- 2、白浊、湿热带下：鲜雉鸡尾全草 30~60g，捣烂绞汁，调米泔水服。
- 3、烫伤：雉鸡尾叶捣烂或研末，冷开水调敷患处。
- 4、木薯中毒症：鲜乌韭 30g 甘草 20g 绿豆 50g。水煎二次服。

【备注】对砷中毒有解毒作用。

19、龙枣

土家语名：铺早早思

土家语拼音：puf zaox zaox six

国际音标：p'u³⁵ tsau⁵⁵ tsau⁵⁵ si⁵⁵

【别名】鸡爪拐、鸡爪树、甜半夜、拐枣。

【来源】为鼠李科植物枳椇 *Hovenia dulcis* Thunb., 种子和果肉入药。

【性味】甘、微酸、涩，平。

【功效】解酒毒，除烦，通便。

【主治】酒醉，口渴烦热，大便干结，小便短少。

【用量】10~20g。

【应用经验】

- 1、热病烦渴、小便不利：枳椇子 9g 银花 24g 知母 9g 灯心草 3g 水煎服。
- 2、醉酒：枳椇子 12g，水煎服；或加葛花 9g，水煎服。

【备考】

- 1、化学成分：果实含大量葡萄糖、苹果酸钙。种子含枳椇皂苷。
- 2、药理作用：①果实对家兔有显著的利尿作用，而无任何不良反应。②枳椇皂苷能显著减少小白鼠自发活动，并能延长环己巴比妥的睡眠时间，能特异地抑制大鼠的条件反射，显示有一定的镇静作用。③枳椇皂苷有一定的抗惊厥作用。④枳椇皂苷对小鼠有短暂的降压作用。

第十七章 破蛊毒药

土家语名：蛊毒皮业药

土家语拼音：gux dur pir nier yaof

国际音标：ku⁵⁵ tu²¹ pi²¹ ɹie²¹ jau³⁵

凡具有破解体内顽结、驱赶蛊毒邪气的功效，用于治疗蛊毒病的药物，称破蛊毒药。

蛊毒是古代土家医对一些病因不明的难治性疾病总括，多属于现代心理性、精神性、地方性疾病和某些药物慢性中毒、慢性矿物中毒性疾病。作为土家医古医药文化，本书只作为保留，其医药价值有待今后深入研究。有关主要内容中的破蛊毒药只提及药名，不作详述。

常用破蛊毒药物有：刺猪毛、石榴皮、茶枯、干幼桃、斑蝥、大戟、荸荠、肥猪头、藤藤菜根、红苏叶、山薄荷、蚊蒿、雄黄、独蒜、石菖蒲、茨菰菜等。

1、人屎尖

土家语名：俚色点点

土家语拼音：lox ser danx danx

国际音标：lo⁵⁵ se²¹ tan⁵⁵ tan⁵⁵

【别名】人大便。

【来源】为人科 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.，（健康人大便后部分入药）。

【性味】酸，寒。

【功效】解蛊毒，泻热。

【主治】大局症，河豚中毒。

【用量】10~15g。

2、鸡蛋

土家语名：日阿列

土家语拼音: rar lier

国际音标: za²¹ lie²¹

【别名】鸡卵。

【来源】为雉科动物家鸡卵 *Gallus gallus domesticus* Braisson, 蛋清入药。

【性味】咸, 温。

【功效】解蛊毒, 润肺利咽, 清热。

【主治】咽痛, 目赤, 咳嗽, 下痢, 疟疾, 烧伤。

【用量】1~2 个, 生用。

3、大蒜

土家语名: 石托

土家语拼音: sir tof

国际音标: si²¹ t'o³⁵

【别名】独蒜、胡蒜。

【来源】为百合科植物大蒜 *Allium sativum* L, 鳞茎入药。

【性味】辛, 温。

【功效】解蛊毒, 行滞气, 暖脾胃, 消癥积, 杀虫。

【主治】蛊毒症, 饮食积滞, 脱腹冷痛, 水肿胀满, 泄泻, 痢疾, 百日咳, 痈疽肿毒, 白秃癣疮, 蛇虫咬伤。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、预防春瘟、鸡窝症、痢疾、麸子证、百日咳: 每天食用生大蒜 3~5 瓣。
- 2、火痢疾: 每次食生大蒜 3~5 瓣。每日三次。
- 3、妇女阴痒、阴虫、湿疹瘙痒: 用大蒜煎水洗。

【备考】

1、化学成分: 含挥发油(油中主要成分为大蒜辣素、碘等)、大蒜氨酸、环大蒜氨酸、蒜制菌素、蛋白质、脂肪、粗纤维钙、磷、铁、硫胺素、核黄素、尼克酸、抗坏血酸。

2、药理作用: ①抗菌作用: 对化脓性球菌、结核杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆

菌、霍乱弧菌等均有抑制作用；对多种致病性皮肤真菌均有不同程度的抑制和杀灭作用；对恙虫热立 g 次体有很强的抑杀力。②抗原虫作用：大蒜水浸剂有杀灭阿米巴原虫的作用。对阴道滴虫也有明显的杀灭作用。③对心血管的作用：减慢心律、增加心收缩力、扩张末梢血管、增加利尿，能降低实验性动脉粥样硬化兔的血压，临床观察表明大蒜对高血压和动脉粥样硬化症患者有显著的改善作用；大蒜对高脂血症和血液凝固性变化有非常显著的保护作用，并能显著提高正常人和冠状动脉疾病患者的血清纤维蛋白溶解活性。④大蒜乙醇提取物能兴奋子宫及增强雌二醇对子宫的兴奋作用。⑤口服大蒜提取物对四氧嘧啶所致的糖尿病大鼠有降血糖作用。⑥提纯的大蒜油对亚硝酸诱发大鼠肝癌前病变有明显的抑制作用。⑦大蒜提取物对巨细胞病毒有明显的抑制作用，还对外白血细胞集落生长有明显抑制作用。

4、安息香

土家语名：安息香

土家语拼音：anx xir xianx

国际音标：an⁵⁵ ɕi²¹ ɕian⁵⁵

【来源】为安息香科植物安息香树 *Styrax benzoin* Dryand.，树脂入药。

【性味】辛，苦，温。

【功效】解蛊毒，开窍，辟秽，行气血。

【主治】大局症卒中暴厥，心腹疼痛，产后血晕，小儿惊风，风痹，腹痛。

【用量】3~6g。

5、龙脑香子

土家语名：龙脑香布里

土家语拼音：longr laox xianx bif lix

国际音标：luŋ²¹ lau⁵⁵ ɕian⁵⁵ pu³⁵ li⁵⁵

【别名】龙涎香

【来源】为龙脑科植物龙脑香 *Dryobalanops aromatica* Gaertn. f.，种子入药。

【性味】性温，味苦。

【功效】解蛊毒，下恶气，消食，散胀，香口。

【主治】大局症，腹胀，口臭。

【用量】3~6g。

6、刮金板

土家语名：刮金板

土家语拼音：guar jinx banx

国际音标：kua²¹ tɕin⁵⁵ pan⁵⁵

土家语拼音：【别名】贝气消、铁灯台、铁筷子。

【来源】为大戟科植物水黄花 *Euphorbia chrysocoma* Levl. et Vant.，根皮入药。

【性味】苦，寒。

【功效】消蛊毒，逐水利尿。

【主治】大局症，水肿，臃胀，小便不能，蛇及蜈蚣咬伤，无名肿毒。

【用量】6~9g。

【应用经验】

- 1、无名肿毒：刮金板嫩叶适量，捣烂敷患处。
- 2、疥疮瘙痒：刮金板叶，研末，用油调敷患处。
- 3、水肿胀满、痰饮咳喘、胸胁闷痛：铁筷子 芫花 甘遂各等份。研末，再用大枣 10 枚煎汤，每次服药末 3g，清晨空腹服。
- 4、中板症（肝硬化腹水）：鲜铁筷子 大血藤 青木香 黄芩 满天星各 9g。水煎服。病愈后可续服下方：青木香 6g 满天星 9g 大蒜 3 个。水煎服。

【备注】有毒。

【备考】

1、化学成分：根含大戟苷、橡胶样物质、大戟素甲、大戟素乙、大戟素丙及生物碱。

2、药理作用：①对家畜有强烈的毒性。人触之则发生皮炎、鼻炎、结膜炎等，若服至中毒量则咽喉部肿胀充血、呕吐下痢，毒素进入血液循环则呈眩晕、昏迷、痉挛、瞳孔散大等症状。②实验证明有极轻的利尿作用。③泻下作用：大戟根的乙醚提取物有致泻的作用，热水提取物对猫有剧泻作用。④大戟根皮的乙

醇提取物可引起动物的末梢血管扩张，能兴奋妊娠动物离体子宫，抑制肾上腺素的升压作用。⑤大戟反甘草的研究结果完全不一致，有报道两者混合使用，其毒性比单独使用大戟时大得多，如果二者分别用酒浸给药时混合给予，其毒性亦比单用大戟大，也有报道两者合同并无毒性增加的现象；临床上也有报导认为二者不同可以同用，还可使作用明显增强，因此甘草反大戟问题尚无明确定论。

7、金花草

土家语名：科卡普实克查

土家语拼音：kox kax pux sir ker car

国际音标：k'o⁵⁵ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】旋鸡尾、地黄连、鸡尾厥。

【来源】为厥科植物野鸡尾 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze，全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】破解蛊毒，狂犬毒，凉血止血。

【主治】大局症，丹毒，狂犬病毒症。

【用量】10~15g。

8、山玫瑰

土家语名：抗苦叶叶花

土家语拼音：kanr kux yef yef huax

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ je³⁵ je³⁵ xua⁵⁵

【别名】野玫瑰、野蔷薇。

【来源】为蔷薇科植物多花蔷薇 *Rosa multiflora* Thunb.，花或根入药。

【性味】甘，凉。

【功效】破解蛊毒，解暑，和胃，止血。

【主治】大局症，暑热吐血，口渴，泻痢，刀伤出血和劳伤等症。

【用量】10~15g。

【备考】对伤寒杆菌、斯密氏痢疾杆菌、福氏痢疾杆菌、志贺氏痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌、八联球菌等均有抑制作用。

9、石榴根

土家语名：石榴机纳

土家语拼音：sir liux jix lar

国际音标：si²¹ liu⁵⁵ tɕi⁵⁵ la²¹

【来源】为石榴科植物石榴 *Punica granatum* L.，根皮入药。

【性味】苦涩，温。

【功效】破解蛊毒，杀虫，涩肠，止带。

【主治】大局症，蛔虫，绦虫，久泻，久痢，赤白带下等。

【用量】10~15g。

【备考】有抗菌、抗病毒作用。

10、干桃子

土家语名：瘪桃子

土家语拼音：biex taor zir

国际音标：pie⁵⁵ t'au²¹ tsi²¹

【别名】碧桃干。

【来源】为蔷薇科植物山桃 *Prunus. davidiana* (Carr.) Franch.，幼桃果实入药。

【性味】甘、酸，温。

【功效】破解蛊毒，生津，润肠，活血，消积。

【主治】大局症。

【用量】10~15g。

11、榉树皮

土家语名：榉卡蒙他爬

土家语拼音：jix kar mongr tax par

国际音标：tɕi⁵⁵ k'a²¹ muŋ²¹ t'a⁵⁵ p'a²¹

【别名】方榉皮。

【来源】为榆科植物大叶榉树 *Zelkova schneideriana* Hand. - Mazz.，树皮入药。

【性味】大寒。

【功效】破解蛊毒，清热，利水。

【主治】大局症，热毒下痢，水肿，热毒风，肿毒。

【用量】10~15g。

12、刺猬皮

土家语名：次主他爬

土家语拼音：cif zux tax par

国际音标：ts'i³⁵ tsu⁵⁵ t'a⁵⁵ p'a²¹

【别名】刺猪毛、仙人衣。

【来源】为刺猬科动物刺猬 *Erinaceus europaeus* L.，刺毛入药。

【性味】苦，平。

【功效】破解蛊毒，降气定痛，凉血止血。

【主治】蛊毒，反胃吐食，腹痛疝气，肠风痔漏，狂犬咬伤。

【用量】10~15g。

【备考】畏桔梗、麦冬。

第十八章 杀虫毒药

土家语名：铁迫毒布捏药

土家语拼音：tiev per duf buf niex yaof

国际音标：tʰie⁵³ pʰe²¹ tu³⁵ pu³⁵ ʒie⁵⁵ jau³⁵

凡具有杀灭体内虫体，消除虫毒邪的功效，用于治疗虫毒病的药物称杀虫毒药。

土家医认为虫在人体内，是有生命力的，对人体是有伤害作用的。但虫在人体内生长过程中会产生和排出一定的有毒物质或虫死后肉体腐烂成为毒邪，作用于人体组织器官产生病变。因部位和虫种类不同，临床症状和体征各异，共同有：疼痛、肿胀、红肿、皮肤痒、脱屑等症状，舌红、苔黄，脉弦滑或弦紧等体征。

杀虫毒药具有杀灭和排出体内虫体、消除体内毒邪、促进损伤愈合、减轻疼痛和皮痒的功效，主要用于治疗虫毒病，某些药物还兼有活血、凉血、祛风、赶湿功效，经配方用于治疗血热病、风湿病、水肿病等病症。

常用治虫毒药物有：一窝蛆、山兰、山梨子、山黄豆、大蒜、大枸叶、大红袍、大狗尾巴草、土荆皮、牛肋巴、火草、石板花、号筒杆、红榧子、竹苓、灰灰菜、油桐叶、苦参、苦楝皮、茶饼、狗花椒、鱼尾草、南瓜子、粗榧子、粗糠毛、野棉花、猫耳朵、蛇疙瘩、黄花五味草、臭椿根皮、小蓼子草、硫磺、雄黄、岩芹菜、木油子、癞子果、水银、铅矿石。

1、一窝蛆

土家语名：色铁迫一科保

土家语拼音：ser tex per yif kox lox

国际音标：se²¹ tʰie⁵⁵ pʰe²¹ ji³⁵ k'o⁵⁵ lo⁵⁵

【别名】肺筋草、咀儿草、金线吊白米。

【来源】为百合科植物肺筋草 *Alettris spicata* (Thunb.) Franch.，全草入药。

【性味】甘，平。

【功效】杀虫消积，清肺止咳。

【主治】蛔虫病，咳嗽咯血，百日咳，气喘，肺痈，小儿疳积。

【用量】10~20g。

【应用经验】百虫吃肝症：一窝蛆根细粉 3g，与鸡肝拌匀。蒸熟后服，每日一剂。

2、山兰

土家语名：山兰

土家语拼音：sanx lanr

国际音标：san⁵⁵ lan²¹

【别名】兰草。

【来源】为兰科植物惠兰 *Cymbidium faberi* Rolfe，根入药。

【性味】苦、甘，温。

【功效】杀虫利湿，润肺止咳。

【主治】蛔虫病，白带，白浊，咳嗽。

【用量】10~20g。

3、山梨子

土家语名：抗苦柏列思

土家语拼音：kar kux bex liex six

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ pe⁵⁵ lie⁵⁵ si⁵⁵

【别名】山棠梨。

【来源】为蔷薇科植物野海棠 *Sorbus hupehensis* Schneid.，叶入药。

【性味】辛、苦，温。

【功效】杀虫，止痒。

【主治】风癣疥癩，皮肤瘙痒，灭蛆杀孑。

【用量】15~30g。

【应用经验】

1、皮肤瘙痒：山梨子叶 三角枫 银花滕 花椒叶 陈艾叶各适量。煎水外洗。

2、顽癣：山梨子叶适量，取汁搽患处。

【备注】有毒。

4、山黄豆

土家语名：抗苦去布里

土家语拼音：kanr kux qif buf lix

国际音标：k'an²¹ k'u⁵⁵ tɕi³⁵ pu³⁵ li⁵⁵

【别名】山蚂蝗、饿蚂蝗。

【来源】豆科植物小槐花 *Desmodium caudatum* (Thunb.) DC.，根及全草入药。

【性味】叶：苦、涩，平。果：甘、苦，平。

【功效】消积杀虫，清热解毒，利胆行水。

【主治】蛔虫病，食积气胀，小儿疳积，烧、烫伤，外伤出血。

【用量】内服 10~15g，外用适量。

【应用经验】小儿走胎症：山黄豆根瘤粉 3g 放屁虫（去臭气）5 个。共研均放入猪肝 1 两内拌匀，蒸熟后分两次服。

5、大构叶

土家语名：见他此巴

土家语拼音：pif tax cix bax

国际音标：pi³⁵ t'a⁵⁵ tsi⁵⁵ pa⁵⁵

【别名】大叶构树。

【来源】为桑科植物构树 *Broussonetia papyrifera*. (L.) Vent.，叶入药。

【性味】甘，凉。

【功效】杀虫毒，清热，凉血，利湿。

【主治】顽癣，鼻衄，湿疹。

【用量】10~20g。

【应用经验】皮肤湿疹：大构叶、野花椒叶各适量，水煎取液洗患处，每日 1~二次。

【备考】对金黄色葡萄球、肺炎双球菌、卡他球菌、链球菌及大肠、炭疽、白喉、

伤寒、绿脓等杆菌均有不同程度的抑制作用。

6、大红袍

土家语名：红袍此巴

土家语拼音：hongr paor cix bax

国际音标：xuŋ²¹ p'au²¹ ts'i⁵⁵ pa⁵⁵

【别名】大花根。

【来源】为芸香科植物波叶花椒 *Zanthoxylum undulatifolium* Hems1.，果实、根皮入药。

【性味】辛，温。

【功效】杀虫毒，燥湿散寒。

【主治】皮肤湿疹，脘腹冷痛，呕吐，寒湿泻痢。

【用量】10~15g。

【应用经验】

1、皮肤湿毒疮：大红袍 9g 蛇床子 12g。水煎汁洗患处。

2、蛔虫、腹痛呕吐：大红袍 6g 乌梅 12g 榧子 9g 生姜 3g。水煎服。

7、大狗尾草

土家语名：哈列此巴列切实克查

土家语拼音：hax lier cix bax lier pongf sir ker car

国际音标：xa⁵⁵ lie²¹ ts'i⁵⁵ pa⁵⁵ lie²¹ p'uŋ³⁴ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】狗尾巴草。

【来源】为禾科植物大狗尾草 *Setaria faberi* Herrm.，全草入药。

【性味】苦，平。

【功效】杀虫止痒，清热消疳。

【主治】龋齿牙痛，小儿疳，风疹。

【用量】10~20g。

8、土荆皮

土家语名：土用他爬

土家语拼音：tux jinx tax par

国际音标：t'u⁵⁵ tɕin⁵⁵ t'a⁵⁵ p'a²¹

【别名】金钱松

【来源】为松科植物金钱松 *Pseudolarix kaempferi* Gord.，树皮和根皮入药。

【性味】辛，温。

【功效】杀虫止痒。

【主治】疥癣瘙痒，皮炎，湿疹。

【用量】10~20g。

【应用经验】铜钱癣症：土荆皮 100g 炮磺 50g 苦参树皮 100g。浸入 2 市斤食醋中，7 日后取汁涂擦患处，每日 2~三次。

【备注】有毒。

【备考】1、对铁锈色小芽孢菌、红色癣菌、玫瑰色癣菌、叠瓦癣菌、许兰氏黄癣菌、絮状表皮癣菌、白色念珠菌均有抑菌作用。2、具有止血和抗早孕作用。

9、火草

土家语名：米实克查

土家语拼音：miv sir ker car

国际音标：mi⁵³ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】黄腺香青

【来源】为菊科植物黄腺香青 *Anaphalis aureopunctata* Lingelsh. et Borza.，全草入药。

【性味】甘、微苦，凉。

【功效】驱虫解毒。

【主治】蛔虫，牙痛，痢疾。

【用量】10~20g。

10、石板花

土家语名：阿八卡普

土家语拼音：ar bar kax pux

国际音标：a²¹ pa²¹ k'a⁵⁵ p'u⁵⁵

【别名】蛇板花、毛地钱。

【来源】为牛皮叶科植物肺衣 *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.，全草入药。

【性味】辛、涩，寒。

【功效】赶杀虫，解毒消肿，祛瘀止痛。

【主治】蛔虫症，疔疮红肿，烫火伤，小儿疳积，腹胀，肾炎水肿。

【用量】10~20g。

【备注】有毒。

11、号筒杆

土家语名：迷迷咚东

土家语拼音：mif miv dongr dongx

国际音标：mi³⁵ mi⁵³ tuŋ²¹ tuŋ⁵⁵

【别名】灰鸡母、博落回、中叭拉。

【来源】为罂粟科植物博落回 *Macleaya cordata* (Willd.) R. Br. 和小果博落回 *M. microcarpa* Fedde，根茎入药。

【性味】辛、苦，温。

【功效】解毒杀虫，消肿止痒。

【主治】滴虫，指疔，脓肿，下肢溃疡，烫伤，顽癣。

【用量】内服 10~30g，外用适量。

【应用经验】

- 1、指疔：号筒杆根皮、倒地拱根等分，加食盐少许，同浓茶汁捣烂，敷患处。
- 2、下肢溃疡：号筒杆水煎洗，另用叶二张，中夹白糖，放锅内蒸几分钟，取出贴患处，每日换一次。
- 3、黄癣：先剃头，再用号筒杆 60g 明矾 30g。煎水洗，每日一次，洗 7 天。
- 4、鼻渊：大号筒捣烂包头部，另用大号筒 15g 天麻 刺梨 9g。水煎服。
- 5、罐耳心：大号筒杆 15g，捣烂包耳后，或捣烂与螺丝水滴入耳内。

【备注】有大毒。

【备考】

1、化学成分:含生物碱,有普洛托品、白屈菜红碱、血根碱、 α -别隐品碱、黄连碱、小檗碱、博落回碱、紫堇萨碱、白屈菜加宾碱、甲氧基白屈菜红碱、氯化血根碱。

2、药理作用:①驱虫作用:博落回中的3种生物碱有杀线虫作用;对某些细菌及真菌也有抑制效力。②杀蛆作用:博落回有杀蛆作用,能抑制蝇卵孵化;杀蛆作用以叶及果皮效力最佳,茎次之,根最弱,有效成分可能为生物碱。③抑菌试验对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌、啤酒酵母菌、白色念珠菌、黑面霉菌、水稻白叶枯菌等均有显著的抑制作用。④本品所含的普洛托品对动物的子宫有显著的收缩作用;对大鼠、小鼠、豚鼠等均有麻痹大脑的作用。

12、红榧子

土家语名:红榧布里

土家语拼音: hongr huix buf lix

国际音标: xuŋ²¹ xui⁵⁵ pu³⁵ li⁵⁵

【别名】红豆杉。

【来源】为红豆杉科植物红榧子 *Taxus mairei* (Lemee et Levl.) S. Y. Hu, 种子入药。

【性味】甘、淡平。

【功效】驱虫,消食积,利尿。

【主治】蛔虫病,食积腹痛,小便不利,肠瘰疬。

【用量】10~20g。

13、竹苓(雷丸)

土家语名:母业苓

土家语拼音: mux nier lenr

国际音标: mu⁵⁵ ʒie²¹ len²¹

【别名】竹林子、竹灵芝。

【来源】为多孔菌科植物雷丸 *Polyporus mylittae* Cook. et Mass.，菌核入药。

【性味】微苦，寒。

【功效】杀虫消积。

【主治】绦虫、蛔虫、涤虫、钩虫病腹痛，小儿疳积。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、**蟪虫拱胆**：雷丸 3g（研粉） 使君子 檳榔各 9g 乌梅 3 个。后 3 味水煎二次，分两次冲雷丸粉服。每日一剂。

2、**杀肠内蟪虫**：雷丸 使君子（炮，去壳） 鹤虱、榧子肉 檳榔各等份。研为细粉，每服 3g，温米饮调下，乳食前服。

【备考】

1、化学成分：主要成分为一种蛋白分解酶，称雷丸素，含量 3%，并含钙、铝、镁等。

2、药理作用：①有驱绦虫、钩虫的作用，能破坏肠内虫体的节片而达到驱虫效果，其破坏虫体的效能可能是对蛋白质的分解作用。在碱性溶媒中，其分解蛋白质的效力最大；在酸性溶媒中，则无效。雷丸对热不稳定，只宜碾粉服，不可煎服。②雷丸多糖静脉注射或腹腔注射对小鼠巴豆油耳肿胀、大鼠琼脂性和酵母性关节肿均有明显抑制作用，血浆皮质酮含量增加，但肾上腺维生素 C 含量无明显改变。

14、灰灰菜

土家语名：不此哈车

土家语拼音：bur cif hax cex

国际音标：pu²¹ ts'i³⁵ xa⁵⁵ ts'e⁵⁵

【别名】扯根菜。

【来源】为藜科植物灰灰菜 *Chenopodium album* L.，全草入药。

【性味】甘、微苦，平。

【功效】杀虫止痒，止泻痢。

【主治】湿疹瘙痒，龋齿疼痛，痢疾泄泻。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、痢疾、泄泻：灰灰菜全草 30g，水煎服。
- 2、湿疹瘙痒：灰灰菜全草 野菊花等量。煎水熏洗。
- 3、毒虫咬伤：灰灰菜全草捣烂敷患处。

【备考】

1、化学成分：全草含齐墩果酸、L-亮氨酸及β-谷甾醇。花含阿魏酸及香基酸。叶含草酸盐。

2、药理作用：将藜的70%醇浸剂用于蛙、蟾蜍、小鼠、豚鼠、兔等，对呼吸先兴奋后抑制，终因呼吸麻痹致死；亦有降压和抑制心脏的作用；能增加平滑肌器官的运动，对末梢血管主要是收缩；对骨骼肌和运动N常呈麻痹作用；能使平滑肌运动亢进。

15、油桐叶

土家语名：桐剥削尔他

土家语拼音：tongr bor lif ex tax

国际音标：t·uŋ²¹ po²¹ li³⁵ e⁵⁵ t·a⁵⁵

【别名】桐子树。

【来源】为大戟科植物油桐 *Aleurites fordii* Hemsl.，叶入药。

【性味】甘、微辛，寒。

【功效】解毒杀虫。

【主治】疮疡，癣疥。

【用量】6~10g。

【备考】对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、伤寒杆菌有明杂志菌作用。

16、苦参

土家语名：克欸致子参

土家语拼音：keif zif zix senx

国际音标: k'ei³⁵ tsi³⁵ tsi⁵⁵ sen⁵⁵

【别名】麻柳树。

【来源】为豆科植物苦参 *Sophora flavescens* Ait., 根入药。

【性味】苦，寒。

【功效】杀虫止痒，燥湿利尿。

【主治】赤白带，阴痒，疥癣，湿疹，湿疮，热痢，便秘。

【用量】10~20g。

【应用经验】

- 1、痢疾：苦参 12g 白头翁 黄芩各 9g。水煎服。
- 2、妇女阴痒、湿疹、疥癣、皮肤瘙痒：苦参 银花 贯众 枯矾 甘草各适量。煎水洗。亦可单用苦参煎水洗。
- 3、顽固性湿疹：苦参 蛇床子 苍耳子各 30g 川椒 雄黄 白矾各 3。加水 500ml，煎去渣，将药液局部湿敷。
- 4、小面积烫伤：苦参末（过 120 目）250g 冰片 10g 葵花油（香油也可）300g。调和如膏，涂敷患处，每日换药一次。
- 5、肠风下血：苦参 20g 紫地榆 15g 白术 12g 侧柏叶 10g。水煎服。治血痢不止：苦参（炒焦）研末，米汤送下。
- 6、痔漏下血、肠风下血、酒毒下血：苦参（酒蒸）100g 地黄（蒸熟）100g。共为蜜丸，每次服 6g。

【备考】

1、化学成分：含多种生物碱，其中以苦参碱为主，尚含金雀花碱、臭豆碱、氧化苦参碱及槐醇碱、静叶碱等。含多种黄酮类。

2、药理作用：①苦味健胃作用：苦参味苦，具有与一般苦味健胃作用。②利尿作用：苦参有较明显的利尿作用，主要由苦参碱引起。③抗心率失常作用：在麻醉大白鼠实验中，苦参制剂对由乌头冷浸液、肾上腺素加氯仿、洋地黄苷中毒所致的实验性心律失常有对抗作用。④抗菌作用：不同浓度的溶液对福氏痢疾杆菌、宋内氏杆菌、结核杆菌及多种致病性皮肤真菌有抑制作用。⑤抗滴虫抗阿米巴原虫作用：苦参乙醇浸膏在体外实验对滴虫和阿米巴原虫有杀灭作用。⑥苦参碱和氧化苦参碱对肉瘤 S180 均有抑制活性，对家兔白细胞低下有明显疗效，

并可防止丝裂霉素 C 引起的白细胞减少,脱氢苦参碱对艾氏腹水癌等有抑制作用。
⑦苦参能抑制动物皮肤过敏反应,并能减少致敏动物血清抗体形成,可用于治疗一些过敏性疾病。⑧苦参煎剂及苦参碱有明显的平喘作用。⑨苦参酮及生物碱有抗胃溃疡作用。⑩苦参碱能对抗心律失常等作用。

[附注] 苦参的种子亦供药用,具有与健胃和驱除蛔虫的作用。单用苦参子研末,分装胶囊或压制片治疗细菌性痢疾,也有用于大便秘结。

17、苦楝皮

土家语名:苦楝他爬

土家语拼音:kax lanr tax par

国际音标:k'u⁵⁵ lian²¹ t'a⁵⁵ p'a²¹

【别名】苦楝树。

【来源】为楝科植物苦楝树 *Melia azedarach* L., 根皮入药。

【性味】苦,寒。

【功效】杀虫,清热燥湿。

【主治】蛔虫病,痒屁虫病,绦虫病,阴虫,疥癣。

【用量】10~30g,外用适量。

【应用经验】

1、蜡虫拱胆症(胆道蛔虫):苦楝皮 使君子各 15g 槟榔 30g 木香 6g 枳壳 9g。水煎,日服三次。

2、阴户虫腐症(阴道滴虫)、阴痒:苦楝根皮适量,水煎外洗。

【备注】场行小毒。

【备考】

1、化学成分:苦楝皮含驱蛔有效成分苦楝素,此外,尚含正卅烷、β-谷甾醇、葡萄糖和微量其他成分。

2、药理作用:①苦楝皮有驱蛔效果,临床以根皮煎剂驱蛔排虫率高至 96.8%,阴转率达 29%,多数报告认为根皮驱蛔效果比树皮好,大树皮比小树皮效佳,冬季采比春季采好。②对常见致病性皮肤真菌有抑制作用。③对金黄色葡萄球菌敏感。④苦楝子能抑制流感病毒京科 68-1 株。⑤苦楝有强烈的泻下作用。⑥苦楝

皮提取物对小鼠实验性曼氏血吸病有治疗作用。

18、茶枯

土家语名：茶哭

土家语拼音：car kur

国际音标：ts'a²¹ k'u²¹

【别名】油茶。

【来源】为山茶科植物油茶 *Camellia oleifera* Abel.，种子去脂的渣入药。

【性味】苦，平。

【功效】除湿杀虫，清热解毒。

【主治】水臌症，阴囊湿疹，皮肤瘙痒，肉食积滞。

【用量】6~10g。

【应用经验】

- 1、囊胞湿气症（阴囊湿疹）：茶饼 20g 白英 15g 凤尾草 20g。煎水洗患处。
- 2、皮肤瘙痒：茶饼 50g 煎水洗患处。

【备注】有毒。

【备考】

1、化学成分：含皂苷、鞣质、生物碱。去脂种子含 8.5%油茶皂苷，水解后得山茶皂醇 I、山茶皂醇 II、玉蕊醇 C、茶皂醇 E、茶皂醇 A。

2、药理作用：在血吸虫卵阳性的狗粪中，加入茶子饼粉使其浓度分别为 1%、5%和 10%，置 30℃作用 24 小时，粪便孵化都转化阴性，或仅有极少数的毛蚴，证明茶子饼有良好杀灭血吸虫卵的效果。

19、狗花椒

土家语名：哈列错布

土家语拼音：hax lier cof buf

国际音标：xa⁵⁵ lie²¹ ts'o³⁵ pu³⁵

【别名】冬花椒。

【来源】为芸香科植物竹叶椒 *Zanthoxylum planispinum* Sieb. et Zucc.，果实入药。

【性味】辛，温。

【功效】驱蛔，散寒止痛。

【主治】蛔虫病胃寒，牙痛及湿疮。

【用量】10~15g。

【备注】场行小毒。

【备考】1、有镇静止痛作用。2、对呼吸有一定的抑制作用。3、对金色葡萄球菌与变形杆菌有抑制作用。

20、南瓜子

土家语名：那土不里

土家语拼音：laf tux buf lix

国际音标：la³⁵ t'u⁵⁵ pu³⁵ li⁵⁵

【别名】白瓜子。

【来源】为葫芦科植物南瓜 *Cucurbita moschata* Duch.，果实瓜蒂或根藤入药。

【性味】种子：甘，平；根、藤：淡，平。果蒂苦，寒。

【功效】种子驱虫、利尿。根、藤：利湿热，通淋。果蒂：赶蛊毒散风痰。

【主治】种子：主治绦虫病，蛔虫病，钩虫病，蛲虫病，鸡叫咳，产后手足浮肿，痔疮等症。根、藤：主治淋病，乳汁不通。果蒂：治蛊毒症、风痰症。

【用量】10~20g。

【备注】瓜蒂有小毒。

【备考】能抑制血吸虫的生长发育。

21、粗榧子

土家语名：粗榧布里

土家语拼音：cux huix buf lix

国际音标：ts'u⁵⁵ xui⁵⁵ pu³⁵ li⁵⁵

【别名】大红榧。

【来源】为粗榧科植物粗榧 *Cephalotaxus sinensis* (Rehd. et Wils.) Li, 种子入药。

【性味】甘、涩，平。

【功效】消积杀虫，润肺止咳。

【主治】蛔虫、钩虫、绦虫病，食积腹胀，肺燥咳嗽，咽喉肿痛。

【用量】10~20g。

【备注】有毒。

【备考】有抗癌作用。

22、粗糠柴

土家语名：迫他出嘎拉卡

土家语拼音：pex tax cur gar lax kar

国际音标：p'e⁵⁵ t'a⁵⁵ ts'u²¹ ka²¹ la⁵⁵ k'a²¹

【别名】糠皮神。

【来源】为大戟科植物粗糠柴 *Mallotus philippinensis* (Lam.) Muell. - Arg., 果实的腺毛、毛茸以及根、叶入药。

【性味】淡，涩，平。

【功效】腺毛及毛茸：驱虫，缓泻，祛风湿，解毒。叶：止血生肌。根：清热利湿。

【主治】腺毛及毛茸治涤虫，烂疮，虚燥便秘；叶：外伤出血，疮疡溃烂。根：急慢性痢疾，咽喉肿痛。

【用量】10~20g。

【应用经验】

1、疮疡溃烂久不收口：粗糠柴叶水煎外洗，研末敷患处。

2、外伤出血：粗糠柴鲜叶捣烂敷，叶研粉敷患处或水煎，外洗患处。

3、虚燥便秘：粗糠柴腺毛 毛茸 3g 生地 李仁 火麻仁各 6g。水煎服。

【备考】

1、化学成分：果实表面的棕红色腺毛为驱绦虫药，含混合树脂 65%~73%及蜡

质 2%，树脂中含驱虫有效成分粗糠柴素。此外，尚含纤维性物质约 22%等。果实含 8-桂皮酰-5,7-二羟基-2,2,6-三甲基色-3-烯。树皮含乙酰油桐酸。种子含粗糠柴酸及脂肪酸的甘油酯。

2、药理作用：果的提取物在体外、体内具有杀绦虫作用，对血吸虫亦有效，而对线虫（如蛔虫）则无效；水提取物效力较差，醚提取物之作用则介于水、醇之间。驱虫的有效成分为粗糠柴毒素及异粗糠柴毒素，而后者作用更强些。对兔小肠能提高张力，增强蠕动，以其果皮上的茸毛作成的制剂名咖马粉，可作泻下剂、驱虫剂。粉糠柴毒素有抗受精作用，而异粗糠柴毒素则无效。

23、野棉花

土家语名：野棉花

土家语拼音：yex mianr huax

国际音标：je⁵⁵ mian²¹ xua⁵⁵

【别名】打破碗碗花。

【来源】为毛茛苳科植物打破碗碗花 *Anemone hupehensis Lemoine*，根茎和叶入药。

【性味】苦，平。

【功效】截疟杀虫，清热解毒，排脓生肌，消肿散瘀。

【主治】奔波，顽癣，秃疮，疔疮痈肿，跌打损伤，牙痛。

【用量】20~30g。

【应用经验】牙痛：打碗花（鲜花）1g 白胡椒 0.3g。将鲜打碗花捣烂，白胡椒研成细粉，两药混匀，塞入龋齿蛀孔；风火牙痛放在痛牙上，上下牙咬紧，几分钟后吐出漱口，一次不愈，可再使用一次。

【备注】有毒。

24、猫耳朵

土家语名：莫翁且

土家语拼音：mor ongr qief

国际音标：mo²¹ uŋ²¹ tɕie³⁵

【别名】佛葵。

【来源】为茄科植物单花红丝线 *Lycianthes lysimachioides* (wall.) Bitt.，全草入药。

【性味】辛，温。

【功效】杀虫祛毒，解蛇毒。

【主治】绣耳疮，鼻疮，痈肿疮毒，外伤出血，皮肤瘙痒，毒蛇咬伤。

【用量】20~30g。

【备注】场行小毒。

25、蛇疙瘩

土家语名：窝糯梯

土家语拼音：wov lof tix

国际音标：wo⁵³ lo³⁵ t'i⁵⁵

【别名】毛过路黄、毛脚杆、路边黄。

【来源】为蔷薇科植物龙芽草 *Agrimonia pilosa* Ledeb. 或金线龙芽草 *A. pilosa* Ledeb. var. *japonica* (Miq.) Nakai.，嫩芽或全草入药。

【性味】苦、涩，平。

【功效】冬芽驱虫；全草收敛止血。

【主治】绦虫病，吐血，咳血，咯血，尿血，便血，崩漏下血，外伤出血等症。

【用量】20~30g。

【应用经验】

1、各种内出血：蛇疙瘩 20g，水煎服。

2、外伤出血：蛇疙瘩鲜叶捣烂敷患处。

【备考】

1、化学成分：全草含仙鹤草素、仙鹤草内脂、鞣质、甾醇、有机酸、酚性成分、维生素 K。冬芽中含仙鹤草酚等多种成分。

2、药理作用：①本品能增进血液凝固，故有止血作用，有效成分为鞣质、维生素 K、仙鹤草素，其中以仙鹤草素能缩短凝血时间和促进血小板的生成。②能使心搏强大，并调整心率，动物试验证明，小剂量加大心脏收缩振幅，中等剂

量略增加心率与加大心脏收缩振幅，大剂量使心率徐缓，而更加大心脏收缩振幅。③有增强细胞抵抗力，呼吸深大，疲劳之骨髓肌兴奋，瞳孔微散大的作用。④略有降低基本新陈代谢和血糖降低的作用。⑤冬芽及根有较强的驱绦虫作用，冬芽的主要成分作用于头节，对颈节、体节也有作用。⑥鹤草酚对体外培养的日本血吸虫有较强的抑制作用。⑦抗菌试验：本品对革兰阳性菌有抑制作用，尤其对金黄色葡萄球菌有较强的抑制作用，故近有制成膏剂，外敷疗痈疮疗毒等。

26、黄花五味草

土家语名：被拉得实克查

土家语拼音：bif lax der sir ker car

国际音标：pi³⁵ la⁵⁵ te²¹ si²¹ k'e²¹ ts'a²¹

【别名】断肠草。

【来源】为罂粟科植物小花黄堇 *Corydalis racemosa* (Thunb.) Pers.，全草入药。

【性味】苦、涩，寒。

【功效】杀虫解毒，清热利尿。

【主治】疥癣，疮毒肿痛，目赤，流火，暑热泻痢，小儿惊风。

【用量】10~20g。

【备注】有毒。

【备考】对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及绿脓杆菌均有抑制作用。

27、臭椿

土家语名：椿木他爬

土家语拼音：cuenx mux tax par

国际音标：ts'uen⁵⁵ mu⁵⁵ t'a⁵⁵ p'a²¹

【别名】椿白皮。

【来源】为苦木科植物臭椿树 *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle，根皮入药。

【性味】苦、涩，寒。

【功效】驱杀虫，清热燥湿，涩肠止血。

【主治】蛔虫，久痢，久泻，肠风，崩漏，带下，遗精，白浊。

【用量】10~20g。

【应用经验】阴部虫痒症：臭椿根皮 15g 野胡萝卜子 10g 木梓树根皮 10g 号桐树 6g。水煎取液洗阴部，每日二次。

【备考】1、能杀灭阴道滴虫。2、对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌和伤寒杆菌有一定抑制作用。3、具有较强的抗癌活性。

28、小蓼子草

土家语名：蓼子草被亏

土家语拼音：liaof zix caox bif kuix

国际音标：liɑu³⁵ tsi⁵⁵ ts'au⁵⁵ pi³⁵ k'ui⁵⁵

【别名】柳辣子。

【来源】为蓼科植物假长尾蓼 *P. longisetum* De Bruyn，全草入药。

【性味】辛，温。

【功效】解毒杀虫，消肿止痛。

【主治】皮肤疥癣，麻疹，痢疾，肠炎，急性扁桃体炎。

【用量】10~20g。

29、雄黄

土家语名：雄黄

土家语拼音：xiongr huanr

国际音标：ɕiuŋ²¹ xuan²¹

【别名】黄金石、石黄、天阳石。

【来源】为简单硫代物类雄黄族矿物雄黄 *Realgar*。

【性味】性温，味苦、辣。

【功效】杀虫解毒，止痒。

【主治】慢性湿疹，毒蛇咬伤。

【用量】6~10g。

【备注】有毒。

【备考】有抗菌、抗血吸虫作用。

30、岩芹菜

土家语名：阿芹菜

土家语拼音：ar qinr caif

国际音标：a²¹ tɕin²¹ ts'ai³⁵

【别名】紫花烂手草、刻叶紫堇。

【来源】为罂粟科植物刻叶紫堇 *Corydalis incisa* (Thunb. ·)Pers. ·, 全草入药。

【性味】苦，寒。

【功效】杀虫毒。

【主治】疮毒，顽癣，毒蛇咬伤。

【用量】外用 10~20g。

【备注】有毒。

31、癩子果

土家语名：拉铁卡布里

土家语拼音：lax tex kar buf lix

国际音标：la⁵⁵ tie⁵⁵ k'a²¹ pu³⁵ li⁵⁵

【别名】四照花。

【来源】为山茱萸科湖北四照花 *Dendrobenthamia bupchensis* Fang, 果实入药。

【性味】甘、苦，平。

【功效】杀虫毒，消食积。

【主治】小儿蛔虫病（蛔虫），食积腹胀，小儿疳积。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、瘟黄水胀症：山荔枝果 9~15g，水煎服。

2、小走后胎症：山荔枝叶研末，每次 3g，蒸鸡蛋或猪肝服。

32、水银

土家语名：水银

土家语拼音：suix yenr

国际音标：sui⁵⁵ jen²¹

【别名】汞。

【来源】为辰砂矿石冶炼的液华金属汞 Mercury，液体汞入药。

【性味】淡，寒。

【功效】杀虫毒。

【主治】皮肤疮疥，顽癣。

【用量】外用适量。

【备注】有剧毒。

33、铝矿石

土家语名：铝矿阿八

土家语拼音：qianx kuanf ar bar

国际音标：tɕian⁵⁵ k'uan⁵⁵ a²¹ pa²¹

【来源】为方铅矿 Galenite，矿石粉入药。

【性味】咸，寒。

【功效】杀虫毒，坠痰。

【主治】恶疮，疗毒，瘰疬。

【用量】外用，适量。

【备注】有毒。

34、硫磺

土家语名：炮磺

土家语拼音：paof huanr

国际音标：p'au³⁵ xuan²¹

【别名】火药、硫磺。

【来源】为硫磺矿冶炼的硫磺 Sulphur，粉入药。

【性味】酸，温。

【功效】杀虫毒，通便。

【主治】顽癣，疥疮，黄水疮，湿疹，虎寒便秘。

【用量】外用，适量。

【备注】有毒。

【备考】有杀菌、镇咳祛痰作用。

35、马桑叶

土家语名：马桑尔他

土家语拼音：max sanx ex tax

国际音标：ma⁵⁵ san⁵⁵ e⁵⁵ t'a⁵⁵

【别名】马桑树、千年红、马鞍子。

【来源】马桑科植物马桑树 *Coriaria sinica* Maxim.，根及叶入药。

【性味】凉，苦。

【功效】杀虫毒，消肿止痛。

【主治】治疗肿毒，痈疽，顽疮。

【用量】6~10g。

【应用经验】

1、消疮搽剂：马桑叶粉 10g 冰片 5g 挂金灯 10g 青熏 5g。共研，与鸡蛋清调和，外敷患处，治黄水疮；

2、烫伤合剂：马桑根皮 10g 马桑叶 10g 刘寄奴 10g 野茶树根 30g 冬青树叶 10g 茅屋上青苔粉 10g。用茶油泡 1 个月后，外用，每日数次，治烧烫伤有特效。

【备注】有毒。

36、黄常山

土家语名：常山王嘎拉

土家语拼音：sanr sanx wanr gax lax

国际音标：san²¹ san⁵⁵ wan²¹ ka⁵⁵ la⁵⁵

【别名】翻天印（常山）。

【来源】为虎耳草科植物黄常山 *Dichroa febrifuga* Lour. 的根。其嫩枝叶称“蜀漆”；亦供药用。

【性味】苦、辛、寒。有毒。

【功效】截疟，祛痰。

【主治】三分症。

【用量】

【应用经验】

1、三分症：常山 贝母 草果 槟榔 乌梅 生姜各 9g 知母 6g 大枣 3 枚。于疟疾发作前 2 小时服。

2、痰饮壅积：常山 15g 甘草 5g。水煎，入蜜慢服。

【备考】

1、化学成分：含生物碱：黄常山碱甲、黄常山碱乙、黄常山碱丙，三者为互变异构体。还含常山次碱、4-喹啉酮及二种中性荧光性物质、常山素 A、常山素 B，叶并含少量三甲胺。

2、药理作用：①抗疟作用：常山根水浸膏，常山全碱及常山碱甲、乙、丙均有较强的抗疟力，常山全碱的抗疟效价约为喹啉的 26 倍，对鸡疟尤为显著，常山碱甲、乙、丙对鸡疟的效价分别为喹啉的 1 倍、100 倍与 150 倍。常山叶（蜀漆）的抗效价为根的 5 倍。但常山不能防止疟疾的复发。②抗阿米巴作用：常山碱乙体外试验，其抗阿米巴作用较依米丁强；对幼鼠感染阿米巴原虫后的疗效较依米丁高，治疗指数也比依米丁大 1 倍。③解热作用：常山煎剂对人工发热的家兔有解热作用，大鼠口服常山碱丙，其退热作用比乙酰水杨酸还强。④降压作用：常山碱甲、乙、丙对麻醉犬有降低血压、抑制犬心脏和扩张血管的作用。⑤体外实验，对甲型流行感冒病毒 PR8 有抑制作用。⑥对鸽有致腹泻作用。

常用药名笔画索引

- | | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">一画</p> <p>一口印·····</p> <p>一支箭·····</p> <p>一支箭·····</p> <p>一年蓬·····</p> <p>一枝黄花·····</p> <p>一柱香·····</p> <p>一点白·····</p> <p>一点红·····</p> <p>一窝蛆·····</p> <p style="text-align: center;">二画</p> <p>丁香蓼·····</p> <p>十八症·····</p> <p>十大功劳·····</p> <p>十姊妹·····</p> <p>七孔莲·····</p> <p>人屎尖·····</p> <p>八角莲·····</p> <p>九子连环草·····</p> <p>九牛造·····</p> | <p>九月花·····</p> <p>九节风·····</p> <p>九节茶·····</p> <p>九龙盘·····</p> <p>九头狮子草·····</p> <p style="text-align: center;">三画</p> <p>三丫苦叶·····</p> <p>三叶青·····</p> <p>三加皮·····</p> <p>三花龙胆·····</p> <p>三颗针·····</p> <p>干漆·····</p> <p>土三七·····</p> <p>土大黄·····</p> <p>土公蛇·····</p> <p>土甘遂·····</p> <p>土良姜（野姜）·····</p> <p>土狗·····</p> <p style="text-align: center;">土荆皮·····</p> |
|---|---|

土茵陈·····	小败酱草·····
土茯苓·····	小金钱草·····
大叶金腰·····	小洋桃·····
大仙桃草·····	小通草·····
大母猪藤·····	小蓼子草·····
大汗·····	小蜡·····
大红袍·····	山牛膝·····
大青叶·····	山兰·····
大构叶·····	山皮条·····
大金刀·····	山芝麻·····
大狗尾草·····	山玫瑰·····
大夜关门·····	山梔子·····
大通草·····	山蚂蝗·····
大寒药·····	山扁豆·····
大蒜·····	山黄花·····
大辣蓼子·····	交货豆·····
万年青·····	在屏连·····
万年松·····	山梨子·····
小千年棕·····	山腊梅·····
小五爪风·····	山雷子·····
小凤尾草·····	千年矮·····
小古屯·····	千里光·····
小叶蜂窝草·····	千金坠·····
小仙桃草·····	千根草·····
小对叶草·····	广椒七·····
小母猪藤·····	卫矛·····
小远志·····	女谷·····
小报春·····	飞蛾七·····
小岩青菜·····	飞蛾槭·····

飞蛾藤·····
马兰丹·····
马苋菜·····
马尿泡·····
马尾七·····
马尾连·····
马胡梢·····
马桑叶·····
马蹄香·····
马鞭七·····

四画

丰花草·····
王瓜·····
王辣蚱·····
天青地白·····
天韭·····
天葵子·····
元宝草·····
木子树·····
木芙蓉花·····
木姜子·····
木鳖子·····
五匹风·····
五步蛇·····
消遣草·····
水八角莲·····
水登的·····
水龙骨·····
水莲·····

水黄连·····
水菖蒲·····
水银·····
水蜈蚣·····
牛血莲·····
牛屎虫·····
毛马兰·····
毛连连·····
长蕊杜鹃·····
化香树·····
化食草·····
风花菜·····
乌棒七·····
乌稍蛇·····
凤尾草·····
文王一支笔·····
火草·····
火炭母·····
火烧兰·····
火葱头·····
孔雀尾·····
玉簪花·····

五画

石龙子·····
石龙芮·····
石板花·····
石菖蒲·····
石蒜·····
石榴根·····

龙枣·····
龙胆地丁·····
龙脑香子·····
龙眼根·····
叶下红·····
号筒杆·····
四匹箭·····
四方麻·····
四叶参·····
白马桑·····
白开口箭·····
白毛冲天炮·····
白毛藤·····
白花狗牙瓣哈·····
白花蛇舌草·····
白鸡七·····
白屈菜·····
白粉藤·····
白梓树·····
白插泥花·····
冬瓜仁·····
冬葵·····
包谷七·····
半枝连·····
半截烂·····
头红袍·····
奶参·····
对端的方草·····

六画

动蕊花·····
扣子果·····
老汉背娃娃·····
老君扇·····
老虎姜·····
地石榴·····
地瓜·····
地花椒·····
地苦胆·····
地胡椒·····
地星宿·····
地葫芦·····
地锦草·····
耳挖草·····
朴树·····
过路黄·····
百味莲·····
百金花·····
百脉根·····
灰灰菜·····
尖刀草·····
网蜘蛛·····
朱砂莲·····
朱砂根·····
竹叶细辛·····
竹叶莲·····
竹苓（雷丸）·····
血水草·····
血升麻·····

血丝大黄·····
血当归·····
血盆草·····
血蜈蚣·····
血藤·····
全毛百草·····
羊马草·····
羊耳草·····
米口袋·····
米辣子·····
米糙·····
灯心草·····
灯龙花·····
灯盏七·····
江边一碗水·····
安息香·····
红牛 g 七·····
红走马胎·····
红豆·····
红鬼笔·····
红荷叶·····
红桐·····
红娘·····
红榧子·····

七画

麦刁七·····
走啣竹·····
芫花根·····
花边草·····

花蛇一支箭·····
花斑蝥·····
连钱草·····
岗梅根·····
岗稔根·····
乱鸡窝·····
条叶蓟·····
冷水丹·····
穷树叶·····
补阳丹·····
鸡爪连·····
鸡矢藤·····
鸡血莲·····
鸡肝黄·····
鸡脚黄·····
鸡蛋·····

八画

苦瓜·····
苦苣菜·····
苦参·····
苦痧药·····
苦楝皮·····
杯子七·····
松花粉·····
刺苋菜·····
刺黄连·····
刺猬皮·····
枣儿红·····
虎耳还阳·····

味牛膝·····
岩五爪·····
岩火炮·····
岩节莲·····
岩田七·····
岩地丁·····
岩芹菜·····
岩荞麦·····
岩柴胡·····
岩黄芩·····
岩黄连·····
罗钱树皮·····
败毒莲·····
败酱草·····
钓鱼杆·····
刮金板·····
爬岩仙·····
金丝发·····
金丝梅·····
金刚藤·····
金花草·····
金鸡尾·····
金鸡脚·····
金鱼花·····
金线吊乌龟·····
金香炉·····
金盆草·····
金莲花·····
金粉藤·····

鸳鸯花·····
肺形草·····
肥猪头·····
肥猪苗·····
鱼尾草·····
鱼腥草·····
鱼蓼七·····
鱼鳅串·····
兔耳伞·····
狗牙半枝莲·····
狗牙瓣·····
狗爪半夏·····
狗花椒·····
狗卵子·····
狗尾巴·····
夜合草·····
夜香牛·····
油桐叶·····
泡花树·····
泡桐·····
泥胡菜·····
空心杆·····
降龙草·····
线盖·····

九画

贯叶连·····
珍珠莲·····
珍珠菜·····
挂金灯·····

指甲花·····	洞苋菜·····
草芙蓉·····	窃衣根·····
草灵仙·····	神豆腐·····
荞麦七·····	十画托儿儿七·····
茶饼·····	珠兰·····
胡豆连·····	起泡草·····
胡枝子·····	莲蓬草·····
南瓜广木香·····	恶鸡七·····
南瓜子·····	恶实·····
南竹笋·····	桂皮（香桂）·····
药王刺·····	桃子·····
相思虫·····	豇豆树皮·····
怪柳·····	破子草籽·····
厚皮树·····	破棉絮·····
牵牛子·····	鸭儿嘴·····
背蛇生·····	钻地风·····
蚂蝗莲·····	铁仔·····
香叶·····	铁血子·····
香料·····	铁灯苔·····
香椒子·····	铁扁担·····
秋胡豆·····	铁破罗·····
秋葵花·····	铃铃草·····
鬼打伞·····	铅矿石·····
盾形草·····	秤砣梨·····
独叶一枝花·····	积雪草·····
独角·····	臭黄荆·····
急解索·····	臭梧桐·····
差珠子·····	臭椿·····
炮磺·····	翁须七·····

胭脂花·····
疖积草·····
烟叶·····
烟管头·····
烙铁头·····
海金子·····
海蚌含珠·····
扇子七·····
通泉草·····

十一画

用卡卡姆·····
接骨藤·····
黄三七·····
黄瓜香·····
黄瓜藤·····
黄花五味草·····
黄花龙牙·····
黄豆七·····
黄连木·····
黄败酱·····
黄药子·····
黄姜·····
黄疸树·····
黄海棠·····
黄剥皮·····
黄鳝藤·····
雀儿舌头·····
野升麻·····
野芋头·····

野百合·····
野饭豆·····
野扁韭·····
野鸭肉·····
野菊花·····
野棉花·····
野辣椒·····
蛇疙瘩·····
蛇泡草·····
蛇盘花·····
铜锤草·····
银环蛇·····
银钱草·····
甜瓜蒂·····
梨头草·····
梨罗根·····
盘龙参·····
猪牙皂·····
猪殃殃·····
猫爪刺·····
猫耳朵·····
猫舌草·····
猫眼草·····
猫猫草·····
粗榧子·····
粗糠柴·····
婆婆针·····
梁王菜·····
惊风草·····

蛋不老·····

十二画

斑叶兰·····

喜树·····

搜山虎·····

葫芦茶·····

篇蓄·····

棉花七·····

裂叶奶浆草·····

雄黄·····

雄黄连·····

紫竹根·····

紫血根·····

紫珠草·····

紫藿草·····

黑石神·····

黑虎七·····

黑参·····

隔山撬·····

蓖麻·····

十三画

一把伞·····

榉树皮·····

碎米桠·····

雷公莲·····

雷公藤·····

雾水葛·····

路边青·····

路边黄·····

蜈蚣·····

蜈蚣草·····

蜂子七·····

锦灯笼·····

雉鸡尾·····

裸朔·····

十四画

葶菜·····

蝇子草·····

蜘蛛香·····

鼻血莲·····

漆姑草·····

漏芦·····

十五画

樱桃·····

豌豆七·····

十六画

螃解七·····

螃蜞菊·····

用资树根·····

壁虎·····

十八画

藤贝母·····

藤龙胆·····

翻天印·····

癞子果·····

癞蛤蟆·····

二十一画

霸王七·····

癩疔草·····

土家语汉字笔画索引

一画

一蜡被卡蒙 yir lar bif kar
mongr·····
一簪卡普 yif zanx kax pux·····

二画

二拉贝母 ef lax beif mux·····
二拉龙胆 ef lax longr danx·····
二拉实 g 查 ef lax sir ker car·····
丁香蓼 denx xianx liaof·····
八步拿 ba bu na203·····

三画

三七王嘎里 sanx qir wanr gax
lix·····
三丫苦尔他 sanx yax kux ex tax·····
三加他拔 sanx jiax tax par·····
三花龙胆 sanx fax longr danx·····
土三七 tux sanx qir·····
土大黄 tux daf huanr·····
土大黄 tux daf huanr·····
土甘遂 tux ganx xix·····
土荆他爬 tux jinx tax par·····
土茵陈 tux yinx cenr·····
土常山 tux sanr sanx·····

大汗古泽此巴 gux cer cix bax·····

万年信嘎 wanf nianr xinf gax·····

上艾阿实 sanf ngax ar sir·····

上矮 sanf ngaix·····

小亡泽方实 g 查 mangr cer kuix sir
ker car·····

山兰 sanx lanr·····

千斤坠 qianx jinx zuif·····

千年热色 qianx nianr rer ser·····

千年棕被亏 qianx nianr zongx bif
kuix·····

千年矮 qianx nianr nfai·····

千里关 qianx lix guan·····

广趴古七 guanx pax gux qir·····

卫矛 wuif maor·····

子牙皂 ziv yar zaof·····

子尼嘎被实 g 查 ziv nir gar bif sir
ker car·····

子泥嘎此巴二拉 ziv nir gar cix bax
ef lax·····

子泥嘎被亏二拉 ziv nir gar bif kuix
ef lax·····

的枪古图科巴 ziv sif gax tur kox

bax...

飞蛾树? ?

马兰丹 max lanr danx.....

马列碰七 max ler pongf qir.....

马那土 max laf tux.....

马苋菜 max xianf caif.....

马胡梢 max hur saox.....

马桑尔他 max sanx ex tax.....

马桑阿实 max sanx ar sir.....

马蹄香 max tir xianr.....

四画

丰花草 hongx fax caox.....

王三二拉 wanr sanx ef lax.....

王瓜二拉 wanr guar ef lax.....

王剥皮 wanr bof pir.....

王嘎拉科书 wangr gax lax kox
sux.....

王辣蚱 wanr lar zar.....

元宝实 g 查 yanr baox sir ker
car.....

木防己 mur huanr jix.....

木芙蓉长普 mur hur yongr kax
pux.....

木油卡蒙 muf your kar mongr.....

木鳖子 mur pier zix.....

五爪龙 wux zaox longr.....

五星实 g 查 wux xinx sir ker car.....

不此哈车 bur cir hax cex.....

瓦所西 wax sox xix.....

日阿 被拉实 g 查 rar bif lax sir ker
car.....

日阿灭莲 rar mier lianr.....

日阿尼用信碰 rar nir gar ler
pongf.....

日阿吉王嘎里 rar jir wangr gax
lix.....

日阿吉拖嘎 rar jir tox gar.....

日阿吉爬连 rar jir par lianr.....

日阿列 rar.....

日阿列碰实 g 查 rar ler pongf sir
ker car.....

日阿列碰被亏 rar ler pongf
kuir.....

日阿列碰被亏实 g 查 rar ler pongf
bif kuix sir ker car.....

日阿色二拉 rar ser ef lax.....

日阿被乃 rar bif naix.....

水银 suix yenr.....

牛王刺 niur wanr cif.....

毛连连 maor lianr lianr.....

毛拖里翁且伞 maor to xlix ongr qief
sanv...

长蕊恰亏哈 canr ruif qiar kuif
har.....

化香卡蒙 huaf xianx kar
mongr.....

化食草 faf sir caox.....

仍嘎黑欸那夫 renf gax heif naf

hux……

乌棒七 wux banf qir……

乌稍窝 wux saox wox……

文王一支笔 wenr wanr yir zix
bir……

火葱科巴 hox congr kox bax……

孔雀列碰 kongx qiaor ler pongf……

巴梭尔 bax sox ex……

五画

玉簪卡普 yif zanx kax pux……

石龙芮 sir longr nuiX……

石托 sir tof……

石榴机纳 sir liux jix lar……

龙闹香布里 longr laox xianx bif
lix……

龙胆地丁 longr danx dif denx……

灭尔二拉 miev ef lax……

灭皮嘎拉 mief pir gaf lax……

灭丝大黄 miev six daf huanr……

灭当归 miev danx guix……

灭泽实 g 查 miev cer sir ker car……

灭哈七 mier har qir……

灭格欵梯实克查 miev geix tix sir
ker car……

灭蜈蚣 miev wur gongr……

卡铁实克查 kax tef sir ker car……

卡普王嘎里那借 kax pux wanr gaf
lix
laf jief

卡普边边实 g 查 kax pux bianx
bianx

sir ker car……

卡普斑蝥 kax pux banx miaor……

叶各莲 yer gor lianr……

叶嗲黑欵 yer dex heix……

仙桃草被 xianx taor caox bif……

白梓卡蒙 bef zix kar mongr……

他司二拉 tax six ef lax……

他司长普 tax six kax pux……

他司捏龙 tax six niex longx……

他色苋菜 tax ser jianf caif……

他色黄连 tax ser huanr lian……

他色黄柏 tax ser huanr ber……

他爬那卡蒙 tax par laf kar
mongr……

印那这 yenf naf zef……

尔他八提面姐 ex tax bar tir mianx
jiex……

尔他皮嘎拉忙泽亏 ex tax pir gar lax
manr cer kuiX……

尔他此巴金腰 ex tax cix bax jinx
yaox

尔他若欵参 ex tax rex eix senx

尔他所欵信嘎 ex tax sox eix xinf
gax……

尔他香卡蒙 ex tax xianx kar
mongr……

尔他被米马窝 ex tax bif mix max
kox……

冬瓜布里 dongx guax buf lix……

冬葵 dongx kuir ……	动蕊卡普 dongf ruif kax pux ……
务及提 g wuf jir tir kex ……	扣子布里 kouf zix buf lix ……
务气起实 g 查 wuf qif qix sir ker car……	老君南切 laox jinx lanr qief ……
务灭尔莲 wuf miev lianr ……	老嘎拉爬 laox gax lax par ……
务司布利 wuf six buf lif ……	地星宿 dif xinx sur ……
务吉提 g 面姐 wuf jir tir kex mianx jiex ……	朴卡蒙 pur kar mongr ……
务色铁迫 wuf ser tex per ……	百金卡普 ber jinx kax pux ……
务给龙造 wuf gex longr caof ……	列阿实思思瓣 hanx lier ar sir six six manf …
包布七 baox buf qir ……	此巴反嘎尔他 cix bax xinf gax ex tax ……
兰八 lanr bar ……	此的商桃实 g 查 cix bax xianx taor sir ker car
半枝连 banf zix lianr ……	此巴寒药 cix bax hanr yaof ……
半截烂 banf jier lanf ……	尖刀实 g 查 jianx daox sir ker car ……
写马鞭 xiex max bianx ……	网补此 wanx bux cix ……
写仔 xiev zaix ……	朱砂机纳 zux sax jix lar ……
写扣子 xiev kouf zix ……	全毛百草 qianr maor her caox ……
写灯台 xiev denx tair ……	色铁迫一窝俪 ser ter per yif kox lox ……
写罗皮嘎拉 xiev lof pir gar lax ……	次主他爬 cix zux tax par
写扁担 xiev bianx danr ……	羊毛分筋? ? ……
出嘎拉榧子 cur gar lax huix zix ……	羊砣罗毕 yanr tor lox bif ……
对端的方实 g 查 duif yer sif huanx sir ker car	米马七 miv max qir ……
母业尔他莲 mux ner ex tax lianr ……	米务兰 miv wuf lanr ……
母业苓 mux nier lenr ……	米实壳罗阿捏 mix sir kor lor ar niex ……
母业烂嘎机纳 mux nier lanf gax jix lar ……	米实 g 查 miv sir ker car ……
母尔他细辛 mux ex tax xif xinx ……	

六画

米哈实 g 查 mix har sir ker car……	lix kax pux……
灯龙卡普 denx longr kax pux……	抗苦升麻 kanr kux senx mar……
灯盏七 denx zanx qir……	抗苦去布里 kanr kux qif buf lix……
灯笼此巴 denx longr cix bax……	抗苦叶叶花 kanr kux yef yef fax……
灯笼实 g 查 denx longr sir ker car……	抗苦务吉提 g kanr kux wuf jir tir kex……
忙泽二拉 manr cer ef lax……	抗苦写下 kanr kux xiex bur……
忙策参 manr cer senx……	抗苦皮条 kanr kux pir taor……
安息香 anx xir xianx……	抗苦多不 kanr kux dox bur……
安额阿所猛 anx ngax sox mongx……	抗苦你补 kanr kux nix bux……
那土 laf tux……	抗苦尿池 kanr kux niaof cir……
那土广木香 laf tux guanx mur xianx……	抗苦枇杷 kanr kux pir par……
那土不里 laf tux buf lix……	抗苦罗华生 kanr kux lor huar senx……
那黑欸黑欸味莲 naf heix heix wuif lianr……	抗苦柏列思 kar kux bex liex six……
欢喜卡蒙 huanx xix kar mongr……	抗苦科苏 kuanr kux kox sux
红袍此巴 hongr paor cix bax……	抗苦洒石 kanr kux sav sir
红樞布里 hongr huiX buf lix……	抗苦扁豆 kanr kux bianx douf……
	抗苦扁韭 kanr kux bianx jiux……
	抗苦挫布 kanr kux cof buf……
	抗苦海脚 kanr kux haix jiaor……
	抗苦菊花 kar kux jir fax……
	抗苦腊梅 kanr kux lar meir……
	抗苦撒拉 kanr kux piex lax……
	抗苦薄荷 kanr kux bor hor……
	芫花卡普机纳 yanr fax kax pux jix lar……
	g 欸实 g 查 keif sir ker car……
	g 欸致子那土 keif zif zix laf

七画

麦他册哈车 mef tax cer hax cex……	
麦他泽莲 mef tax cer lianr……	
远志被 yanx zif bif……	
走吆母业 zoux yaox mux nier……	
抗 g 油菜思 kanr kux your caif six……	
抗苦七布机纳 kanr kux qif buf jix lar……	
抗苦王嘎里卡普 kanr kux wanr gax	

tux……	免姐走马胎 mianx jiex zoux max
g 欸致子苣哈车 keif zif zix jif hax	taix……
cex……	免姐阿捏 mianx jiex ar niex……
克欸致子实克查 keif zif zix sir ker	免姐鬼笔 mianx jiex guix bif……
car……	免姐桐 mianx jiex tongr……
g 欸致子参 keif zif zix senx……	弃布里七 qif buf lix qir……
g 欸被亏实 g 查 keif bir kuix sir ker	沙被炸起 sax bif zaf qix……
car……	没他泽二拉 mef tax cer ef lax……
里 g 欸致子胆 lix keif zif zix	没他泽他色 mef tax cer tax ser……
danx……	没辛嘎里阿石 mef xinf gax lix ar
里提石留 lix tir sir liux……	sir……
里提花椒 lix tir fax jiaox……	没嘎石托 mef gar sir tof……
里提披趴蜈蚣 lix tir pix pax wur	宋列碰实 g 查 songf lief pongf sir
gongr……	ker car…
里提枇杷 lix tir pir par……	宋钓杆 songf diaof ganx……
里提胡椒 lix tir hur jiaox……	宋海角七 songf haix jiaox qix……
里提葫芦 lix tir hur lur……	补此香 bux cix xianx……
岗梅根 ganx meir genx……	补阳丹 bux yanr danx……
岗稔根 ganx renf genx……	灵仙实 g 查 lenr xianx sir ker
我圈圈窝 ngox qianx qianx wov……	car……
我铜钱实 g 查 ngox tongr qianr sir	屁他此巴 pif tax cix bax……
ker car…	屁他被 pif tax bif……
乱日阿筒 luanf rar tongr……	阿八节莲 ar bar jier lianr……
利科书 lif kox sux……	阿五瓜 ar wux zaox……
利烂嘎七 lif lanf gax qir……	阿火炮 ar huox paof……
利恩切实 g 被亏 lif enr qief sir ker	阿石托 ar sir tof……
car bif kuix……	阿卡八卡普 ar kar bar kax pux……
兵马 binx max……	阿叶伞爹 av yer sanv dev……
你咚嘎莲 nix dongr gaf lianr……	阿田七 ar tianr qir……

阿他丁 ar dif denx……
 阿妈安额阿 ax max anx ngax……
 阿芹菜 ar qinr caif……
 阿青麦 ar qinx mer……
 阿实屁屁二拉 ar sir pif pix ef
 lax……
 阿实是嘎二拉 ar sir sif gaf ef
 lax……
 阿实插泥卡普 ar sir car nir kax
 pux……
 阿信捧被 ar xinf pongx bif……
 阿黄芩 ar huanr qinr……
 阿黄连 ar huanr lianr……
 阿菖蒲 ar canx pux……
 阿嘎七 ax gar qif……

八画

青麦七 qinx mer qir……
 青青标 qinf qinf biao……
 青苦里 qinx kux lix……
 拉司奶 lax six nai……
 拉司奶被 lax six nai bif……
 拉拢阿夫 lax longx ax hux……
 拉苦信嘎 lax kux xinf gax……
 拉铁卡布里 lax tex kar buf lix……
 苦咱屁趴利 kux zax pix pax lif……
 苦痧药 kux sax yaor……
 苦楝他爬 kax lanr tax par……
 若马实 g 查 rof max sir ker car……
 若哈列 rox hax lier……

若恩且实 g 查 rof enr qief sir ker
 car
 直儿海脚 zir er haix jiaox……
 直儿糙 zir er caof……
 直儿糯贴 zir er lof tex……
 杯子七 beix zix qir
 枣司免姐 zaox six mianf jiex
 罗钱卡他爬 lor qianr kar tax
 par……
 败酱实 g 查 baif jianx sir ker
 car……
 败酱草被亏 baif jianx caox bif
 kui……
 刮金板 guar jinx banx……
 所那致 sox laf zif……
 所泽阿不 sox cer ar bur……
 金丝发 jinx six huar……
 金丝梅 jinx six meir……
 金刚二拉 jix ganx ef lax……
 金鸡列碰 jinx jix ler pongf……
 金线吊乌龟 jinx xianf daof wux
 guix……
 金钱草被 jinx qianr caox bif……
 鸳鸯花 jinx yenr fax……
 夜关门此巴 yef guanx menr cix
 bax……
 泡卡普卡蒙 paox kax pux kar
 mongr……
 泡泡不实 g 查 paof paox bur sir ker

car·····	相思铁迫 xianx six tex per·····
泡桐 paox tongr·····	怪柳 senf niux·····
泥胡菜 nir hur caif·····	歪叶子兰? ? ? ·····
泽车前 cer cex qianr·····	面姐升麻 mianx jie x senx mar·····
泽叶角莲 cer yer jiaor lianr·····	面姐弃布里 mianx jie x qif buf
泽务气起七 cer wuf qif qix qir·····	lix·····
泽兰此巴 cer lanr cix bax·····	面姐藕尔他 mia x jie x oux ex tax·····
泽灯草 cer denx coax·····	耐鸡长蒙机纳 naif jix kar mongr jix
泽莲 cer lianr·····	lar·····
泽黄连 cier huanr lianr·····	背蛇生 beif ser senx·····
泽菖蒲 cer canr pux·····	是嘎阿实冲天炮 sif gax ar sir xiaf
泽移时布里 cer yir sir buf lix·····	kux caox
泽铺鲁嘎 cer puf lux gax·····	是噶马兰 sif gaf max lanr·····
泽蜈蚣 cer wur gongr·····	思起血莲 enf qix xier lianr·····
空心杆 kongx xin x ganx·····	哈列吉米三步跳 hax ler jir mix sanx
降龙草 xianr longr caox·····	bux taox·····
线盖 xianf gaif·····	哈列列迫 hax ler lef pex·····
细梗胡枝子 xif genx hur zix zix·····	哈中信碰 hax lier lier pongf·····
	哈列此巴列碰实 g 查 hax lier cix bax
	lier pongf sir ker car·····
	哈列思思半枝莲 hax lier six six
	banf bianx lianr·····
	哈列思思瓣 hax lier six six
	manf·····
	哈列错布 hax lier cof buf·····
	香料 xianx liaox·····
	秋天老司司 qiux tanx laor six
	six·····
	秋胡豆 qiux hur douf·····

九画

贯叶连 guanf yer lianr·····	
珍珠哈车 zenx zux hax cex·····	
草芙蓉 caox hur yongr·····	
茶哭 car kur·····	
胡泡泽拉书 hur paof cef lax sux·····	
南八 lanr bar·····	
南且七 lanr qief qir·····	
南竹迷米 lanr zur mif miv·····	
南椿木机纳他爬 lanr cuenx mur jix	
lar tax par·····	

科巴给布狮子实克查 kox bax gex bux six zix sir ker car……	捏被玉那 nief bif yif laf……
科卡普实 g 查 kox kax pux sir ker car……	热书长普哈车 ref sux kax pux hax cex……
科宋卡普 kox songf kax pux……	热撇思欸 ref piev seix ……
科屁屁二拉 kox pif pix ef lax……	莲蓬草 lianr pongr caox ……
科香炉 kor xianx lur……	莫玉那实 g 查 mor yif lax sir ker car……
科莲花 kox lianr fax……	莫吉迷他色 mor jir mir tax ser……
科格欸梯实 kox geix tix sir……	莫胡踏 mor hur tar……
盾形实 g 查 duenf xinr sir ker car……	莫恩且 more nr qief ……
独叶一枝花 dur yer yir zix fax……	莫翁且 mor ongr qief ……
独 g dur kev……	莫被实 g 查 mor bif sir ker car……
迷米咚东 mif miv dongr dongx ……	莫床上实 g 查 mor lof bux sir ker car……
炮竹布里卡蒙 paof zuf buf lix kar mongr …	恶实 wdf sir……
炮磺 paof huanr ……	桂皮 guif pir ……
烂才合实 g 查 lanf caix hof sir ker car……	桐剥利尔他 tongr bor lif ex tax……
烂嘎参 lianf gax senx ……	桃子 taor zir ……
烂嘎得尔他 lanf gax der ex tax……	破子实 g 查 pof zix sir ker car……
洞苋菜 dongf hanf caof ……	破看一波立窝 por pax cix box lir wov……
洋托糯 yanr tor lof ……	钻地风 zuanx dif hongx ……
窃衣 qier yix ……	铁血子 ter xier zix ……
给节风 gex jier hongx	积雪实 g 查 jir xier sir ker car……
给节卡普 gex jief kax pux	借从菜 jief congr caif ……
给司卡普 gex six kax pux 托儿画	借从菜卡普 jief congr caif kax pux……
耗儿七 hoax er qir……	俚色点点 lox ser denx danx ……
珠兰 zux lianr ……	翁且古主实 g 查 ongr qief gux zux

sir ker car
 痞积草 ganx jir caox……
 烟尔他 yanx ex xax……
 烟管科巴 yanx guanx kox bax……
 烙铁科巴 lor tiex tour……
 烙铁科巴窝 lor ter kox bax wox……
 海金子 haix jinx zix……
 海蚌含珠 haix banf hanr zux……
 海脚此巴 haix jiaox cix bax……
 被亏五爪风 bif kuix wux zaox
 hongx……
 被亏对叶实 g 查 bif kuix duif yer
 sir ker car
 被拉得实 g 查 bif lax der sir ker
 car……
 通草此巴 tongx coax cix bax……
 通草被 tongx caox bif……
 通泉实 g 查 tongx qianr sir ker
 car……

十一画

用卡卡蒙 peir peir kar mongr……
 黄瓜香 huanr guax xianx……
 黄花龙牙 huar fax longx yar……
 黄连卡木 huanr lianr kar mur……
 黄连阿巴 huanr lianr ax bax……
 黄败酱 huanr baif jianf……
 黄药子 huanr yaor zir……
 黄海棠 huanr haix tanr……
 梅花被 meir fax bif……

野棉花 yex mianr fax……
 唯的二拉 weir dix ef lax heif……
 铜锤草 tongr cuir caox……
 铝矿阿八 qianx kuanf ar bax……
 甜瓜借那 tianr guax jief lax……
 梨罗根 lir lor genx……
 盘龙参 panr longr senx……
 猫从尔他 maox congr ex tax……
 猫杪卡普屁屁 maox congr kax pux pif
 pix……
 粗榧 cux huix……
 粗糠柴 cux kanx cair……
 梁王茶 lianr wanr car……
 惊风实 g 查 jinx hongx sir ker
 car……
 蛋不老 danf bur laox……

十二画

斑叶兰 banx yer lianr……
 搜山利 soux sanx lif……
 葫芦阿车 hur lur af cex……
 散梦 g 思 sanf mongf kex six……
 惹皮箭 rev pir jianf……
 篇蓄 bianx xiur……
 雄黄 xiongr xuanr……
 紫血机纳 zir xier jix lar……
 紫藿草 zif xof ciao……
 铺土菊 puf tux jir……
 铺早早思 puf zaox zaox six
 铺糯布机纳 puf lof buf jix lar

筛桶米 saix tongx kar……

鲁嘎阿纳二拉 lux gax ax nar ef
lax……

窝三叶泡 wor sanx yex paox……

窝阿实王拉实查查 wox ar sir yif lax
sir ker car……

窝阿实玉拉实 g 查 wox ar sir yir lax
sir ker car……

窝得卡那 wox def kax lax……

窝盘卡普 wox panr kax pux……

窝糯梯 wox lof tix……

隔山消 gef sanx xiaox……

十三画

一把伞 pur gongx yinx……

蒙列碰莲 mongr lier pongr
lianr……

榉卡蒙他爬 jix kar mongr tax
par……

蜈蚣 wur gongr……

蜈蚣室 g 查 wur gongr sir ker
car……

矮地茶 ngaix dif car……

满天星 manx tianx xin……

十四画

撇拉莲 piex lax lianr……

蓼子草被亏 liaof zix caox bif
kui……

漏芦 louf lur……

十五画

樱桃 yenx taor……

豌豆七 wanx douf dir……

豌豆七 wanx douf qir……

箭那致 jianf naf zif……

十六画

螃嘎七 panr gaf qir……

螃琪菊 banx qix jir……

十七画

翳子实 g 查 yif zix sir ker car……

十八画

癞蛤蟆 laif ker mar……

癩疔草 naif lir caox……

拉丁学名索引

A

- Abacopteris penangiana* (Hook.) Ching
Abelmoschus manihot Medic.
Acalypha australis L.
Acanthopanax trifoliatum (L.) Merr.
Acer davidii Franch.; *A. oblongum* Wall. ex Dc. Var. *Concolor* Pax.
Achyranthes longifolia Mak.
Acorus calamus L.
Acorus gramineus Soland
Actaea asiatica Haea.
Actinidia arguta (Sieb. et Zucc) planch.
Actinidia coriacea (Fin. et Gagn.) Dunn
Adenostemma lavenia (L.) O. Ktze.
Aeschynomene indica L.
Agkistrodon acutus (Gunther)
Agkistrodon halys (Pallas)
Agrimonia pilosa Ledeb.; *A. pilosa* Ledeb. var. *japonica* (Miq.) Nakai.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Ainsliaea fragrans Champ.
Ainsliaea grossedentata Franch.
Ainsliaea ruhnikolia Franch
Ajuga decumbens Thunb.

Alchornea davidii Franch.
Aletris spicata (Thunb.) Franch.
Aleurites fordii Hems1.
Alisma canaliculatum A.Br. et Bouche.
Allium fistulosum L.
Allium paepalanthoides Airy-Shaw
Allium satium
Allium sativum L.
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
Althaea rosea (L.) Cavan.
Amarantus spinosus L.
Amitostigma gracile (Bl.) Schltr.
Ampelopsis delavayana var. *genliliana* Hand.
Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino
Anaphalis aureopunctata Lingelsh. et Borza.
Anas platyrhynchos L.
Andraehnae chinensis Bunge
Androsaceumbellata (Lour.) Merr.
Anemone hupehensis Lemoine
Aranea ventricosa (L.) Koch
Arctium lappa L.
Ardisia crenata Sims
Ardisia crispa (Thunb.) A. DC
Ardisia japonica (Thunb.) Bl.
Arenaria serpyllifolia L.
Arisaema fargesii Buchet
Arisaema rnizounatum G. E. C. Fischer
Aristolochia fordiana Hems1.
Aristolochia kwangsiensis W. Y. chun et F. C. Howex C. F. Liang

Aristolochia leterophylla Hems1.

Arthraxom hispidus (Thunb.) Makino var. *cryptatherus* (Hack.) Honda

Arthromeris mairei (Brause) Ching

Asarum forbesii Maxim

Asarum sieboldii Miq.

Aspidistra lurida ker-Gawl

Aster ageratoides Turcz.

Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Sav.

Avistolochia keddei Levl.

B

Balanophora involucrata Hook. f.

Bauhinia faberi Oliver

Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr.

Begonia hemsleyana Hook. f

Begonia palmate D. Don.

Belamcanda chinesis (L.) DC.

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.

Berberis Soulieana Schneid

Berberis uirgetorum Schneid.

Berchemia floribunda Wall. Brongn.

Bidens bipinnata L.

Bischofia javanica BL.

Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.

Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet

Borreria stricta (L. f.) G. E. W. Mey.

Botrychium lanuginosum wall.

Breynia frutieosa (L.) Hook. f.

Briggsia mihieri (Franch.) Craib.

Broussonetia Kazinoki Sied. et Zucc

Broussonetia papyrifera. (L.) Vent.

Buddleia lindleyana Fort.

Buddleja davidii Fr.

Bufo bufo gargarizans Cantor

Bungarus multicinctus Blyth

Buxus harlandii Hance

C

Caesalpinia nuga Ait.

Caesalpinia sepiaria Roxb.

Calanthe davidii Franch

Calanthe discolor Lindl.

Calathodes oxycarpa spraguc; *C. polycarpa* Ohwi.

Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch

Calophanoides chinensis (Champ.) C. Y. Wu. et. H. S. Lo

Camellia oleifera Abel.

Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. *C. radicans* (L.) Seem.

Camptotheca acuminata Decne.

Cardiospermum halicacabum L.

Carpesium cernuum L.

Cassia mimosoides L.

Cassia occidentalis L.

Catalpa ovata Don.

Catharsius molossus L.

Cayratia japonica (Thunb.) Gagn.

Celtis biondii Pamp.

Centaurium pulcnellum Druce par. *altaicum* Kiegawa et Hara.

Centella asiatica (L.) Urban

Centipeda minima (L.) A. Br. et Ascher.

Cephalotaxus oliveri Mast.

Cephalotaxus sinensis (Rehd. et Wils.) Li
Cercis chinensis Bge.
Changnienia amoena Chien
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
Chimonanthus nitens Oliv.
Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
Chloranthus spicatus (Thunb. •) Makino
Chloranthus japonicus Sieb.
Chrysosplenium macrophyllum Oliv.
Cimicifuga acerina (S. et Z.) Tana.
Cimicifuga simplex Wormsk.
Cinnamomum wilsonii Gamble; *C. burmannii* (Nees) Bl.
Cirsium japonicum DC.
Cirsium lineare (Thunb.) Sch. -Bip
Cissus modecoides Planch • var *subintegra* Gagn.
Clematis finetiana Levl. et Vant.
Clerodendrum trichotomum Thunb.
Clerodendron cyrtophyllum Turcz
Clerodendrum bungei Steud.
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr
Clinopodium confine (Hance) O. Ktze.
Cocculus trilobus (Thunb.) DC.
Codonopsis lanceolata (Siedetzucc) Trautv
Codonopsis lanceolata Benth. et Hook.
Coix lachryma ~ *jobi* L.
Colocasia antiquorum Schott et Endl.
Coniogramme japonica (Thunb.) Diels
Coptis chinensis Franch

Coriaria sinica Maxim.
Corydalis dauidii Franch.
Corydalis incisa (Thunb. •) Pers.
Corydalis racemosa (Thunb.) Pers.
Cotinus coggygria Scop. var. *Pubescens* Engl.
Cotoneaster adpressus Bois
Crawfurdia fasciculate Wall
Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
Crepis lignea (Vant.) Babc.
Crotalaria sessiliflora L.
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita moschata Duch.
Cymbidium faberi Rolfe
Cynanchum atratum Bunge
Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa
Cynanchum paniculatum (Bge.) Kitdg.
Cynanchum wilfordi (Maxim.) Hemsl.
Cypripedium japonicum Thunb

D

Daphne genkwa sieb. et. Zucc.
Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.
Dendranthema indicum (L.) Des Monl.
Dendrobenthamia bupchensis Fang
Dennstaedtia wilfordii (Moore) Christ
Desmodium caudatum (Thunb.) DC.
Desmodium fallax schindi
Desmodium racemosum (Thunb.) Dc.
Desmodium sambuense (D. Don) De.

Desmodium triquetrum (L.) DC.

Dichocarpum dalzilai (Drumm. et Hutch.) W. T. Wang et Hsiao

Dichondra repens Forst.

Dioscorea cirrhosa Lour.

Dioscorea Dobulbifera L. *bulbifera* L.

Dioscorea zingiberensis C. H. Wright

Dipelta fleribuda Maxim

Diphylleia sinensis H. L. Li

Dryobalanops aromatica Gaertn. f.

Duchesnea indica (Andr.) Focke

Dysosma difformis (Hemsl. et Wills) T. H. Wang

Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu ex Ying

Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng

E

Elaeagnus cuprea Rehb.

Emilia sonchifolia (L.) DC.

Eomecon chionantha Hance

Epipactis mairoei Schztr.

Epipremnopsis sinensis (Engl.) H. Li

Erigeron annuus (L.) Pers.

Erinaceus europaeus L.

Euchresta tubulosa Dunn

Eumeces chinensis (Gray)

Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth

Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.

Eupatorium chinense L.

Eupatorium japonicum Thunb.

Euphorbia chrysocoma Levl. et Vant.

Euphorbia esula L.

Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia humifusa Willd.
Euphorbia hylonoma. Hand. -Mazz
Euphorbia lathyris L.
Euphorbia lunulata Bge.
Euphorbia thymifolia L.
Evodia tepta (Spr.) Merr.

F

Fagopyrum cymosum Meisn.
Farfugium japonicum(L.)*kitam*
Ficus pandurata Hance
Ficus sarmentosa Buch. Ham. ex J. E. Sm. var. *henryi* (King) Corner
Ficus tikoua Bur.

G

Galenite
Galium apdrine Lvar *tenerun* L.
Gallus gallus domesticus Braisson
Gardenia jasminoides Ellis
Gekko subpalmatus Gunther
Gentiana manshurica kitag
Gentiana rubicunda Franch.
Gentiana squarrosa Ledeb.
Gerbera piloselloides Cass.
Geum japonicum Thunb. var. *chinense* F. Bolle
Glechoma longituba (Nakai) Kupr.
Gleditsia sinensis Lam.
Glycyrrhiza uralensis Fisch.
Gnaphalium hypoleucum Dc.
Gnaphalium japonicum Thunb.

Goodyera schlechtendaliana Reichb. F. ; *G. repens* (L.) R. Br.

Goodyera Schlechtendatiana Reichb • f

Gryllotapa africana Palisot et Besurois

Gueldenstaedtia multiflora Bge.

Gymnotheca chinensis Decne

Gynura segetum (Lour.) Merr.

H

Haloragis micrantha R. Br.

Hedychium spicatum Ham . ex Smith

Hedyosmum Orientall Merr. et chum

Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr

Hedyotis diffusa Willd.

Helwingia japonicd (Thunb.) Dietr.

Hemiboea henryi Clarke

Hemistepa lyrata Bge.

Hemsleya amabilis Diels.

Hibiscus mutabilis L.

Hibiscus syiacus L.

Hosta plantaginea (Lam.) Ashe rs.

Hosta plantaginea (Lam) H • Sieboldiann Engl • Ascberson

Houttuynia cordata Thunb.

Hovenia dulcis Thunb.

Huechys sanguinea De Geer

Humulus scandens (Lour.) Merr.

Hydrangea strigosa Rehd.

Hydrocotyle sibthorpioides Lam.

Hypericum assyron L.

Hypericum erectum Thunb.

Hypericum patulum Tnunb.

Hypericum perforatum L.

Hypericum sampsonii Hance.

I

Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. et Benth.

Impatiens balsamina L.

Impatiens longialata E. pritz. ex Diels

Impatiens omeiana Hook. f.

Impatiens prirtzellii Hook. f. var. *hupehensis* Hook. f.

Indigofera calegoides Dc.

Indigofera pseudotinctoria Mats.

Iris japonica Thunb

Iris tectorum Maxim

Isatis tinctoria L.

Isodon amethystoides (Benth.) C. Y. Wu et Hara

Isodon inflexus (Thunb.) Kud.

Isodon nervosus (Hems1.) Kudo

Isodon phyllopodus (Diels) kudo

Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai

Ixeris polycephala Cass. [*Lactuca polycephala* (Cass.) Benth]

J

Juncus effuses L.

K

Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.

Kalimeris integrifolia Turcz

Kalimeris shimadae (Kitam.) Kitam.

Kerria japonica (L.) DC.

Kinostemon ornatum (Hems1) Kudo

Kyllinga brevifolia Rottv. *K. monocephala* Rottb.

L

Lannea grandis (Dennst.) Engl.
Lespedeza formosa (Vog.) Koehne.
Lespedeza uirgata (Thunb.) Dc.
Ligularia japonica (Thunb.) Less
Ligustrum sinense Lour
Lindera communis Hemsl.
Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
Linum stelleroides Planch.
Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.
Litsea pungens Hemsl.; *L. sericea* Hook. f.
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Lobelia chinensis Lour.
Lonicera japonica Thunb.
Lotus corniculatus L.
Ludwigia prostrata Roxb.
Lycianthes lysimachioides (Wall.) Bitt.
Lycopodium pulcherrimum Wall.
Lycoris radiata (L. Her.) Herb.
Lysimachia christinae Hance
Lysimachia clethroides Duby.
Lysimachia congestiflora Hemsl.
Lytta caraganae Pallas.

M

Macleaya cordata (Willd.) R. Br.; *M. microcarpa* Fedde
Mahonia bealei (Fort) Carr.
Mahonia confuse Sprague
Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. - Arg.
Malva verticillata L.
Mazus japonicus (Thunb.) O. Ktze.

Mecodium microsorum (V. d .B.) Chung

Melia azedarach L.

Meliosma cuneifolia Franch

Mercury

Metaplexis japonica (Thunb.) Makino

Mirabilis jalapa L.

Momordica charantia L.

Momordica cochinchinensis (Lour.) Spr.

Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl.

Mylabris phalerata Pallas.

Myrsine africana L.

N

Nicotiana tabacum L.

Nothopanax aelavayi (Franch.) Harms

O

Onychium japonicum (Thunb.) Kunze

Ophioglossum Pedunculosum Desv.

Osbeckia chinensis L.

Osbeckia crinita Benth. et Wall.

Ottelia alismoides (L.) Pers.

Oxalis corymbosa DC.

Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f.

P

Paederia Scandens (Lour.) Merr.

Pamnula forbesii franch

Paris polyphylla Sm.

Parthenocissus tricuspidata (Sied. et Zucc.) Planch.

Patrinia scabiosaefolia Fisch

Paulownia fortunei (Seem.) Hems1

Peristrophe japonica (Thunb.) Brem
Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt; *P. tricholobus* Franch.
Phallus rubicundus (Boss) Fr.
Pharbitis hederacea Choisy; *P. purpurea* (L.) Voigt
Phaseolus angularis Wight.; *P. calcavatus* Roxb.
Pheheirospermim japonicum (Thunb.) Kanitz.
Phellodendron chinense Schneid.
Pholidota chinensis Lindl.
Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro.
Phyllostachys pubescens Mazel
Phymatopsis hastata (Thunb.) Kitag.
Physalis alkekengi L. var. *franchetii* (Mast.) Makino
Physalis pubescens L.
Phytolacca acinose Roxb.
Picris hieracioides L. *subsp. japonica* Krylov.
Pinellia pedatisecta Schott
Pinus massoiana Lamb.
Pipe boehmeriaefolium Wavar. *lonkinesec* Dc.
Pistacia chinensis Bunge
Pistia stratiotes L.
Pittosporum illicioides. Mak.
Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc
Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe
Pogonia japonica Rehb. f.
Polliia japonica Thunb.
Polygala caudate Rehd. et Wils.
Polygala japonica Houtt.
Polygala sibirica L.
Polygonatum punctatum Royle. ex Kunth.

Polygonum aviculare L.
Polygonum capitatum Buch. -Ham, ex D. Don
Polygonum chinense L.
Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi.
Polygonum excurrens Steward
Polygonum lapathifolium L.
P. longisetum De Bruyn
Polygonum runcinatum Buch. -Ham. ex D. Don; *P. runcinatum* Buch. -Ham. et
D. Don var. *sinense* Hemsl.
Polygonum sieboldii Meisn.; *P. sagittifolium* Levl. et Vant.
Polypodium niponicum Mett
Polyporus mylittae Cook. et Mass.
Porana racemosa Roxb.
Portulaca oleracea L.
Postellularia procumbens (L.) Nees
Potentilla freyniana Bornm.
Potentilla kleiniana Wight et Arn.
Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.
Premna ligustroides Hemsl.
Premna microphylla Turcz.
Primula obconica Hance
Prunus pseudocerasus Lindl.
Prunus. davidiana (Carr.) Franch.
Pseudolarix kaempferi Gord.
Pteris dactylina Hook.
Pteris henryi Christ
Pteris multifida Poir .
Pteris nervosa Thunb.
Pteris Vittata L.

Punica granatum L.

R

Rabdosia rubescens (Hamsl.) Hara

Ranunculus sceleratus L.

Ranunculus sieboldii Miq.

Realgar

Rhamnus crenat Sieb. et Zucc.

Rhaponticum uniflorum (L. •) DC.

Rheum franzenbachii Munt.

Rhodiola henryi (Diels) S. H. Fu.

Rhododendron nstamineum Franch

Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.

Ricinus communis L.

Rorippa montana (Wall.) Small

Rorippa palustris (Leys.) Bess.

Rosa multiflora Thunb.

Rosa saturata Brker.

Rumex acetosa L.

Rumex madai Makino

Rumex nepalensis Spr. ; *R. dentatus* L. ; *R. patientia* L.

S

Sagina japonica (Sw.) Ohwi

Salvia cavaleriei Levl. var. *simplicifolia* Stib.

Sanguisorba grandiflora (Maxim.) Makino

Sapium sebiferum (L.) Roxb.

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai

Sargentodoxa cuneata (Oliv.)

Scilla scilloids var. *albouiridis* Wang et Y. C. Tang

Scolopendra subspiuipes mutilans L. • Koch

Scorzonera albicaulis Bunge
Scrophularia ningpoensis Hemsl.
Scutellaria indica L.
Scutellarid barbata D. Don.
Sedum aizoon L.
Sedum elatinoides Franch.
Sedum lineare Thunb.
Sedum major (Hemsl.) Migo
Sedum mingjinianum Fu
Sedum sarmentosum Bge.
Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
Senecio oldhamianus Maxim
Senecio wightii (DC. •) Benth.
Setaria faberi Herrm.
Silene fortunei Vis.
Siphonostegia laeta S. Moore
Smilax china L.
Smilax glabra Roxb.
Solanum lyratum Thunb.
Solanum nigrum L.
Solidago Virga-aurea L. var. *leiocarpa* (Benth.) A. Gray
Sonchus oleraceus L.
Sophora flauescens Ait.
Sorbus hupehensis Schneid.
Souliea vaginata (Maxim) Franch.
Speranskia cantonensis (Hance) Pax et Hoffm.
Spiraea japonica L. F. var. *acuminata* Franch.
Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
Stenoloma chusanum (L.) Ching

Stephania cepharantha Hayata
Stephania japonica (Thunb.) Miers
Stobilanthes forrestii Diels
Strobilanthes cyclus C. B. Clarke ex W. W. Sm.
Styrax benzoin Dryand.
Sulphur
Swertia diluta (Turcz.) Benth. et Hook. f.
Swertia mileensis T. N. Ho et W. L. Shi
Swertia pulchella (D. Don) Buch. & Ham.
Symplocos chinensis (Lour.) Druce
Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
Symplocos wikstroemiifolid Hay

T

Tamarix chinensis Lour.
Taraxacum mongolicum Hand. Mazz.
Taxus mairei (Lemee et Levl.) S. Y. Hu
Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch.
Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg
Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch.
Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. *pilosum* Gagnep.
Teucrium simplex Vant.
Thalictrum ichangense Leoyer ex Oliv.
Thalictrum petaloideum L
Thesium chinensis Turcz.
Thlaspi arvense L.
Thyrocarpus sampsonii Hance.
Tinospora sagittata Gagn.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Toxicodendron verniciflum (Stokes) Baril

Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.

Trifolium pratense L.

Tripterospermum affine (Wall.) H. Smith

Tripterygium wilfordii Hook. f.

Trollius chinensis Bge.

Trollius chinensis Bunge

Tupistra chinensis Baker

Typhonium divaricatum (L.) Decne.

V

Valeriana jatamansii Jones

Verbena officinalis L.

Vernonia cinerea (L.) Less

Veronica anagallis-aquatica L.

Veronica laxa Benth.

Veronica serpyllifolia L.

Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell

Veronicastrum cauloptera (Hance) Yamazaki

Vespuia maculata (L.)

Viola diffusa Ging.

Viola grypoceras A. Gray

Viola philippica Cav. ssp. *munda* W. Beck.

Voronicastrum latifolium (Hemsl.) ramazaki

Weigela japonica Thunb. var. *Sinica* (Rehd.)

Wikstroemia effusa Rehd.

Y

Youngia prattii (Babc) Babc et Stebb

Z

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Zanthoxylum undulatifolium Hemsl.

Zantnoxylum Schinifolium Sieb. et Zucc

Zaocys dhum nades (Cantor)

Zelkova schneideriana Hand. - Mazz.

主要参考书目及资料

- [1]田华咏, 潘永华, 唐永佳, 土家族医药学[M], 北京, 中医古籍出版社(1994年版)。
- [2]田华咏, 瞿显友, 熊鹏辉, 中国民族医药炮制集成[M], 北京, 中医古籍出版社(2002年版)。
- [3]方志先, 赵晖, 赵敬华, 土家族药物志[M], 北京, 中国医药科技出版社(2007年版)。
- [4]彭芳胜, 土家医方剂学[M], 北京, 中医古籍出版社(2007年版)。
- [5]田华咏, 彭芳胜, 潘永华, 土家族医药研究(内部资料)2001年。
- [6]湘西自治州中草药普查办公室、湘西自治州中草药资源报告集(内部资料)1988年。
- [7]朱国家, 杜江, 张景梅, 土家族医药[M], 北京, 中医古籍出版社(2006年版)。
- [8]梁波, 李苑, 蛊毒[M], 北京, 作家出版社(2005年版)。
- [9]周通群, 土家医七十二症卷(内部资料·手抄板)年代不详。
- [10]田华咏, 土家族医学史[M], 北京, 中医古籍出版社(2005年版)。
- [11]彭芳胜, 土家医雷火神针疗法提风疗法技术规范与应用研究[M], 北京, 中医古籍出版社。
- [12]. 彭芳胜, 土家医毒气病因病机证治研究[J], 中国民族医药杂志, 2002, 9(2); 1~3
- [13]. 彭芳胜, 土家医毒气学说研究[J], 湖南中医药导报, 2002, 8(1); 93~98
- [14]. 彭芳胜, 论土家医辨证识毒量邪论治观[J], 湖南中医药导报, 2003, 9(1); 16~17
- [15]. 彭芳胜, 土家医治毒药物分类整理研究[J], 湖南中医药导报, 2003, 9(6);

59~60

[16]. 彭芳胜、杨德良、李治国等, 土家医嘎啦症诊疗技术规范化研究[J], 中国民族医学杂志, 2012, 18 (1); 22

[17]彭芳胜, 土家医毒气病诊疗技术规范化研究[J], 中国民族医药杂志, 2012年.

后 记

深藏在武陵山腹地的土家医学，被外界称为“神秘医药”。在这特殊地理环境生长的动物、植物、矿物药物，在华中地区享有声誉，曾被中国药材总公司定位“华中大药库”

旧中国时期，由于交通闭塞，这里的药物多为本地民族医药人员自采自用，服务于乡村百姓。新中国成立后，党和政府高度重视民族医药事业的发展，给土家医药新的生命力。在近四十年时间里，广大土家医药人员、专家学者，通过挖掘整理研究，不断揭开了它的神秘面纱和它的科学内涵，恢复了它本来面貌，其特色展示在世人面前，《土家医治毒药物集》是这一时期内挖掘整理出来的其中成果之一。它从药理学方面首次系统阐述了土家医治毒物理论，从分类学角度进行了详细分类，按土家医治毒药物形成发展长河中，一次全面的总结，是土家医药历史发展中的里程碑。

对本书的编著，得到中南民族大学药学院，湘西自治州民族医药科研所的大力支持，得到中南大学梅之南教授、院长，中国民族医药学会田华咏副会长等领导、专家、教授指导，才使本书编著顺利完成，在调研收集资料上，得到湖南省湘西自治州、张家界市，湖北省恩施自治州等多位名老土家医无私帮助，才使本书内容丰富，资料更加完善。在编写过程中文字方面得到湖南土家语言专家田禹顺同志的翻译和注释，同时得到州社保中心田德祥程序专家的辅助。在内容上，书中拉丁文部分由张家界市人民医院张元忠主任药师校勘，临床应用部分由湘西州民族中医院王小华副主任医师参加编写其中部分内容。由于大学和科研机构合作，领导的重视，专家学者在学术上的支持，参加本书的编写人员辛勤工作劳动，才能在较短时间完成。在此，编委员谨向以上领导、专家、教授学者、名老土家医等为本书完成付出致以崇高的敬意。

由于作者的水平有限，时间的仓促，不能把土家医治毒药物的内容完整体现出来，不能完全把名老土家医治毒学术思想表达出来，向读者深表歉意。本书在编写体例、文章修辞、逻辑思维、文字修编等方面难免有不确切地方，敬请专家

学者读者斧正。

土家医毒气学说的提出，治毒药物学的形成，本书为首次阐述，可能只起到抛砖引玉作用，希望致力土家医医学研究有志之士，在今后的时间里不断发扬光大，让土家医毒气学术思想不断完善，造福于人类的健康事业。

编者

二〇一三年八月